



# Ficha Técnica Fungicidas

## Almagor EC

### **ALMAGOR EC**

INGREDIENTE ACTIVO  
NOMBRE QUIMICO

Azoxistrobina, Procloraz, Tebuconazol  
E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi) pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato \*\* N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy) ethyl] imidazole-1-carboxamide + N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy) ethyl] imidazole-1-carboxamide + (RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol.

GRUPO QUIMICO

Azoxistrobina pertenece al grupo químico de los Metoxiacrilatos, Procloraz pertenece al grupo químico de los Imidazoles y Tebuconazol pertenece al grupo químico de los Triazoles.

CONCENTRACION Y FORMULACION

5,6 % p/v + 20% p/v + 10% p/v

MODO DE ACCION

Sistémico y de contacto

FABRICANTE/ FORMULADOR

**Adama Andina B.V. Sucursal Colombia**

DISTRIBUIDOR EN CHILE

**Adama Chile S.A.**

TOXICIDAD

Grupo III Producto poco peligroso

LD 50 oral

Rata > 2000 mg/kg

LD 50 dermal

Rata: >2000 mg/kg

LC 50 inhalación

Rata: > 1.52 mg/l

(concentración analítica).

ANTIDOTO

No hay antídoto específico. Tratar según sintomatología. En caso de ingestión hacer lavado gástrico y administrar carbón activado.

AUTORIZACION SAG N°

**2878**

### **PRINCIPALES CARACTERISTICAS**

**ALMAGOR EC**, es un fungicida sistémico y de contacto con acción preventiva, curativa y erradicante que combina la acción de los ingredientes activos Azoxistrobina, Prochloraz y Tebuconazol, actuando eficazmente en el control de enfermedades que se detallan en el cuadro de instrucciones de uso.

### **INSTRUCCIONES DE USO**

Cultivos	Enfermedades	Dosis (L/ ha)	Observaciones
Trigo	Polvillo estriado o Roya ( <i>Puccinia striiformis</i> ), Mancha foliar o Septoriosis de la hoja ( <i>Mycosphaerella graminicola</i> ), Anam.: <i>Septoria tritici</i> ,	1,0 – 1.2	Aplicar al detectarse la infección y con hoja bandera completamente desarrollada. Realizar 2 aplicaciones por temporada con intervalos de 30 días. Utilizar la dosis más alta frente a una alta presión de la enfermedad. Utilizar un volumen de aplicación de 200-400 L/ ha.

**Aplicación aérea:** utilizar dosis por hectárea indicada en el cuadro de instrucciones de uso. Mojamiento 50 – 60 L de agua/ha, dependiendo del tamaño del cultivo, usar mojamiento mayor con un mayor tamaño del cultivo y utilizar el mojamiento menor a menor tamaño del cultivo

**PERIODO DE CARENCIA (días):** Trigo (54 días)

## ADAMA

Casa Matriz: Camino Catemito 2800 | Calera de Tango | Santiago | Chile. Fono +56(2)2855 0048 | Fax +56(2)2855 0504 Email [secretaria.cl@adama.com](mailto:secretaria.cl@adama.com)

Sucursal: Av. Bernardo O'Higgins Sur N° 0270 | San Fernando | Chile. Fonos +56(72)272 1955 | +56(72)272 1541 | Email [sanfernando@adama.com](mailto:sanfernando@adama.com)

[adama.com/chile](http://adama.com/chile)



## Ficha Técnica Fungicidas Almagor EC

### TIEMPO DE REINGRESO

Para animales y personas, el tiempo de reingreso al área tratada es de 12 horas después de la aplicación del producto.

### COMPATIBILIDAD

Compatibilidad: **ALMAGOR EC** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común.

**Incompatibilidad:** **ALMAGOR EC** es incompatible con productos de reacción alcalina o ácida. En caso de utilizarse en mezcla se recomienda realizar una prueba a una pequeña escala para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

**Preparación de la Mezcla:** Vierta en el tanque de preparación la dosis a ocupar **ALMAGOR EC** en la mitad del volumen de agua total a emplear manteniendo el agitador en marcha; revolver hasta lograr una emulsión homogénea, y finalmente rellene con el agua faltante.

**Fitotoxicidad:** Según las recomendaciones de uso de esta etiqueta **ALMAGOR EC** no es fitotóxico.

Precauciones de aplicación para las abejas: se recomienda realizar las aplicaciones de **ALMAGOR EC** temprano en la mañana o al final del día, de manera de evitar presencia de abejas en el huerto durante la aplicación.

**RETIRAR COLMENAS DEL AREA A TRATAR PREVIO A LA APLICACION**

ADAMA

Casa Matriz: Camino Catemito 2800 | Calera de Tango | Santiago | Chile. Fono +56(2)2855 0048 | Fax +56(2)2855 0504 Email [secretaria.cl@adama.com](mailto:secretaria.cl@adama.com)

Sucursal: Av. Bernardo O'Higgins Sur N° 0270 | San Fernando | Chile. Fonos +56(72)272 1955 | +56(72)272 1541 | Email [sanfernando@adama.com](mailto:sanfernando@adama.com)

[adama.com/chile](http://adama.com/chile)