



ADAMA

Ficha Técnica Nutrisorb® L

Bioestimulante para la asimilación de nutrientes.

Principales características

Nutrisorb® L es una formulación que proviene de extractos concentrados de cascarillas agrícolas ECCA Carboxy® que favorece el desarrollo radicular y el proceso de absorción activa de los nutrientes dando como resultado la mayor extracción de nutrientes de la solución del suelo y como consecuencia mejor desarrollo del cultivo.

Dosis

Es importante considerar el volumen total del riego ya que se debe tener una concentración de entre 50 y 200 ppm de producto en el agua total para obtener el máximo desempeño del producto.

Ingredientes activos

Polifenoles totales (expresados como ácido gálico) ... 1,21 %p/v (12,1 g/L)
Coformulantes, c.s.p. 100 %p/v

Concentración y formulación

Solubilidad en agua: 100%, a 20 °C

pH: 7,0

Densidad: 1110 g/L, a 20 °C

Metales pesados

Arsénico (As): <2,0 mg/kg

Cadmio (Cd): <2,50 mg/kg

Mercurio (Hg): <4,0 mg/kg

Plomo (Pb): <3,3 mg/kg



ADAMA

Ficha Técnica Nutrisorb® L

Bioestimulante para la asimilación de nutrientes.

Cultivos	Dosis (L/ha)	Nº de aplicaciones	Modo de aplicación
Vides de mesa	2 - 4	2 - 3	Inicio de brotación. Período de crecimiento vegetativo. Cuaja a llenado de frutos.
Vides para vino	2 - 4	2 - 3	Inicio de brotación. Período de crecimiento vegetativo. Cuaja a llenado de frutos.
Manzano y perales	2 - 4	2 - 3	Inicio de brotación. Período de crecimiento vegetativo. Cuaja a llenado de frutos.
Carozos	2 - 4	2 - 3	Inicio de brotación. Período de crecimiento vegetativo. Cuaja a llenado de frutos.
Kiwis	2 - 4	2 - 3	Inicio de brotación (crecimiento vegetativo). Cuaja a llenado de frutos.
Frutales de nuez	2 - 4	2 - 3	Inicio de brotación. Período de crecimiento vegetativo. Cuaja a llenado de frutos.
Berries	1 - 2	2	Inicio de brotación (crecimiento vegetativo). Cuaja a llenado de frutos.
Tomates, ají, pimientos	2 - 3	2 - 4	Crecimiento vegetativo. Llenado de frutos. En cosecha.
Cucurbitáceas	2 - 3	2 - 3	Crecimiento vegetativo. Llenado de frutos. En cosecha (periodo de cortes).
Brassicas	2 - 3	2 - 3	Crecimiento vegetativo.
Hortalizas de bulbo y raíz (cebolla y ajo)	2 - 3	2 - 4	Crecimiento vegetativo. Llenado de frutos. En cosecha.
Cítricos	2 - 4	2 - 3	Período de crecimiento vegetativo. Cuaja a llenado de frutos.
Paltos	2 - 4	2 - 3	Periodo de crecimiento vegetativo. Cuaja a llenado de frutos.
Olivos	2 - 4	2 - 3	Inicio de brotación (crecimiento vegetativo). Cuaja a llenado de frutos.



NUTRICIÓN VEGETAL
Y BIOESTIMULANTES

Nutrisorb® L

Recomendaciones de uso

Nutrisorb® L se aplica solo o en mezcla con los fertilizantes; en drench, en el riego por gravedad o inyectado al sistema en riego presurizado. Puede aplicarse desde el trasplante hasta la fructificación.

Compatibilidad

Siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

FABRICANTE/FORMULADOR
Innovak Global, S.A. de C.V.

DISTRIBUIDOR EN CHILE
ADAMA Chile S.A.

