



FUNGICIDAS



BLASIL® 500 SE

REGISTRO NACIONAL No. PL0002172023

TITULAR ADAMA ANDINA B.V.
SUCURSAL COLOMBIA

Fungicida de uso Agrícola
Suspoemulsión - SE



Cultivos:

Arroz, Rosa.

Blanco biológico:

Quemado o bruzone del arroz, Moho gris.

Modo de Acción:

BLASIL® 500 SE es un fungicida combinado, constituido por dos ingredientes activos. El primero de ellos, Prochloraz tiene un efecto translaminar, que interfiere con la formación de las membranas de los patógenos. El segundo, el Tricyclazol, tiene un movimiento sistémico, e inhibe la formación de algunos lípidos de la membrana celular.

Mecanismo de Acción:

El Prochloraz interfiere sobre la biosíntesis del ergosterol, componente principal de la membrana celular de los hongos y el Tricyclazol, inhibe la biosíntesis de la melanina en la pared celular, fundamental para la formación de apresorios, en los primeros procesos infectivos de los hongos.

Resistencia:

La mezcla de los dos ingredientes activos de **BLASIL® 500 SE**, reduce el riesgo de resistencia, debido a que estas sustancias actúan en diferentes puntos de acción metabólica.

Generalidades:

BLASIL® 500 SE es un fungicida combinado, sistémico-translaminar conformado por dos ingredientes activos con amplio espectro de acción. Prochloraz (Grupo químico: Imidazol) es un fungicida translaminar, que interfiere en la formación de las membranas celulares de los hongos y el Tricyclazol (Grupo químico: Triazolobenzotiazol) fungicida sistémico que inhibe la biosíntesis de la melanina en la pared celular, que es fundamental para la formación de apresorios del patógeno en el proceso de infección. Así, la mezcla de estos activos hace del producto **BLASIL® 500 SE** una solución efectiva para el control del patógeno *Pyricularia oryzae* en el cultivo del arroz y el moho gris en el cultivo de rosa.

Ingrediente activo:

Prochloraz + Tricyclazol

Concentración:

Prochloraz 270 gr/L +
Tricyclazol 230 gr/L

Categoría toxicológica:

II - Moderadamente
Peligroso.

Presentación:

1 Lt., 4 Lts y 20 Lts.

Grupo químico:

Imidazol + Triazolobenzotiazol



BLASIL® 500 SE

Recomendaciones de uso:

CULTIVO	OBJETIVO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C.	P.R.
Arroz (Estado de crecimiento 2-3 CIAT) Macollamiento a crecimiento de tallos	Bruzono o pircularia: (<i>Pyricularia oryzae</i>)	1,0 L/ha Con los primeros síntomas de la enfermedad, con valores del 2 a 5% de AFA en plantas. (Área Foliar Afectada = AFA)	30 días	4 horas
		1,2 L/ha Con síntomas de la enfermedad, para valores entre un 6 a 10% de AFA en plantas. (Área Foliar Afectada = AFA)		
Rosa	Moho Gris (<i>Botrytis cinérea</i>)	1.0 cc/L *	N/A	4 horas

P.R.: Periodo de reentrada: Intervalo mínimo de tiempo establecido entre la última aplicación de un plaguicida y la entrada de trabajadores sin el equipo de protección, al área tratada.

P.C.: Periodo de Carencia: Intervalo (días) entre la última aplicación y la cosecha.

N.A.: No Aplica.

* Se recomienda aplicar el producto de manera preventiva usando 4 a 5 litros de agua por cama de 30 m² y un promedio de 200 a 220 camas por hectárea, equivalente a un promedio de agua de 1000 a 1100 L/ha.

Frecuencia y época de aplicación:

En el cultivo del arroz, aplicar con volúmenes de agua entre 140 y 200 L/ha.

BLASIL® 500 SE en dosis de 1,0 y 1,2 L/ha puede aplicarse para el control preventivo y curativo de *Pyricularia oryzae*, entre los 25 y 40 dde el cultivo de arroz, cuando se presenten los primeros síntomas y no se superen los grados 2 ó 5% o de 6 a 10% de área foliar afectada.

BLASIL® 500 SE debe aplicarse utilizando un aguilón o boom de aspersión que garantice una buena cobertura sobre las plantas.

BLASIL® 500 SE a las dosis indicadas de 1,0 y 1,2 L/ha, no representa riesgo de fitotoxicidad para el cultivo del arroz.

Preparación de la mezcla:

Para preparar la mezcla de aspersión, vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de **BLASIL® 500 SE**, en la mitad del volumen de agua total a emplear. Agite fuertemente por un espacio de tiempo de 3 a 4 minutos de manera constante. Luego complete con el volumen faltante de agua y vuelva agitar por 3 a 4 minutos. Las mezclas del producto preparadas para la aplicación deben utilizarse inmediatamente y nunca guardarse para aplicaciones en días posteriores. Los equipos de aspersión deben tener un sistema adecuado de agitación, para poder garantizar una mezcla homogénea durante el transcurso de la aplicación. De lo contrario, se debe agitar constantemente, asegurando la homogeneidad de la mezcla durante cada una de las cargas del equipo de aspersión.

Compatibilidad y fitotoxicidad:

En el caso de mezcla con otros productos, se recomienda hacer pruebas preliminares a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario, para demostrar que la mezcla sea físicamente compatible, eficaz y no fitotóxica bajo las condiciones locales de uso. Se debe evitar la mezcla de **BLASIL® 500 SE** con fertilizantes foliares o con productos de reacción fuertemente alcalina. Si el producto se usa a las dosis recomendadas es poco probable que se presenten problemas de fitotoxicidad.

Departamento Técnico
ADAMA ANDINA
Marzo 2024