



Acondicionador orgánico
para suelo

¿Qué hace?

Provoca una mayor eficiencia en la translocación de fotosintatos hacia frutos y órganos de almacenamiento.

¿Cómo lo hace?

Los ácidos ECCA Carboxy® contenidos en Carboxy® L, influyen en los procesos del metabolismo primario que conducen a un incremento en la fijación fotosintética del carbono y a la mayor translocación de carbohidratos de las zonas de donde se producen hacia las zonas en donde se demandan (frutos, tubérculos, tallos y coronas) en la planta, a través de los tejidos de conducción.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS			
pH: 5.5 – 6.5 en solución al 10%		Forma: líquido	Color: Café
Densidad: 1.06 – 1.10 g/cm3 a 20 °C		No corrosivo. No inflamable.	
PROPIEDADES GENERALES			
Almacenamiento: Conservar cerrado en lugar fresco y seco.	Ambiental: No residual, de muy bajo impacto.	Incompatibilidad: Evitar agentes oxidantes fuertes.	Toxicidad: Ligeramente tóxico.

Beneficios

- Mayor acumulación de reservas en raíces y madera para mejor brotación en frutales, berries y rosales.
- Translocación de azúcares a coronas de espárrago para mejorar la calidad de los turiones.
- Madurante no fitotóxico ni residual para caña de azúcar.



Ingrediente activo	g/L
Carbono Orgánico Oxidable Total	63,5

Registro de Venta ICA No. 5329

Incompatibilidad

Siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

ADAMA
BIO
SOLUCIONES

Innovak
GLOBAL
LA RAÍZ DE UN FUTURO SUSTENTABLE

BIOESTIMULANTES

Cultivo	Dosis	Aplicaciones / Observación
Caña de azúcar (como madurante)	3 L/ha	Por aspersión en aplicación única, en los 25 a 45 días previos a la cosecha.
Papa (para vaciado)	2 a 3 L/ha	Aplicar de una a dos semanas previo a la quema o desvare.
Cebolla (para vaciado)		Aplicar de una a tres semanas previo a cosecha.
Berries (para reserva en corona)		Aplicar antes del rose.
Espárrago (para reserva en corona)		Aplicar previo al agoste.

RECOMENDACIONES DE USO

Para preparar la solución de aspersión con agua

- a) Agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad;
- b) Mida la cantidad a aplicar en recipiente graduado y vierta en cubeta para predilución o premezcla.
- c) Vierta el contenido de la cubeta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad del volumen de aspersión.
- d) Agite y complete el total del volumen de aspersión

Las aspersiones foliares se diluyen en un mínimo de 40 L de agua si es aplicado por avión y con 100 L de agua en aplicación terrestre. Se sugiere emplear aditivos de aspersión, recomendados para este tipo de aplicaciones foliares.