

 **AGIL® 100 EC**

 **ADAMA**

©ADAMA Guano N.V.

 **UKRUDTSMIDDEL**

Midlet er et emulgerbart koncentrat (emulsionskoncentrat)



### Analyse

- propaquizafop . . . . . 100 g/L (9,6% w/w)
- Indeholder propaquizafop. Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).



### Anvendelsesområde

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter, kartofler, rødbeder, bønner, hør og sennep. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.



### Deklaration

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009. Registreringsnr.: Ukrudtsmiddel 396-12.

**Godkendelsesindehaver:**

ADAMA Registrations B.V.  
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, Holland  
www.adama.com

**Fabrikationsnummer og produktionsdato:** se emballagen

**Holdbarhed:** minimum 2 år fra produktionsdatoen



**Scan for brug**



**TRACEABILITY  
PRINTING  
51/58 x 27 mm**

1LE

### FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401) ● Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304) ● Forårsager alvorlig øjenirritation (H319) ● Farlig ved indånding (H332) ● Mistænkt for at fremkalde kræft (H351) ● Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger (H411) ● Gentagen kontakt kan give tør og revnet hud (EUH066) ● Undgå indånding af spray (P261) ● Bær beskyttelsestøj/ beskyttelsestøj/øjenskytelse/ ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plante-beskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*  
**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter, kartofler, rødbeder, bønner, hør og sennep ● Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides ● Må i bederoer og rødbeder ikke anvendes senere end 60 dage før høst ● Må i kartofler ikke anvendes senere end 30 dage før høst ● Må i raps og sennep ikke anvendes senere end 90 dage før høst ● Må i ærter og bønner ikke anvendes senere**

**end 45 dage før høst ● Må i hør ikke anvendes senere end 83 dage før høst ● Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3) ● Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1) ● Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102) ● Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

### FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101) ● I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331) ● VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352) ● VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312) ● VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338) ● VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313) ● Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

L111792IPWB\_01

**VIRKEMÅDE 1 UKRUDTSMIDDEL**



### FARE



**UN3082**

UFI: QWVN-C2AA-100M-5NEF



8-718077-001685

## FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401) ● Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304) ● Forårsager alvorlig øjenirritation (H319) ● Farlig ved indånding (H332) ● Mistænkt for at fremkalde kræft (H351) ● Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger (H411) ● Gentagen kontakt kan give tør og revnet hud (EUH066) ● Undgå indånding af spray (P261) ● Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plante-beskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*  
**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter, kartofler, rødbeder, bønner, hør og sennep ● Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides ● Må i bederoer og rødbeder ikke anvendes senere end 60 dage før høst ● Må i kartofler ikke anvendes senere end 30 dage før høst ● Må i raps og sennep ikke anvendes senere end 90 dage før høst ● Må i ærter og bønner ikke anvendes senere**

**end 45 dage før høst ● Må i hør ikke anvendes senere end 83 dage før høst ● Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3) ● Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1) ● Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102) ● Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

## FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101) ● I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331) ● VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352) ● VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312) ● VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338) ● VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313) ● Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

## BRUGSANVISNING

### Virkemåde

Agil® 100 EC (er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter, kartofler, rødbeder, bønner, hør og sennep.

Agil® 100 EC er et ukrudtsmiddel med systemisk virkning til anvendelse efter fremspiring af ukrudtet. Agil® 100 EC optages gennem bladene og bekæmper en lang række græsarter inklusive kvik og spildkorn. Anvendelsesområdet omfatter bederoer, vinter- og vårraps, ærter samt kartofler, rødbeder, bønner, hør samt sennep. Effekten indtræder efter 3-5 dage, hvor græssernes vækst stoppes. Første synlige effekt, i form af gul og/eller rødvarning af bladene, opnås 10-14 dage efter behandling. Efter yderligere 3-8 dage opnås en fuldstændig nedvisning.

Bedste effekt med Agil®100 EC opnås når:

- relativ luftfugtighed >70%
- temperaturudsving mellem nat og dag er relativt små
- kvikplanterne har 3-5 blade og er i god vækst
- spildkorn/græsser har 3-4 blade og er i god vækst.

### Vejrforhold

For at sikre en god optagelse af aktivstoffet kræves mindst én times tørvej efter endt behandling. Agil® 100 EC stiller ikke store krav til temperaturer, dog bør der ikke sprøjtes ved udsigt til nattefrost.

### Biologisk effekt

Agil® 100 EC er særdeles effektivt over for kvik, spildkorn, flyvehavre, almindelig og italiensk rajgræs, alm. rapgræs og engrapgræs, agerrævehale, vindaks samt en lang række andre græsser. Effekten overfor enårig rapgræs kan variere betydeligt. Der opnås ikke en fuldstændig bekæmpelse. Bedste effekt opnås når enårig rapgræs har udviklet 1-3 blade. Der er ikke tilstrækkelig virkning over for rødsvingel, når denne optræder som ukrudtsart.

Agil® 100 EC kan tidligst anvendes når afgrøderne er spiret frem. I vinterraps kan Agil® 100 EC først anvendes fra stadie BBCH 13.

## AFGRØDER, DOSERING OG SPRØJTETIDSPUNKT

### Bekæmpelse af kvik

Afgrøde	Dosis	Behandlingsfrist, dage	Anvendelse
Bederøer, rødbeder	0,75-0,8 L/ha som enkeltbehandling eller 2 x 0,4 L/ha med 2-4 uger mellem behandlingerne.	60	Fra fremspiring til 60 dage før høst. Maksimumdosering pr vækstsæson er 0,8 L/ha ved enkeltbehandling og 0,4 L/ha/behandling ved delt behandling (max. 2 behandlinger). Kun behandling hvert 3. år på samme areal.
Kartofler	0,75-0,8 L/ha	30	Fra fremspiring til 30 dage før høst. Maksimum 1 behandling pr. vækstsæson. Kun behandling hvert 2. år på samme areal.
Ærter (grønne og tørrede), bønner	0,75-0,93 L/ha	45	Fra såning til BBCH 89. Kun behandling hvert 2. år på samme areal.
Vårraps	0,75-1,5 L/ha som enkeltbehandling eller 2 x 0,75 L/ha med 2-4 uger mellem behandlingerne	90	Fra fremspiring til 90 dage før høst. Maksimum 1,5 L/ha ved enkeltbehandling og 0,75 L/ha/behandling ved delt behandling (maks. 2 behandlinger).
Vinterraps	Efterår: 0,4-0,74 L/ha eller 2 x 0,37 L/ha med 3-4 uger mellem behandlingerne	90	Fra BBCH 13-16. Maks. dosis på BBCH 13 er 0,54 L/ha ved enkeltbehandling og 0,37 L/ha/behandling ved delt behandling (maks. 2 behandlinger). Kun behandling hvert 3. år på samme areal.
Vinterraps	Forår: 0,5-1,2 L/ha	90	Fra BBCH 13 til 90 dage før høst. Hvis der er anvendt Agil i efteråret kan dette produkt ikke anvendes i foråret, da samme areal kun må behandles hvert 3. år.

### Bekæmpelse af spildkorn, græsukrudt og flyvehavre

Afgrøde	Dosis	Behandlingsfrist, dage	Anvendelse
Bederøer, rødbeder,	0,5-0,8 L/ha som enkeltbehandling eller 2 x 0,4 L/ha med 2-4 uger mellem behandlingerne.	60	Fra fremspiring til 60 dage før høst. Maksimumdosering pr vækstsæson er 0,8 L/ha ved enkeltbehandling og 0,4 L/ha/behandling ved delt behandling (max. 2 behandlinger). Kun behandling hvert 3. år på samme areal.

Afgrøde	Dosis	Behandlingsfrist, dage	Anvendelse
Kartofler	0,5-0,8 L/ha	30	Fra fremspiring til 30 dage før høst. Maksimum 1 behandling pr. vækstsæson. Kun behandling hvert 2. år på samme areal.
Ærter (grønne og tørrede), bønner	0,5-0,93 L/ha	45	Fra såning til BBCH 89. Kun behandling hvert 2. år på samme areal
Vårraps	0,5-1,5 L/ha som enkeltbehandling eller 2 x 0,75 L/ha med 2-4 uger mellem behandlingerne	90	Fra fremspiring til 90 dage før høst. Maksimum 1,5 L/ha ved enkeltbehandling og 0,75 L/ha/behandling ved delt behandling (maks. 2 behandlinger).
Vinterraps	Efterår: 0,4-0,74 L/ha eller 2 x 0,37 L/ha med med 3-4 uger mellem behandlingerne	90	Fra BBCH 13-16. Maks. dosis på BBCH 13 er 0,54 L/ha ved enkeltbehandling og 0,37 L/ha/behandling ved delt behandling (maks. 2 behandlinger). Kun behandling hvert 3. år på samme areal.
Vinterraps	Forår: 0,5-1,2 L/ha	90	Fra BBCH 13 til 90 dage før høst. Hvis der er anvendt Agil i efteråret kan dette produkt ikke anvendes i foråret, da samme areal kun må behandles hvert 3. år.
Hør	0,5-1 L/ha	83	Dosering afhængig af ukrudtets størrelse
Sennep (frø)	0,6-0,8 L/ha	90	Dosering afhængig af ukrudtets størrelse

### Vær opmærksom på at laveste dosering kræver optimale virknings- og sprøjtebetingelser

Det skal præciseres, at 0,80 L/ha i kartofler eller roer ikke vil resultere i en meget høj bekæmpelsesprocent da afgrøden ikke er specielt konkurrencestærk i de tidlige stadier. En konkurrencestærk afgrøde vil kunne bidrage yderligere til virkningen af lave doseringer mod specielt kvik. Ved anvendelse af doseringer på 0,75 L/ha eller derover opnås en sideeffekt på enårig rapgræs. Dette kræver at enårig rapgræs maksimalt har 3 blade på sprøjtetidspunktet, samt at sprøjtebetingelserne er optimale.

### Kvikbekæmpelse

Behandling foretages når kvikplanterne har udviklet 3-5 blade, og er i god vækst. Behandling kan med fordel foretages som enkeltbehandling med de nævnte doseringer for de respektive afgrøder i tabellen for bekæmpelse af kvik ovenfor. Ved kraftige kvikbestande eller under ekstreme vejforhold f.eks. ved en lang tørkeperiode kan en splitbehandling udføres i bederoer, rødbeder og raps. Der bekæmpes med et interval på 2-4 uger mellem behandlingerne.

## Bekæmpelse af spildkorn, græsukrudt og flyvehavre

Behandling af flyvehavre, græsukrudt og spildkorn foretages i de respektive afgrøder med doseringer som angivet i tabellen for bekæmpelse af spildkorn, græsukrudt og flyvehavre ovenfor. Doseringen kan justeres afhængig af ukrudtsart og størrelse på ukrudtet. Ukrudtet skal have udviklet mindst 3 blade og være i god vækst for at opnå god effekt.

Ved sen behandling, hvor spildkornet har udviklet mere end 5 blade, forringes effekten og der er behov for en højere dosering for at opnå tilstrækkelig effekt.

Mod enårig rapgræs opnås kun en mindre sikker effekt. Bedste effekt opnås, såfremt enårig rapgræs har udviklet maksimalt 3 blade.

## Bemærk på bekæmpelse i læggekartofler

Agil® 100 EC kan under dårlige vækstforhold (koldt vejr med dårlig og langsom fremspiring, som forårsager krøllede blade med lille vokslag) give svidninger, som ikke forringer udbytte og kvalitet af kartofler. Disse svidninger kan alene vanskeliggøre kontrollen af læggekartofler

## RESISTENSSTRATEGI

Proaquizafop tilhører HRAC gruppe 1, tidligere gruppe A. Der er en høj risiko for resistensudvikling ved gentagen brug af dette middel. Der er konstateret resistens hos agerrævehale, italiensk rajgræs og vindaks over for herbicider med samme virkemekanisme som Agil® 100 EC. Ved behov for yderligere behandling i samme afgrøde bør der så vidt muligt vælges et produkt med en anden virkningsmekanisme. Ved behandling i en efterfølgende afgrøde, bør der ligeledes vælges et middel med en anden virkemekanisme..

## SPRØJTETEKNIK

TILBEREDNING AF SPRØJTVEJESKEN: FYLD TANKEN HALVT TIL TREKVRT MED VAND OG TILSÆT AGIL® 100 EC UNDER omrøring. Fortsæt omrøring under sprøjtning. Udsprøjtning bør ske senest få timer efter tilberedning.

Under normale behandlingsbetingelser anvendes 150-200 liter vand/ha.

## AFSTAND TIL ANDRE BEHANDLINGER

Der bør holdes en afstand på 3 dage mellem behandling med Agil® 100 EC og behandling med andre ukrudtsmidler for at opnå den bedste effekt.

Såfremt afgrøder, kvik eller andet græsukrudt er blevet hæmmet efter forudgående sprøjtning, bør behandling med Agil® 100 EC udsættes til der igen er normal vækst, hvilket oftest vil betyde en afstand på ca. 7 dage.

## EFTERFØLGENDE AFGRØDER/ OMSÅNING

Ved et normalt sædskifte kan alle afgrøder efterfølge en afgrøde behandlet med Agil® 100 EC. Ved omsåning efter en behandling med Agil® 100 EC kan alle tokimbladede afgrøder sås.

Såning af korn og græsser kan tidligst ske 4 uger efter behandling med Agil® 100 EC.

## TANKBLANDING

Med vore nuværende kundskaber er Agil® 100 EC fysisk blandbar med de vigtigste svampe-, insekt-, ukrudts- og vækstreguleringsmidler samt mikronæringsstoffer af god kvalitet. Bemærk at effekten af Agil® 100 EC kan nedsættes i blandinger med ukrudtsmidler.

Fysisk blandbar indebærer at ingen udfældning sker. Forskellige faktorer såsom vandkvalitet, temperatur, vandets hårdhed mm kan indvirke på blandingen. Læs altid respektive præparaters etiket før brug.

## RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæske kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, jf. senest gældende bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

## TOM EMBALLAGE

Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllvandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

## PRODUKTANSVAR

ADAMA fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres leverandør.

**Vigtigt:** Læs altid advarselsteksten før brug.





# AGIL<sup>®</sup> 100 EC



ADAMA

©ADAMA Quena N.V.



## UKRUDTSMIDDEL

Midlet er et emulgerbart koncentrat (emulsionskoncentrat)



### Analyse

- propaquizafop . . . . . 100 g/L (9,6% w/w)  
Indeholder propaquizafop. Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).



### Anvendelsesområde

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter, kartofler, rødbeder, bønner, hør og sennep  
 Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation



### Deklaration

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Registreringsnr.: Ukrudtsmiddel 396-12

Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, Holland

www.adama.com

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen

Holdbarhed: minimum 2 år fra produktionsdatoen



Scan for brug



UN3082

UFI: QWVN-C2AA-100M-5NEF



8 718077 001692



DENMARK

## VIRKEMÅDE

# 1

## UKRUDTSMIDDEL

### FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401) ● Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304) ● Forårsager alvorlig øjenirritation (H319) ● Farlig ved indånding (H332) ● Mistænkt for at fremkalde kræft (H351) ● Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger (H411) ● Gentagen kontakt kan give tør og revnet hud (EUH066) ● Undgå indånding af spray (P261) ● Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plante-beskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter, kartofler, rødbeder, bønner, hør og sennep ● Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides ● Må i bederoer og rødbeder ikke anvendes senere end 60 dage før høst ● Må i kartofler ikke anvendes senere end 30 dage før høst ● Må i raps og sennep ikke anvendes senere end 90 dage før høst ● Må i ærter og bønner ikke anvendes senere

end 45 dage før høst ● Må i hør ikke anvendes senere end 83 dage før høst ● Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3) ● Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1) ● Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102) ● Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

### FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101) ● I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331) ● VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352) ● VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312) ● VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338) ● VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313) ● Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).



FARE

LJ117920CFR\_DJ


12 x 1 L



# AGIL<sup>®</sup> 100 EC



ADAMA



DENMARK



FARE



**UN3082**

LJJ1792PAAR\_01

48 x 12 L