

BELVEDERE®

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse
i bederoer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af
professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og
kræver gyldig autorisation.



ADAMA

Analyse:

phenmedipham 160 g/L (15.1 % w/w)

desmedipham 160 g/L (15.1 % w/w)

Formulering:

midlet er et suspoemulsionskoncentrat (SE)

Ukrudtsmiddel nr.: 396-55

Virkemåde: HRAC C1

Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse
allergisk reaktion (EUH 208).

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelses-
middelforordningen 1107/2009.

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen

Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 GK Leusden

Holland

www.adama.com

5 Le

© ADAMA Deutschland GmbH

Scan for brug



ANEBELDKSLT/02/A
T4989B/02

BELVEDERE®



Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i sukkerroer og foderroer ikke anvendes senere end vækststadiet 18.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke spøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



FØRSTEHJÆLP

Indånding: Flyt den udsatte til frisk luft. Ved vejrtrækningsproblemer ydes kunstigt åndedræt. Søg lægehjælp

Hudkontakt: Aftag forurenet beklædning. vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 min. Gå til kontrol hos en øjnelæge.

Indtagelse: Giv ikke noget i munden til en bevidstløs person. Søg lægehjælp omgående.

Anvisninger til lægen: Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner). Ingen kendt specifik modgift.



8 718077 006772 >

UN 3082



ANEBELDKSLT/02/B
S4989A/02

BELVEDERE®

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i sukkerroer og foderroer ikke anvendes senere end vækststadiet 18.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke spøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



FØRSTEHJÆLP

Indånding: Flyt den udsatte til frisk luft. Ved vejtrækningsproblemer ydes kunstigt åndedræt. Søg lægehjælp
Hudkontakt: Aftag forurenet beklædning. vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 min. Gå til kontrol hos en øjenlæge.

Indtagelse: Giv ikke noget i munden til en bevidstløs person. Søg lægehjælp omgående.

Anvisninger til lægen: Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner). Ingen kendt specifik modgift.



UN 3082



DENMARK

ANEBELDKSLT/02/B
S4989A/02

Virkemåde

Belvedere® indeholder to aktivstoffer, phenmedipham og desmedipham, som optages ved kontakt med følsomme ukrudtsarters blade og grønne overjordiske dele. Der er ingen jordvirkning af Belvedere®. Belvedere® blokerer fotosyntesen således at bladene afbleges. Afblegningen af de ramte blade ses først mellem nerver og ved bladranden for derefter at afblege hele bladet og til sidst visner hele planten. Roerne inaktiverer og nedbryder aktivstofferne inde i plantecellerne. Dette sker ikke i de følsomme ukrudtsarter.

AFGRØDER, DOSERING OG SPRØJTETIDSPUNKT

Anvendelse

Sukket ukrudtsbekæmpelse i bederoer kræver normalt 3-4 sprøjtninger. Overvintrende ukrudt skal bekæmpes før begyndende jordbehandling.

I nedenstående tabel er angivet den tilladte anvendelse af Belvedere®.

Afgrøde	Skadegører	BBCH	Max. dosis pr behandling	Max. antal behandlinger	Interval mL behandlinger	Max. dosis totalt
Foder- og sukkerroer	Tokimbladet ukrudt	10-18	0,60 L/ha	3	8-14 dage	1,8 L/ha
Foder- og sukkerroer	Tokimbladet ukrudt	10-18	0,45 L/ha	4	8-14 dage	1,8 L/ha

Sprøjtning i roer gennemføres som et sprøjteprogram bestående af flere sprøjtninger – typisk i tankblanding med andre herbicider for at opnå så bred effekt som muligt.

Dosering

Doseringsskemaet kan anvendes som udgangspunkt for den strategi der skal tilpasses til den enkelte mark og ukrudtsflora.

Problem \ tidspunkt	Ukrudt kimbladstadiet	6-8 dage senere	7-14 dage senere	Evt 10-14 dage senere
Bred ukrudtsflora	0,45-0,60 L/ha Belvedere® + Goltix® 700 SC	0,45-0,60 L/ha Belvedere® + Goltix® 700 SC + Ethosat 500 SC	0,45-0,60 L/ha Belvedere® + Goltix® 700 SC + Ethosat 500 SC	0,45 L/ha Belvedere® + Goltix® 700 SC + Safari®

Der må maksimalt anvendes 1,8 L Belvedere® pr. år. Vær også opmærksom på, at der er

mængdemæssige begrænsninger for anvendelse af Goltix®, Ethosat og Safari®. Bliver ukrudtet for stort eller øges intervallerne mellem sprøjtningerne anbefales det at anvende den høje dosering Belvedere® for at opnå den nødvendige effekt på ukrudtet. Vær opmærksom på ukrudtet – det vokser hurtigere end man tror.

Olietilsætning

Tilsætning af olie kan øge virkningen af ukrudtsmidlerne. Doseringen afhænger under normale omstændigheder af temperaturen.

Temperatur	Dosering af olie
Under 15° C	0,5 L/ha
15-20° C	0,25 L/ha
Over 20° C	Olietilsætning undlades

Resistens

Aktivstofferne i Belvedere®, phenmedipham og desmedipham, tilhører begge gruppen af phenyl-carbamater (HRAC C1). Der er i dag ingen kendt resistens hos ukrudsarter overfor disse aktivstoffer og det vurderes også at risikoen for udvikling af resistens er lav da udsprøjtning i roemarken ofte foretages i tankblandinger med andre aktivstofgrupper.

Klimaets indflydelse

En optimal effekt af ukrudtssprøjtning i bederoer opnås ved sprøjtning på saftspændte planter under gunstige vækstforhold. Normalt bør der sprøjtes om morgenen eller først på dagen. Ved overgang til varmt og solrigt vejr vil en behandling virke meget kraftigt på såvel roer som ukrudt grundet det tynde vokslag på planterne. I sådanne situationer anbefales i stedet en behandling sidst på dagen. Der bør ikke sprøjtes hvis temperaturen kommer i nærheden af eller under frysepunktet.

Jordtype og jordfugt

Da Belvedere® kun optages i bladene har jordtype ingen indflydelse på virkningen. Derfor er Belvedere® også særdeles effektiv på humusjorde.

SPRØJTETEKNIK

Sprøjteteknikken spiller en stor rolle for det endelige resultat. Anvendelse af dyser som giver små dråber, der lettere bliver på bladoverfladen er af afgørende betydning for at opnå optimal effekt. Under gode sprøjteforhold kan almindelige fladsprededyser anbefales. Under knap så optimale forhold kan Lowdrift dyser anbefales.

Dyse	Tryk	Hastighed	Vandmængde
ISO 110-01 (orange)	3,0 bar	5,0 km/t	95 L/ha
ISO 110-015 (grøn)	2,0 bar	6,0 km/t	95 L/ha
ISO 110-02 (gul)	2,5 bar	7,0 km/t	125 L/ha

Omsåning/efterfølgende afgrøde

Da Belvedere® kun optages gennem bladene på planter og ukrudt og ikke har nogen jordeffekt er der ingen restriktioner ved omsåning og efterfølgende afgrøde.

TANKBLANDINGER

Der bør under normale omstændigheder være mindst 8 dage mellem behandlingerne. Græsukrudt bør først behandles når disse har overvundet en eventuel svidning fra bladspøjtningerne. Belvedere® kan blandes med Goltix® 700 SC, Ethosat 500 SC, Safari®, Ethosan®, Pirimor, manganchelat, penetreringsolie og pyrethroider. Følg normale anvisninger for sammenblanding og læs samtlige etiketter.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæsken kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæsken skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1752 af 14. december 2015.

LAGERING/OPBEVARING

Belvedere® skal opbevares køligt men frostfrit. Opbevaring skal ske i lukkede, orginaldunke.

TOM EMBALLAGE

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæskan. Emballagen må ikke genbruges

PRODUKTANSVAR

ADAMA fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres leverandør. Vigtigt: Læs altid advarselsteksten før brug.

Registrerede varemærker:

Belvedere® - ADAMA Deutschland GmbH;

Goltix® - ADAMA Quena N.V.;

Ethosan® - Bayer A/S;

Safari® - E.I. du Pont de Nemours & Company;

Pirimor® - Syngenta Ltd.

BELVEDERE®

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Analyse:

phenmedipham 160 g/L (15.1 % w/w)

desmedipham 160 g/L (15.1 % w/w)

Formulering:

midlet er et suspoemulsionskoncentrat (SE)

Ukrudtsmiddel nr.: 396-55

Virkemåde: HRAC C1

Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen

Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 GK Leusden

Holland

www.adama.com

© ADAMA Deutschland GmbH

4 x 5 L



ADAMA

ANEBELDK5LT/02/C1
14989C/02

BELVEDERE®

BELVEDERE®

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.



ADAMA

Analyse:

phenmedipham 160 g/L (15.1 % w/w)

desmedipham 160 g/L (15.1 % w/w)

Formulering:

midlet er et suspoemulsionskoncentrat (SE)

Ukrudtsmiddel nr.: 396-55

Virkemåde: HRAC C1

Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen

Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 GK Leusden

Holland

www.adama.com

© ADAMA Deutschland GmbH

4 x 5 L

Scan for brug



Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i sukkerroer og foderroer ikke anvendes senere end vækststadiet 18.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke spøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



FØRSTEHJÆLP

Indånding: Flyt den udsatte til frisk luft. Ved vejrtrækningsproblemer ydes kunstigt åndedræt. Søg lægehjælp

Hudkontakt: Aftag forurenede beklædning. vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 min. Gå til kontrol hos en øjenlæge.

Indtagelse: Giv ikke noget i munden til en bevidstløs person. Søg lægehjælp omgående.

Anvisninger til lægen: Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner). Ingen kendt specifik modgift.



8 718077 006789 >


UN 3082



DENMARK


ANBELDKSLT/02/CZ
T4989D/02

BELVEDERE®



DENMARK

30 x 20 L



8 718077 010519 >



ANEBELDK5LT/02/X
T4989P/02

ADAMA
Northern Europe B.V.