

GOLTIX® 70 WG

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer, rødbeder og jordbær.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.



ADAMA

Analyse:

Metamitron 700 g/kg (70 % w/w)

Miljøstyrelsen anbefaler ikke anvendelsen af mineralske olier som adjuvant.

Formulering:

Midlet er et vanddispergerbart granulat

Ukrudtsmiddel nr.: 396-69

Virkemåde: HRAC C1: inhibering af fotosystem II

Midlet indeholder Natrium alkyl C12-14 sulfater

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Fabrikationsnummer og produktionsdato:

se emballagen

Holdbarhed:

Minimum 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 GK Leusden

Holland

www.adama.com

© ADAMA Quena N.V.

5 KG e



GOLTIX® 70 WG

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer, rødbeder og jordbær. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Farlig ved indtagelse (H302).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.
Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer, rødbeder og jordbær.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i bederoer og rødbeder ikke anvendes senere end vækststadium 18.
Behandling højst hver tredje år på samme mark.
Må i jordbær kun anvendes før blomstring eller efter høst.
Behandling højst hver tredje år på samme mark.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Ved inspektion af afgrøder efter behandling skal der anvendes kemisk bestandige handsker.
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



FØRSTEHJÆLP
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Indånding Fjern personen fra det farlige område. Sørg for frisk luft og kontakt læge alt efter symptomer.
Hudkontakt Fjern omgående forurenen, gennemvædet beklædning, vask grundigt med rigeligt vand og sæbe, ved hudirritation (rødme etc.), opsig læge.
Øjenkontakt Tag kontaktlinser ud. Skyl grundigt med vand i flere minutter, kontakt læge om nødvendigt.
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P301+P312).

BRUGSANVISNING

Goltix® 70 WG er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af frøukrudt, herunder enårig rapgræs, i bederoer, rødbeder og jordbær.

Virkning
Goltix® 70 WG anvendes på fremspiret ukrudt og virker da som både jord- og bladmiddel. Der opnås god virkning over for de fleste frøukrudsarter. Ikke rettidig udført sprøjtning medfører for store ukrudtsplanter og dermed en usikker virkning. Der er ingen virkning mod kvik, tidsler og andet rodukrudt, når fremspringen sker fra roden.

Behandling i sukkerroer, foderroer og rødbeder
Overvintrende ukrudt skal bekæmpes før begyndende jordbearbejdning. Bekæmpelse i afgrøden udføres på ukrudt på kimbladsstadiet, eller når det vurderes, at virkning af tidligere behandlinger ikke har bekæmpet ukrudtet tilstrækkeligt.
Goltix® 70 WG bør anvendes i et sprøjteprogram med andre herbicider. Første sprøjtning udføres efter fremspiring af roerne, når ukrudtet er på kimbladsstadiet, anden sprøjtning udføres 7-14 dage senere og efter behov udføres en tredje og fjerde sprøjtning med 10 dages interval mellem behandlingerne.
Goltix® 70 WG må i sukkerroer, foderroer og rødbeder ikke anvendes senere end vækststadium 18. Der må maksimalt anvendes 1 kg/ha Goltix® 70 WG pr behandling og maksimalt 4 behandlinger pr vækstsæson (se nedenstående skema). Den samlede dosering i en vækstsæson må ikke overstige 3,0 kg/ha.

Goltix® 70 WG må kun anvendes hvert tredje år på samme areal.

Behandlings-tidspunkt	Max. antal behandlinger	Interval mellem behandlinger	Max. dosering pr behandling	Max dosering pr. vækstår
BBCH 10-18	4	7-14 dage	1,0 kg/ha	3,0 kg/ha

Vandmængde: 100-300 L/ha.

Doseringer
Ved rigtig anvendelse af Goltix® 70 WG i kombination med blandingspartnere vil de angivne doseringer normalt efterlade marken ukrudtsfri helt til optagning. Hvor ukrudtsmængden er stor eller under tørre forhold tilrådes det at dele mængden på 4 sprøjtninger i bederoer og evt. kombinere med radrensning for at holde afgrøden ukrudtsfri frem til optagning.

Behandling i jordbær, nyplantede og etablerede marker
Bekæmpelse i jordbær udføres på ukrudt på kimbladsstadiet eller når det vurderes, at virkning af tidligere behandlinger ikke har bekæmpet ukrudtet tilstrækkeligt. Goltix® 70 WG bør anvendes i et sprøjteprogram med andre roerherbicider.

Nyplantede marker (forår brug): Behandling foretages tidligst 14 dage efter plantning og senest inden begyndende blomstring. Det er muligt at gentage behandlingen efter minimum 10 dage under forudsætning af at jordbærplanterne ikke har startet blomstringen.

Maksimal dosering af Goltix® 70 WG pr. behandling er 1,0 kg/ha og maksimal dosering pr. vækstsæson er 2,0 kg/ha. Goltix® 70 WG må kun anvendes hvert tredje år på samme areal.

Etablerede marker: Det er muligt at foretage to behandlinger med Goltix® 70 WG i etablerede jordbærmarker. Der kan behandles 2 gange inden blomstring eller en gang inden blomstring og en gang efter plukning af jordbærrørene.
Maksimal dosering af Goltix® 70 WG pr. behandling er 1,0 kg/ha og maksimal dosering pr. vækstsæson er 2,0 kg/ha. Goltix® 70 WG må kun anvendes hvert tredje år på samme areal.

Behandlings-tidspunkt	Tidspunkt	Max. antal behandlinger	Minimum interval mellem behandlinger	Max. dosering pr behandling	Max. dosering pr. vækstsæson
Nyplantede marker (forår brug):	Min. 14 dage efter plantning og inden begyndende blomstring	2	10 dage	1,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Etablerede marker:	2 behandlinger inden blomstring <i>eller</i> 1 behandling inden blomstring og 1 behandling efter plukning	2	10 dage	1,0 kg/ha	2,0 kg/ha

Vandmængde 200-300 L/ha

Tilsætning af olie
For opnåelse af optimal virkning, bør der altid tilsættes olie til blandingerne, så længe dagtemperaturen ikke er højere end 22° C. Olietilsætning bør dog ikke foretages de første 3-4 dage efter vejrskifte fra køligt og fugtigt vejr til varmt og tørt vejr. Under ekstremt tørre forhold, med kraftig vokslag på planternes blade, kan det være påkrævet at anvende den høje oliedosering ved temperaturer helt op til 25° C. Til alle sprøjteplaner tilsættes penetreringsolie f.eks. Renol®.

Olie doseres efter temperaturen:

Temperatur	Renol®, L/ha	Super olie/Sun-Oil 33E, L/ha
10 - 15° C	0,5	1,0
15 - 22° C	0,25	0,5
over 22° C	0	0

Omsåning
Har klimatiske forhold gjort det nødvendigt at foretage omsåning, kan der med det samme og uden pløjning igen sås bederoer, rødbeder og plantes jordbær. Hvis der sås roer igen vær da opmærksom på, at den maksimale mængde Goltix® 70 WG ikke overskrides på arealet. Efter grundig pløjning kan der dyrkes kartofler og majs. Ved grundig jordbehandling kan der 3 måneder efter sidste behandling med Goltix® 70 WG sås vintersæd. Foråret efter anvendelse af Goltix® 70 WG er der ingen restriktioner på efterfølgende afgrøder.

Forhold, der har indflydelse på Goltix® 70 WG’s virkning:
Som bladmiddel:
Uanset fugtighedsforhold er Goltix® 70 WG’s bladvirkning så kraftig, i blanding med andre midler, at der opnås bedre virkning ved at sprøjte på ukrudtets rette udviklingstrin end ved at vente på fugtige forhold. Bedst virkning opnås ved høj luftfugtighed, f.eks. morgensprøjtning, temperaturer over 15° C og på småt ukrudt. Ved kraftig sol og dagtemperatur over 25° C - specielt efter en fugtig evt. kølig periode – bør sprøjtningen foretages sidst på dagen. Evt. reduceres doseringen af phenmedipham i tankblandingen. Roerne skal være sunde. Er planterne skadede af sandflugt eller lign. udskydes sprøjtning 8 dage. I perioder med kraftige temperatursvingninger mellem dag og nat kan der på unge kulturplanter opstå svidninger. Sprøjtning i perioder med frost frarådes. Efter frost må der først sprøjtes efter 2-3 dage.

Som jordmiddel:
Den del af midlet, der rammer på jorden, virker som jordmiddel. Det er med til at dæmpe nyfremspiring og svække senere fremspirende ukrudtsplanter. Fugtigheden i jordoverfladen fremmer denne virkning. Neddør efter sprøjtningen øger virkningen.

Anden sprøjtning:
Efter anvendelse af kvik- og græsmidler, bør der ventes 5 dage, før der anvendes Goltix® 70 WG. Før sprøjtning med kvik- og græsmidler bør græsukrudtets blade have overvundet en eventuel svidning fra Goltix® 70 WG behandlingen.

TANKBLANDING

Udover de her nævnte midler findes flere tilsvarende mærker, hvor firmaerne angiver blandingsmulighed.

Goltix® 70 WG kan blandes med:
Ukrudtsmidler: Belvedere®, Kontakt® 320 SC, Betanal®, Betanal® Power, Safari®
Penetreringsolie: Renol® m.fl.
Insektmidler: Iblanding af insektmidler kan øge aggressiviteten overfor roerne. Benyt derfor kun insektmidler, hvor firmaet tager ansvar for blandingen ved at angive den på insektmidlets etikette.

Læs altid etiketten for blandingsprodukterne inden opblanding i sprøjten.

Resistens
Aktivstoffet i Goltix® 70 WG, metamitron, tilhører gruppe C1 i henhold til HRAC og påvirker fotosyntesen i fotosystem 2. Med den anbefalede anvendelse anses risikoen for udvikling af resistens for at være lille. For nærværende er der i Europa enkelte kendte tilfælde af resistent ukrudt som ikke bekæmpes af metamitron. Der er i Danmark ingen kendte tilfælde af resistent ukrudt, som ikke bekæmpes af metamitron.

For at undgå udvikling af resistens hos ukrudtsarterne anbefales følgende:

- Følg skadetærsklen
- Sprøjtning bør udføres under optimale betingelser
- Ved gentagne behandlinger anvendes et produkt med en anden virkningsmekanisme
- Brug den bedste sprøjteeknologi
- Anvend Goltix® 70 WG i et sprøjteprogram med andre herbicider eller skift mellem herbicider med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle ukrudtsarter.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Under tilberedningen af sprøjtevæsken og kørsel skal sprøjtebeholderens omrører være i gang. Beholderen fyldes halvt med vand, tilsæt den beregnede mængde Goltix® 70 WG. Hold omrøreren i gang og tilsæt evt. blandingspartnere. Fyld herefter tanken op med vand samtidig med at omrøreren holdes i gang. Goltix® 70 WG skal tilsættes langsomt under omrøring så granulatet opløser sig når det kommer i vand.

RENGØRING

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæske kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.

TOM EMBALLAGE

Indholdt/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til kommunens affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

OPBEVARING

Frostfrit, tørt og væk fra fødevarer, foder og drikkevarer.

PRODUKTANSVAR

ADAMA fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til deres leverandør.

Registrerede varemærker:
Betanal® - Bayer Intellectual Property GmbH;
Belvedere®- ADAMA Deutschland GmbH;
Goltix® - ADAMA Quena N.V.;
Kontakt® 320 SC – ADAMA Irvita Ltd.;
Renol® - Nordisk Alkali;
Safari® - E.I. du Pont de Nemours & Company.



8 718077 010021 >

UN 3077



DENMARK

GOLTIX® 70 WG



ADAMA

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til anvendes til bekæmpelse af frøkrudt i bederoer, rødbeder og jordbær.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Analyse:

Metamitron 700 g/kg (70 % w/w)

Miljøstyrelsen anbefaler ikke anvendelsen af mineralske olier som adjuvant.

Formulering:

Midlet er et vanddispergerbart granulat

Ukrudtsmiddel nr.: 396-69

Virkemåde: HRAC C1: inhibering af fotosystem II

Midlet indeholder Natrium alkyl C12-14 sulfat

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Fabrikationsnummer og produktionsdato:

se emballagen

Holdbarhed:

Minimum 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 GK Leusden

Holland

www.adama.com

* ADAMA Quena N.V.

5 KG e

Tilsætning af olie

For opnåelse af optimal virkning, bør der altid tilsættes olie til blandingerne, så længe dagtemperaturen ikke er højere end 22° C. Olie-tilsætning bør dog ikke foretages de første 3-4 dage efter vejrskifte fra koldt og fugtigt vejr til varmt og tørt vejr. Under ekstremt tørre forhold, med kraftig voksløg på planternes blade, kan det være påkrævet at anvende den høje alledosering ved temperaturer helt op til 25° C. Til alle sprøjteplaner tilsættes penetreringsolie f.eks. Renol®.

Olie doseres efter temperaturen:

Temperatur	Renol®, L/ha	Super olie/Sun-Oil 33E, L/ha
10 - 15° C	0,5	1,0
15 - 22° C	0,25	0,5
over 22° C	0	0

Omsåning

Har klimatiske forhold gjort det nødvendigt at foretage omsåning, kan der med det samme og uden pløjning igen sås bederoer, rødbeder og plantes jordbær. Hvis der sås roer igen vær da opmærksom på, at den maksimale mængde Goltix® 70 WG ikke overskrides på arealet. Efter grundig pløjning kan der dyrkes kartoffer og majs. Ved grundig jordbehandling kan der 3 måneder efter sidste behandling med Goltix® 70 WG sås vintersæd. Foråret efter anvendelse af Goltix® 70 WG er der ingen restriktioner på efterfølgende afgrøder.

Forhold, der har indflydelse på Goltix® 70 WG's virkning:

Som bladmiddel:

Uanset fugtighedsforhold er Goltix® 70 WG's bladvirkning så kraftig, i blanding med andre midler, at der opnås bedre virkning ved at sprøjte på ukrudtets rette udviklingstrin end ved at vente på fugtige forhold. Bedst virkning opnås ved høj luftfugtighed, f.eks. morgensprøjtning, temperaturer over 15° C og på småt ukrudt. Ved kraftig sol og dagtemperatur over 25° C - specielt efter en fugtig evt. kelig periode - bør sprøjtningen foretages sidst på dagen. Evt. reduceres doseringen af phenmedipham i tankblandingen. Roerne skal være sunde. Er planterne skadede af sandflugt eller lign. udsydes sprøjtning 8 dage i perioder med kraftige temperatursvingninger mellem dag og nat kan der på unge kulturplanter opstå svindinger. Sprøjtning i perioder med frost frarådes. Efter frost må der først sprøjtes efter 2-3 dage.

Som jordmiddel:

Den del af midlet, der rammer på jorden, virker som jordmiddel. Det er med til at dæmpe nyfremspiring og svække senere fremspirende ukrudtsplanter. Fugtigheden i jordoverfladen fremmer denne virkning. Nedbør efter sprøjtningen øger virkningen.

Anden sprøjtning:

Efter anvendelse af kvik- og græsmidler, bør der ventes 5 dage, før der anvendes Goltix® 70 WG. Før sprøjtning med kvik- og græsmidler bør græskrudtets blade have overvundet en eventuel svindning fra Goltix® 70 WG behandlingen.

TANKBLANDING

Udover de her nævnte midler findes flere tilsvarende mærker, hvor firmaerne angiver blandingsmulighed.

Goltix® 70 WG kan blandes med:

Ukrudtsmidler: Belvedere®, Kontakt® 320 SC, Betanal®, Betanal® Power, Safari®

Penetreringsolie: Renol® m.fl.

Insektmidler: Iblanding af insektmidler kan øge aggressiviteten overfor roerne. Benyt derfor kun insektmidler, hvor firmaet tager ansvar for blandingen ved at angive den på insektmidlets etikette.

Læs altid etiketten for blandsproduktterne inden opblanding i sprøjten.

Resistens

Aktivstoffet i Goltix® 70 WG, metamitron, tilhører gruppe C1 i henhold til HRAC og påvirker fotosyntesen i fotosystem 2. Med den anbefalede anvendelse anses risikoen for udvikling af resistens for at være lille. For nærværende er der i Europa enkelte kendte tilfælde af resistent ukrudt som ikke bekæmpes af metamitron. Der er i Danmark ingen kendte tilfælde af resistent ukrudt, som ikke bekæmpes af metamitron.

For at undgå udvikling af resistens hos ukrudtsarterne anbefales følgende:

- Følg skadetærsklen
- Sprøjtning bør udføres under optimale betingelser
- Ved gentagne behandlinger anvendes et produkt med en anden virkningsmekanisme
- Brug den bedste sprøjte teknologi
- Anvend Goltix® 70 WG i et sprøjteprogram med andre herbicider eller skift mellem herbicider med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle ukrudtsarter.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæskens begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Under tilberedningen af sprøjtevæsken og kørsel skal sprøjtebeholderens omrører være i gang. Beholderen fyldes halvt med vand, tilsæt den beregnede mængde Goltix® 70 WG. Hold omrøreren i gang og tilsæt evt. blandspartners. Fyld herefter tanken op med vand samtidig med at omrøreren holdes i gang. Goltix® 70 WG skal tilsættes langsomt under omrøring så granulatet opløser sig når det kommer i vand.

RENGØRING

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæske kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamlles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.

TOM EMBALLAGE

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

OPBEVARING

Frostfrit, tørt og væk fra fødevarer, foder og drikkevarer.

PRODUKTANSVAR

ADAMA fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til deres leverandør.

Registrerede varemærker:

Betanal® - Bayer Intellectual Property GmbH;

Belvedere® - ADAMA Deutschland GmbH;

Goltix® - ADAMA Quena N.V.;

Kontakt® 320 SC - ADAMA Irvita Ltd.;

Renol® - Nordisk Alkali;

Safari® - E.I. du Pont de Nemours & Company.

Må kun anvendes til anvendes til bekæmpelse af frøkrudt i bederoer, rødbeder og jordbær.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Farlig ved indtagelse (H302).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til anvendes til bekæmpelse af frøkrudt i bederoer, rødbeder og jordbær.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i bederoer og rødbeder ikke anvendes senere end vækststadium 18. Behandling højst hver tredje år på samme mark.

Må i jordbær kun anvendes før blomstring eller efter høst.

Behandling højst hver tredje år på samme mark.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Ved inspektion af afgrøder efter behandling skal der anvendes kemisk bestandige handsker.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Indånding Fjern personen fra det farlige område. Sørg for frisk luft og kontakt læge alt efter symptomer.

Hudkontakt Fjern omgående forurenet, gennemvædet beklædning, vask grundigt med rigeligt vand og sæbe, ved hudirritation (rødme etc.), opsig læge.

Øjenkontakt Tag kontaktlinser ud. Skyl grundigt med vand i flere minutter, kontakt læge om nødvendigt.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P301+P312).

BRUGSANVISNING

Goltix® 70 WG er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af frøkrudt, herunder enårig rapgræs, i bederoer, rødbeder og jordbær.

Virkning

Goltix® 70 WG anvendes på fremspiret ukrudt og virker da som både jord- og bladmiddel. Der opnås god virkning over for de fleste frøkrudtsarter. Ikke rettidig udført sprøjtning medfører for store ukrudtsplanter og dermed en usikker virkning. Der er ingen virkning mod kvik, tidsler og andet rodkrudt, når fremspiringen sker fra roden.

Behandling i sukkerroer, foderroer og rødbeder

Overvintrende ukrudt skal bekæmpes før begyndende jordbearbejdning. Bekæmpelse i afgrøden udføres på ukrudt på kimbladsstadiet, eller når det vurderes, at virkning af tidligere behandlinger ikke har bekæmpet ukrudtet tilstrækkeligt.

Goltix® 70 WG bør anvendes i et sprøjteprogram med andre herbicider. Første sprøjtning udføres efter fremspiring af roerne, når ukrudtet er på kimbladsstadiet, anden sprøjtning udføres 7-14 dage senere og efter behov udføres en tredje og fjerde sprøjtning med 10 dages interval mellem behandlinger. Goltix® 70 WG må i sukkerroer, foderroer og rødbeder ikke anvendes senere end vækststadium 18. Der må maksimalt anvendes 1 kg/ha Goltix® 70 WG pr. behandling og maksimalt 4 behandlinger pr. vækstsæson (se nedenstående skema). Den samlede dosering i en vækstsæson må ikke overstige 3,0 kg/ha.

Goltix® 70 WG må kun anvendes hvert tredje år på samme areal.

Behandlings-tidspunkt	Max. antal behandlinger	Interval mellem behandlinger	Max. dosering pr. behandling	Max dosering pr. vækstår
BBCH 10-18	4	7-14 dage	1,0 kg/ha	3,0 kg/ha

Vandmængde: 100-300 L/ha.

Doseringer

Ved rigtig anvendelse af Goltix® 70 WG i kombination med blandspartners vil de angivne doseringer normalt efterlade marken ukrudtsfri helt til optagning. Hvor ukrudtsmængden er stor eller under tørre forhold tilrådes det at dele mængden på 4 sprøjtninger i bederoer og evt. kombinere med radrensning for at holde afgrøden ukrudtsfri frem til optagning.

Behandling i jordbær, nyplantede og etablerede marker

Bekæmpelse i jordbær udføres på ukrudt på kimbladsstadiet eller når det vurderes, at virkning af tidligere behandlinger ikke har bekæmpet ukrudtet tilstrækkeligt. Goltix® 70 WG bør anvendes i et sprøjteprogram med andre roerherbicider.

Nyplantede marker (forår brug): Behandling foretages tidligst 14 dage efter plantning og senest inden begyndende blomstring. Det er muligt at gentage behandlingen efter minimum 10 dage under forudsætning af at jordbærplanterne ikke har startet blomstringen.

Maksimal dosering af Goltix® 70 WG pr. behandling er 1,0 kg/ha og maksimal dosering pr. vækstsæson er 2,0 kg/ha. Goltix® 70 WG må kun anvendes hvert tredje år på samme areal.

Etablerede marker: Det er muligt at foretage to behandlinger med Goltix® 70 WG i etablerede jordbærmarker. Der kan behandles 2 gange inden blomstring eller en gang inden blomstring og en gang efter plukning af jordbærrene.

Maksimal dosering af Goltix® 70 WG pr. behandling er 1,0 kg/ha og maksimal dosering pr. vækstsæson er 2,0 kg/ha. Goltix® 70 WG må kun anvendes hvert tredje år på samme areal.

Behandlings-tidspunkt	Tidspunkt	Max. antal behandlinger	Minimum interval mellem behandlinger	Max. dosering pr. behandling	Max. dosering pr. vækstsæson
Nyplantede marker (forår brug):	Min. 14 dage efter plantning og inden begyndende blomstring	2	10 dage	1,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Etablerede marker:	2 behandlinger inden blomstring eller 1 behandling inden blomstring og 1 behandling efter plukning	2	10 dage	1,0 kg/ha	2,0 kg/ha

Vandmængde 200-300 L/ha

ANEGOLDK5KG/01/BG

GOLTIX® 70 WG

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af frøkrudt i bederoer, rødbeder og jordbær.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (P101).
Meget giftig ved indtagelse (H302).
Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P364).
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilrettelæsen har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.
Las nærmere det eventuelt foretagne sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af frøkrudt i bederoer, rødbeder og jordbær.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i bederoer og rødbeder ikke anvendes senere end vækststadium 18. Behandling højest hver tredje år på samme mark.
Må i jordbær kun anvendes før blomstring eller efter høst. Behandling højest hver tredje år på samme mark.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for et beskytte organismer, der lever i vand (P343).
Må ikke anvendes nærmere end 3 meter fra græsområder for at beskytte vilde planter (P343).
Undgå forening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestyrt nær overfladvand (P31).
Ved inspektion af afgrøder efter behandling skal der anvendes kemisk bestandige handsker.
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



FØRSTEHJÆP
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Indånding (fjern personen fra det forurenede område. Sørg for frisk luft og kontakt læge alt efter symptomer).
Hudsymptomer: Fjern omgående forurenet, gennemvasket beklædning, vask grundigt med rindende vand og sæbe, ved hudirritation (redne etc.), opsig læge.
Øjenkontakt: Tag kontaktlinser ud. Vask grundigt med vand i flere minutter, kontakt læge om nødvendigt.
TILFØJELSE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P301+P332).

BRUGSANVISNING
Goltix® 70 WG er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af frøkrudt, herunder endog røggræs, i bederoer, rødbeder og jordbær.

Virkning
Goltix® 70 WG anvendes på fremsprøjt ukrudt og virker på som både jord- og bløddmiddel. Der opnås god virkning over for de fleste frøkrudtsarter, ikke retsigt udført sprøjtning medfører for store ukrudtsplanter og dermed en ufuldstændig virkning. Der er ingen virkning mod kvik, tilster og andet rodkrudt, når fremsprøjtning sker fra roerne.

Behandling i sukkerroer, foderroer og rødbeder
Overvintrende ukrudt skal bekæmpes før begyndende jordbearbejdning. Bekæmpelse i efteråret udføres på ukrudt på kimblødsstadiet, eller når det vurderes, at virkning af tidligere behandlinger ikke har bekæmpet ukrudtet tilstrækkeligt.
Goltix® 70 WG bør anvendes i et sprøjteprogram med andre herbicider. Første sprøjtning udføres efter fremsprøjt af roerne, når ukrudtet er på kimblødsstadiet, anden sprøjtning udføres 7-14 dage senere og efter behov udføres en tredje og fjerde sprøjtning med 10 dages interval mellem behandlinger. Goltix® 70 WG må i sukkerroer, foderroer og rødbeder ikke anvendes senere end vækststadium 18. Der må maksimalt anvendes 1 kg/ha Goltix® 70 WG pr. behandling og maksimalt 4 behandlinger pr. vækstsæson (se nedenstående skema). Den samlede dosering i en vækstsæson må ikke overstige 3,0 kg/ha.

Behandlings-tidspunkt	Max. antal behandlinger	Interval mellem behandlinger	Max. dosering pr. behandling	Max. dosering pr. vækstsæson
BBC10-18	4	7-14 dage	1,0 kg/ha	3,0 kg/ha


Vandmængde: 100-300 L/ha.
Dosering
Ved rigtig anvendelse af Goltix® 70 WG i kombination med bløddingspartnere vil de angivne doseringer normalt effektivt marken ukrudtsfri helt til oplysning. Hvor ukrudtsmængden er stor eller under tære forhold trindes det at dele mængden på 4 sprøjter i bederoer og evt. kombineres med røttening for at helde afgrøden ukrudtsfri frem til oplysning.

Behandling i jordbær, nyslantede og etablerede marker
Bekæmpelse i jordbær udføres på kimblødsstadiet eller når det vurderes, at virkning af tidligere behandlinger ikke har bekæmpet ukrudtet tilstrækkeligt. Goltix® 70 WG bør anvendes i et sprøjteprogram med andre herbicider.

Nyslantede marker (første brug): Behandling foretages tidligst 14 dage efter plantning og senest inden begyndende blomstring. Det er muligt at gentage behandlingen efter minimum 10 dage under forudsætning af at jordbærplanterne ikke har startet blomstringen.
Maksimal dosering af Goltix® 70 WG pr. behandling er 1,0 kg/ha og maksimal dosering pr. vækstsæson er 2,0 kg/ha. Goltix® 70 WG må kun anvendes hvert tredje år på samme areal.

Behandlings-tidspunkt	Tidspunkt	Max. antal behandlinger	Minimum interval mellem behandlinger	Max. dosering pr. behandling	Max. dosering pr. vækstsæson
Nyslantede marker (første brug):	Min. 14 dage efter plantning og inden begyndende blomstring	2	10 dage	1,0 kg/ha	2,0 kg/ha
Etablerede marker:	2 behandlinger inden blomstring eller i behandling efter blomstring og i behandling efter plukning	2	10 dage	1,0 kg/ha	2,0 kg/ha

Vandmængde: 200-300 L/ha



Tilskærmning af olie
For opnåelse af optimal virkning, bør der altid tilsættes olie til blandingerne, så længe dagtemperaturen ikke er højere end 22° C. Olieindsætning bør dog ikke foretages de første 3-4 dage efter vejrskifte fra koldt og fugtigt vejr til varmt og tørt vejr. Under ekstremt tære forhold, med kraftig volds på planternes blade, kan det være påkrævet at anvende den lige olieindsætning ved temperaturen helt op til 25° C. I alle sprøjtplanter tilskrives penetreringsolie f.eks. Renol®.

Temperatur	Renol®, L/ha	Super olie/Sun-Dil 33E, L/ha
10 - 19° C	0,5	1,0
15 - 21° C	0,25	0,5
over 22° C	0	0

Omroding
Har klimatiske forhold gjort det nødvendigt at foretage omroding, kan der med det samme og uden pløjning igen sås bederoer, rødbeder og planter i jordbær. Hvis der sås nye igen væk da omroddet skal på, at den maksimale mængde Goltix® 70 WG ikke overskrides på arealet. Efter grundig pløjning kan der dyrkes kartofler og majs. Ved grundig jordbehandling kan der 3 måneder efter sidste behandling med Goltix® 70 WG sås vintersæd. Fordet efter anvendelse af Goltix® 70 WG er der ingen restriktioner på efterfølgende afgrøder.

Forhold, der har indflydelse på Goltix® 70 WG's virkning:
Soltilstrømning:
Uønsket fugtighedsforhold er Goltix® 70 WG's bløddvirkning så kraftig, i blanding med andre midler, at der opnås bedre virkning ved et sprøjt på ukrudtets rette udviklingsstadiet end ved et væk på fugtige forhold. Bedst virkning opnås ved høj luftfugtighed, f.eks. morgensprøjtning, temperaturer over 10° C og på smalt ukrudt. Ved kraftig sol og dagtemperatur over 25° C – specielt efter en fugtig og kold periode – bør sprøjtningen foretages sidst på dagen. Et reduceres doseringen af phenmedipham i kombinationen. Roerne skal være sunde. Et planterne skuddet af sandflugt eller lign. udslykkes sprøjtning 8 dage i perioder med kraftige temperatursvingninger mellem dag og nat kan der på unge kulturplanter opnås svindinger. Sprøjtning i perioder med frost forrådes. Efter frost må der først sprøjtes efter 2-3 dage.

Sam jordmidler:
Der er et midler, der kommer på jorden, virker som jordmiddel. Det er med til at dæmpe ryfsmængde og svække senere fremtidige ukrudtsplanter. Fugtigheden i jordoverfladen fremmer denne virkning. Næder efter sprøjtningen også virkning.
Anden sprøjtning:
Efter anvendelse af kvik- og græsmidler, bør der ventes 5 dage, før der anvendes Goltix® 70 WG. Før sprøjtning med kvik- og græsmidler bør græsudskudt blade have overvundet en eventuel svindning fra Goltix® 70 WG behandlingen.

TANKBLANDING
Udover de her nævnte midler findes flere tilsvarende mærker, hvor firmaerne angiver blandingmulighed.

Goltix® 70 WG kan blandes med:
Ukrudtsmidler: Behedere® Kontak® 320 SC, Betanol® Power, Safar®
Pestitsidier: Renol®
Insektmidler: Blandning af insektmidler kan øge aggressiviteten overfor roerne. Benyt derfor kun insektmidler, hvor fremst lever ansvaret for blandingen ved at angive den på insektmidlets etikette. Las altid etiketten for blandingen i den oplagning i sprøjten.

Resistens
Aktivitet i Goltix® 70 WG, metatriton, tilhører gruppe C1 i henhold til HRAC og påvirker fotosyntesen i fotosystem 2. Med den anbefalede anvendelse anses risikoen for udvikling af resistens for at være lille. For nærmere se der i Europa enkelte kendte tilfælde af resistent ukrudt som ikke bekæmpes af metatriton. Der er i Danmark ingen kendte tilfælde af resistent ukrudt, som ikke bekæmpes af metatriton.

For at undgå udvikling af resistens hos ukrudtsarterne anbefales følgende:
• Fugl, akrobatisk
• Sprøjtning bør udføres under optimale betingelser
• Ved gentagne behandlinger anvendes et produkt med en anden virkningsmekanisme
• Brug den bedste sprøjteeknologi
• Anvend Goltix® 70 WG i et sprøjteprogram med andre herbicider eller skift mellem herbicider med andre virkningsmekanismer, som har god effekt over for de aktuelle ukrudtsarter.

VEDRISTNING AF SPRØJTEVÆSKEN
Sårg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterfølgende for bløddingspartnere inden tilberedning af sprøjtevæsken begynder. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteegge i andre afgrøder.

Under tilberedningen af sprøjtevæsken og kørst skal sprøjtebeholderens omrører være i gang. Beholderen fyldes helt med vand, tilsat den beregnede mængde Goltix® 70 WG. Hold omrøreren i gang og tilsat evt. bløddingspartnere. Fyld herefter tanken op med vand samtidig med at omrøreren holdes i gang. Goltix® 70 WG skal tilskrives langsomt under omrøring så granulater opløses og når det kommer i vand.

RENGØRING
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledejer til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet til at vaskesprøjteværket kan fortrykkes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Renssprøjteværket skal på passende vis fortrykkes 20 gange med vand og udslykkes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med opvaskerengøringsmidler (se evt. etiketten på det uldt angivne middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og ører kontrolleres for urenheder og eventuelle beskadigelser. Vaskemidlet opbevares i egne beholdere og udskrives iht. gældende regler.
I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning omgående opfyldning og vask af sprøjt til udførelse af bekæmpelsesmidler, Jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.

TOM EMBALLAGE
Indholder/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldsindsamling (P501). Rester skal efterveses til den kommunale affaldsindsamling for forligst affald.
Tømme beholdere kan bortskaffes med dogrenovationen.
Emballagen må ikke genbruges.

OPBEVARING
Frostfrit, tørt og væk fra fødevarer, foder og drikkevarer.

PRODUKTANSVAR
ADAMA forlægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forkertfremstillet oplysning og/eller anvendelse af produktet. Ved tvistepargang læses Da venligst rette henvendelse til deres leverandør.

Registrerede varemærker:
Betanol® – Bayer Intellectual Property GmbH,
Behedere®, ADAMA Deutschland GmbH,
Goltix® – ADAMA Quano N.V.,
Kontak® 320 SC – ADAMA (vita) Ltd.,
Renol® – Nordisk Akut,
Safar® – E. I. du Pont de Nemours & Company.

GOLTIX® 70 WG



GOLTIX® 70 WG

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til anvendes til bekæmpelse af frøkrudt i bederoer, rødbeder og jordbær.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.



GOLTIX® 70 WG



Analyse:
Metatriton 700 g/kg (70 % w/w)
Miljøstyrelsen anbefaler ikke anvendelsen af mineralske olier som adjuvant.
Formulering:
Midlet er et vanddispgerbart granulat
Ukrudtsmiddel nr.: 396-69
Virkemåde: HRAC C1: inhibering af fotosystem II

Midlet indeholder Natrium alkyl C12-14 sulfat

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Fabrikationsnummer og produktionsdato:
se emballagen
Holdbarhed:
Minimum 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 GK Leusden
Holland
www.adama.com

5 KG e

Productname	Goltix® 70 WG	de kostendruckers	
Country	Denmark		
Package size	5 KG		
Label code	ANESOLDKSKG/09/BX		
Label dimensions		Name	Taco Plinck
Label date	Dec 2016	Draft	Approved

* ADAMA Quano N.V.

ANESOLDKSKG/09/BX

ANESOLDKSKG/09/BX



DENMARK

GOLTIX® 70 WG

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af frøkrudt i bederoer, rødbeder og jordbær.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Analyse:

Metamitron 700 g/kg (70 % w/w)

Miljøstyrelsen anbefaler ikke anvendelsen af mineralske olier som adjuvant.

Formulering:

Midlet er et vanddispergerbart granulat

Ukrudtsmiddel nr.: 396-69

Virkemåde: HRAC C1: inhibering af fotosystem II

Midlet indeholder Natrium alkyl C12-14 sulfate

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Fabrikationsnummer og produktionsdato:

se emballagen

Holdbarhed:

Minimum 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 GK Leusden

Holland

www.adama.com

* ADAMA Quena N.V.

4 x 5 KG



ANEGOLDK5KG/01/C1

GOLTIX® 70 WG

GOLTIX® 70 WG

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af frøkrudt i bederoer, rødbeder og jordbær.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Analyse:

Metamitron 700 g/kg (70 % w/w)

Miljøstyrelsen anbefaler ikke anvendelsen af mineralske olier som adjuvant.

Formulering:

Midlet er et vanddispergerbart granulat

Ukrudtsmiddel nr.: 396-69

Virkemåde: HRAC C1: inhibering af fotosystem II

Midlet indeholder Natrium alkyl C12-14 sulfat

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Fabrikationsnummer og produktionsdato:

se emballagen

Holdbarhed:

Minimum 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 GK Leusden

Holland

www.adama.com

* ADAMA Quena N.V.

4 x 5 KG

Må kun anvendes til bekæmpelse af frøkrudt i bederoer, rødbeder og jordbær.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Farlig ved indtagelse (H302).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af frøkrudt i bederoer, rødbeder og jordbær.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i bederoer og rødbeder ikke anvendes senere end vækststadium 18. Behandling højst hver tredje år på samme mark.

Må i jordbær kun anvendes før blomstring eller efter høst. Behandling højst hver tredje år på samme mark.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Ved inspektion af afgrøder efter behandling skal der anvendes kemisk bestandige handsker.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Indånding Fjern personen fra det farlige område. Sørg for frisk luft og kontakt læge alt efter symptomer.

Hudkontakt Fjern omgående forurenet, gennemvædet beklædning, vask grundigt med rigeligt vand og sæbe, ved hudirritation (rødme etc.), opsig læge.

Øjenkontakt Tag kontaktlinser ud. Skyl grundigt med vand i flere minutter, kontakt læge om nødvendigt.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P301+P312).




8 718077 010168 >

UN 3077



DENMARK

GOLTIX® 70WG



DENMARK

16 x 20 KG

ADAMA

Northern Europe B.V.



ANEGOLDK5KG/01/X