

Kuhn MDS 10.1-19.1

ARINEX® 30

ARINEX® 30 ADAMA 3% Metaldehyde				normale Streuung				MDS 10.1-11.1-12.1 MDS 17.1-19.1												
	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m							
	M1			M1			M1			M1			M1							
 1/min	540			540			540			540			650							
	40 / 40			50 / 50			60 / 60			60 / 60			70 / 70							
	D 3 - C 1			E 4 - C 1			D 6 - D 2			D 6 - D 2			D 6 - D 2							
	A 5 - A 5			A 6 - A 6			/			/			/							
kg / ha																				
	km/h				km/h				km/h				km/h				km/h			
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12		
7	2.3																			
8	3.0	2.4	2.0	2.5	2.0		2.0													
9	6.0	4.8	4.0	5.0	4.0	3.3	4.0	3.2	2.7	3.8	3.0	2.5	3.3	2.7	2.2					
10			8.5		8.5	7.1	8.5	6.8	5.7	8.0	6.4	5.3	7.1	5.7	4.7					
Eine stationäre Abdreprobe ist mit diesem Saatgut aufgrund des geringen spezifischen Gewichts und der geringen Aufwandmengen/ha nicht möglich. Als Grundlage für die Einstellung sind die in der Spalte kg/ha angegebenen Mengen zu verwenden. Die tatsächlich ausgebrachte Menge auf einer Fläche von 0,5 oder 1,0 ha abdrehen.																				

ARINEX® 30 ADAMA 3% Metaldeyde			normale Streuung			MDS 10.1-11.1-12.1 MDS 17.1-19.1			
	20 m	21 m							
	M1X	M1X							
 1/min	650	650							
	70 / 70	70 / 70							
	X 4 - D 2	X 4 - D 2							
	/	/							
kg / ha									
	km/h			km/h			km/h		
	8	10	12	8	10	12	8	10	12
9	3.0	2.4	2.0	2.9	2.3				
10	6.4	5.1	4.3	6.1	4.9	4.0			

Eine stationäre Abdreprobe ist mit diesem Saatgut aufgrund des geringen spezifischen Gewichts und der geringen Aufwandmengen/ha nicht möglich. Als Grundlage für die Einstellung sind die in der Spalte kg/ha angegebenen Mengen zu verwenden. Die tatsächlich ausgebrachte Menge auf einer Fläche von 0,5 oder 1,0 ha abdrehen.

Überprüfen Sie die ausgebrachte Streumenge nach 0,5 oder 1,0 ha Streufläche. Achten Sie besonders an den Randbereichen auf eine präzise Ausbringung. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.