








# GETREIDE | UNSERE LÖSUNGEN 2026

HERBIZIDE inkl. Graminizide    FUNGIZIDE    INSEKTIZIDE    WACHSTUMSREGLER



# TOMIGAN® XL

- ▶ Die Lösung gegen Kamille, Kletten-Labkraut, Kornblume, Klatschmohn, Knöterich und viele weitere Unkräuter
- ▶ Breite Wirkung und langer Einsatzzeitraum
- ▶ Wirkungssicher auch bei schwankenden Temperaturen

## TIPP

Nutzen Sie die kostengünstige Lösung mit 1,0–1,5 l/ha **TOMIGAN XL** gegen alle wichtigen Unkräuter inkl. Kletten-Labkraut, Kamille, Klatschmohn, Knöterich-Arten und Ausfallraps.



### Produktbeschreibung


|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Wirkstoffe:           | 100 g/l Fluroxypyr<br>2,5 g/l Florasulam                                            |
| Formulierung:         | Suspoemulsion (SE)                                                                  |
| Zugelassene Kulturen: | Winterweichweizen, -gerste, -roggen, -triticale; Sommerweichweizen, -gerste, -hafer |
| Gebinde:              | 4 x 5 l                                                                             |

### Indikationen

| Kulturen                                        | Schadorganismus                        | Anwendungszeitpunkt | Aufwandmenge                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Winterweichweizen, -gerste, -roggen, -triticale | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | BBCH 13–29          | 1,5 l/ha in 200–400 l/ha Wasser |
|                                                 | Kletten-Labkraut                       | BBCH 30–39          |                                 |
| Sommerweichweizen, -gerste, -hafer              | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | BBCH 13–29          |                                 |

### Anwendungsempfehlung

Breite Mischverunkrautung inkl. Klette, Kamille, Klatschmohn u. a.



# FOX®

- ▶ Der ideale Mischpartner für Sulfonylharnstoffe
- ▶ Sichere Wirkung gegen Ehrenpreis, Stiefmütterchen, Taubnessel u. a.
- ▶ Ideal einsetzbar mit AHL

## TIPP

FOX als idealer Mischungspartner, z. B. für Sulfonylharnstoffe gegen Ehrenpreis. Bei der Anwendung sollten die Getreidebestände gut abgetrocknet sein.



### Produktbeschreibung

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Wirkstoff:            | 480 g/l Bifenox                            |
| Formulierung:         | Suspensionskonzentrat (SC)                 |
| Zugelassene Kulturen: | Winterweizen, -gerste, -roggen, -triticale |
| Gebinde:              | 4 x 5 l                                    |

### Indikation





# SORATEL®

ist das einzigartige,  
hochwirksame Prothioconazol  
mit der **Asorbital®**-  
Formulierungstechnologie

POWERED BY  
**Asorbital®**  
FORMULATION TECHNOLOGY



- ▶ SORATEL wird mit der Asorbital-Technologie formuliert, die über ein spezielles Lösungsmittelsystem verfügt
- ▶ Eine vollständig optimierte Formulierung, die die Aufnahme in das Blatt verbessert, eine hervorragende systemische Wirkung in der Pflanze erzeugt und die Regenfestigkeit erhöht
- ▶ Überlegene Krankheitskontrolle im Vergleich zum führenden Prothioconazol
- ▶ Unter verschiedensten Anwendungs- und Witterungsbedingungen beständiger und zuverlässiger als vergleichbare Produkte

## Produktbeschreibung

|                      |                          |                              |                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wirkstoff:</b>    | 250 g/l Prothioconazol   | <b>Zugelassene Kulturen:</b> | Winter-, Sommerweichweizen, Winter-, Sommergerste, Winterroggen, Winter-, Sommertriticale, Winter-, Sommerraps |
| <b>Formulierung:</b> | Emulsionskonzentrat (EC) | <b>Gebinde:</b>              | Im AVASTEL Pack erhältlich: 1 x 5 l                                                                            |

## Indikationen

| Kulturen                             | Schadorganismus                                                                                                                                                                                           | Aufwandmenge                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Winterweichweizen, Sommerweichweizen | Septoria-Blattdürre ( <i>Septoria tritici</i> ), Fusarium-Arten, DTR-Blattdürre ( <i>Drechslera tritici-repentis</i> ), Gelbrost ( <i>Puccinia striiformis</i> ), Braunrost ( <i>Puccinia recondita</i> ) | 0,8 l/ha in<br>100–400 l/ha Wasser |
| Winterroggen                         | <i>Rhyn</i>                                                                                                                                                                                               |                                    |





NEU



POWERED BY  
**Asorbital®**  
FORMULATION TECHNOLOGY

# FORAPRO®

## Volle Power für den frühen Schutz im Getreide

- ▶ Die einzige Wirkstoffkombination mit Fenpropidin!
- ▶ Erfasst alle relevanten frühen Krankheiten
- ▶ Besonders stark gegen Septoria und Rost-Arten sowie beste Stoppwirkung gegen Mehltau
- ▶ In Weizen (inkl. Dinkel, Durum, Emmer etc.), Gerste, Roggen und Triticale zugelassen

### Produktbeschreibung

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wirkstoffe:</b>           | 175 g/l Prothioconazol<br>250 g/l Fenpropidin                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Formulierung:</b>         | Emulsionskonzentrat (EC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zugelassene Kulturen:</b> | <b>Weizen (inkl. Dinkel und Durum):</b> Echter Mehltau, Septoria-Blattdürre, DTR-Blattdürre, Gelbrost, Braunrost<br><b>Gerste:</b> Echter Mehltau, Rhynchosporium, Netzfleckenkrankheit, Zwergrost<br><b>Roggen:</b> Echter Mehltau, Rhynchosporium, Braunrost<br><b>Triticale:</b> Echter Mehltau, Septoria-Arten, Gelbrost, Braunrost |
| <b>Einsatzzeitpunkt:</b>     | BBCH 30–59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Aufwandmenge:</b>         | 1,0 l/ha in 150–400 l/ha Wasser; max. 1 Anwendung für die Kultur bzw. je Jahr                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gebinde:</b>              | 4 x 5 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |








# ZUCKERRÜBEN | UNSERE LÖSUNGEN 2026

HERBIZIDE inkl. Graminizide    FUNGIZIDE    INSEKTIZIDE    ZUSATZSTOFFE



\*Bitte beachten Sie die aktuelle Zulassungssituation und den Stand der Pflanzenschutzanwendungsverordnung.  
\*\*Eine Anwendung pro Kultur bzw. je Jahr, Ausnahme Splittinganwendung. Aufwandmengen siehe Anwendungsempfehlungen auf den folgenden Seiten.



# GOLTIX® TITAN®

- ▶ Höchste Wirkungssicherheit gegen eine Vielzahl entscheidender Unkräuter im Rübenanbau
- ▶ Einzigartige Wirkstoffkombination aus Metamitron und Quinmerac
- ▶ Synergieeffekte in der Spritzfolge
- ▶ Unabhängiger von der Bodenfeuchte und hochverträglich für die Rübe

## TIPP

Ausfallraps-Standorte: Zum Keimblatt des Rapses behandeln! Zusatz von 0,25–0,33 l/ha VENZAR® 500 wird empfohlen.



### Produktbeschreibung

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Wirkstoffe:           | 525 g/l Metamitron<br>40 g/l Quinmerac |
| Formulierung:         | Suspensionskonzentrat (SC)             |
| Zugelassene Kulturen: | Zucker- und Futterrüben                |
| Gebinde:              | 2 x 10 l                               |

### Indikationen

|                                             | VA       | 1. NAK   | 2. NAK   | 3. NAK   |
|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Splittingverfahren im Nachauflauf           | –        | 2,0 l/ha | 2,0 l/ha | 2,0 l/ha |
| Splittingverfahren im Vor- und Nachauflauf* | 3,0 l/ha | 1,0 l/ha | 1,0 l/ha | 1,0 l/ha |

Die max. zugelassene Gesamtaufwandmenge von 6,0 l/ha GOLTIX TITAN in der Spritzfolge ist zu beachten.


\*Bei optimalen Anwendungsbedingungen für den Voraufbau (ausreichende Bodenfeuchte) bietet sich die Split











Neuigkeiten für  
Herbst 2026  
ab Seite 44




















# ACTIVUS® SC

Terbuthylazin-freier  
Bodenpartner im Mais

- Pendimethalin als hochwirksame SC-Formulierung
- Zuverlässig gegen Melde-, Gänsefuß- und Amarant-Arten, Nachtschatten, Ehrenpreis, Taubnessel u. a.

## Produktbeschreibung

|                      |                            |                            |          |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| <b>Wirkstoff:</b>    | 400 g/l Pendimethalin      | <b>Zugelassene Kultur:</b> | Mais     |
| <b>Formulierung:</b> | Suspensionskonzentrat (SC) | <b>Gebinde:</b>            | 2 x 10 l |

## Indikation

| Kultur | Schadorganismus                                                                       | Anwendungszeitpunkt | Aufwandmenge                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Mais   | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Kletten-Labkraut, Kamille-Arten) | BBCH 10–13          | 2,0–4,0 l/ha<br>in 200–400 l/ha Wasser |

## Anwendungsempfehlung

| ACTIVUS SC 2,0–4,0 l/ha + Mischungspartner |         |    |                  |    |    |
|--------------------------------------------|---------|----|------------------|----|----|
| BBCH                                       | 00–09   | 11 | 12               | 13 | 14 |
| WACHSTUMS-STADIUM                          | Keimung |    |                  |    |    |
|                                            |         |    | Blattentwicklung |    |    |









