Viel Erfolg und einen guten Ertrag wünscht Ihnen ADAMA



OBSTBAU 2026



Kern-, Stein- und Beerenobst wie z.B. Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen und Erdbeeren sind die wichtigsten Kulturen in modernen Obstbaubetrieben.



ERFAHREN SIE MEHR ZUM THEMA OBSTBAU

ama.com/deutschland/de/kulturen/obstbau



PRODUKTÜBERSICHT

PRODUKT		SEITE
AGIL-S	HERBIZID	18
ARINEX 30	SCHNECKENKORN	6
BREVIS	WACHSTUM	10
COSAYR	INSEKTIZID	7
EXELGROW	BIOLOGICALS	16
EXILIS 100 XL	WACHSTUM	11
GOLTIX GOLD	HERBIZID	19
KUDOS	WACHSTUM	12
MAVRIK VITA	INSEKTIZID	7
MERPAN 80 WDG	FUNGIZID	4
NIMROD EC	FUNGIZID	5
NOVAGIB	WACHSTUM	14
SCORE	FUNGIZID	6
TAIFUN FORTE*	HERBIZID	19
VERIPHOS	FUNGIZID	5

 $[\]hbox{*Bitte beachten Sie die aktuelle Zulassungs situation und den Stand der Pflanzenschutzanwendungsverordnung.}$

Dieser Prospekt dient Ihrer Information. Stand 11/2025.

MERPAN® 80 WDG

- ► Zuverlässig wirksam gegen Schorf und Lagerkrankheiten
- ► Hohe Wirkstoffbeladung geringe Aufwandmengen
- ► Keine Staubbildung beim Befüllen

TIPP



MERPAN 80 WDG darf nicht mit Axialgebläse-Sprühgeräten ohne Gebläseaufsatz angewendet werden. Eine Anwendung während der Kernobstblüte ist nicht zugelassen. Außerhalb der Blüte dürfen sich in den Reihen des Kernobstes keine blühenden Unkräuter befinden. Bei Verwendung von Applikationstechnik mit 90 %iger Driftreduktion nur 5 m Abstand zu Gewässern.

Produktbesch	Produktbeschreibung				
Wirkstoff:	800 g/kg Captan				
Formulierung:	wasserdispergierbares Granulat (WG)				
Zugelassene Kulturen:	Kernobst, Süß-, Sauerkirsche				
Auflagen:	Siehe Seiten 20-21				
Gebinde:	4 x 5 kg				

Kulturen	Schad- organismus	Anwendungs- zeitpunkt	Max. Anzahl Anwendungen	Max. Aufwandmenge	Warte- zeit
Kernobst	Schorf (Venturia spp.)	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warn- diensthinweis, ausgenommen Blüte (BBCH 60-69)	2 in dieser Anwendung, 3 in der Kultur bzw. je Jahr (Abstand 7–10 Tage)	0,625 kg/ha in max. 165 l/ha Wasser und je m Kronenhöhe	21 Tage
Kernobst	Lagerschorf (Venturia inaequalis) Bitterfäule (Glomerella cingulata)	Vor der Ernte	1 in dieser Anwendung, 3 in der Kultur bzw. je Jahr (Abstand 4-7 Tage)	0,75 kg/ha in max. 165 l/ha Wasser und je m Kronenhöhe	21 Tage
Süßkirsche, Sauerkirsche	Sprühflecken- krankheit (Blumeriella jaapii)	Bei Infektions- gefahr bzw. ab Warndiensthinweis	1 in dieser Anwendung, 1 in der Kultur bzw. je Jahr	0,75 kg/ha in max. 500 l/ha Wasser und je m Kronenhöhe	21 Tage

Schorf und Lagerfäule MERPAN 80 WDG		MERPAN 80 WDG	
			1997 (1990

NIMROD® EC

- ➤ Zuverlässiger Schutz durch drei unterschiedliche Wirkungsweisen: systemisch, translaminar und Dampfphase
- ► Resistenzschutz: Bupirimat, einziger Wirkstoff der Familie der Pyrimidine
- Breites Anwendungsfenster, vorbeugende und kurative Wirkung

Produktbesch	Produktbeschreibung				
Wirkstoff:	250 g/l Bupirimat				
Formulierung:	Emulsionskonzentrat (EC)				
Zugelassene Kulturen:	Kernobst, Himbeere, Stachelbeere, Johannisbeere, Erdbeere				
Auflagen:	Siehe Seiten 20–21				
Gebinde:	12 x 1 l				

Zugelassene Anwendungen						
Kulturen	Schadorganismus	Anwendungs- zeitpunkt	Max. Anzahl Anwendungen	Max. Aufwandmenge	Warte- zeit	
Kernobst: Apfel, Birne	Echte Mehltaupilze		4 pro Kultur und Jahr (Abstand 10–14 Tage)	0,3 I/ha in 100–500 I/m KH Wasser, max. 3 m KH	14 Tage	
Himbeere (Freiland und Gewächshaus)	Echter Mehltau (Podosphaera aphanis)	Bei Infektions-	4 pro Kultur und Jahr (Abstand 12 Tage)	1,0 I/ha in 1.000 I/ha Wasser	7 Tage	
Stachelbeere, Johannisbeere (rot, schwarz, weiß)	Echter Mehltau (Podosphaera aphanis)	gefahr bzw. ab Warndienst- hinweis	4 pro Kultur und Jahr (Abstand 12 Tage)	1,0 I/ha in 1.000 I/ha Wasser	7 Tage	
Erdbeere (Freiland und Gewächshaus)	Echter Mehltau (Podosphaera aphanis)		4 pro Kultur und Jahr (Abstand 10–14 Tage)	1,0 I/ha in 500–1.000 I/ha Wasser	3 Tage	

VERIPHOS®

- ➤ Stärkt die pflanzeneigenen Abwehrkräfte
- ► Passt in jedes Spritzprogramm
- ► Sicher in der Wirkung

Produktbeschreibung					
Wirkstoff:	755 g/l Kaliumphosphonat (K2HPO3 + KH2PO3)				
Formulierung:	wasserlösliches Konzentrat (SL)				
Bieneneinstufung:	Bienenungefährlich B4				
Zugelassene Kulturen:	Brombeere, Himbeere, Johannisbeere (rot, weiß, schwarz), Stachelbeere, Heidelbeere, Schwarzer Holunder				
Auflagen:	Siehe Seiten 20–21				
Gebinde:	2 x 10 l im Karton				

Zugelassene Anwendungen					
Kulturen	Schad- organismus	Anwendungs- zeitpunkt	Max. Anzahl Anwendungen	Max. Aufwand- menge	Warte- zeit
Brombeere	Falscher Mehltau (Peronospora sparsa)	Bei Infektions- gefahr bzw.	3 pro Kultur und Jahr (Abstand 7–10 Tage)	4,0 I/ha in max. 1.000 I/ha Wasser	5 Tage
Himbeere	Rote Wurzelfäule (Phytophtora fragariae)	ab Warndienst- aufruf	3 pro Kultur und Jahr (Abstand 7–10 Tage)	4,0 I/ha in max. 1.000 I/ha Wasser	5 Tage
Heidelbeere, Schwarzer Holunder	Colletotrichum	Bei Befallsbeginn	2 pro Kultur und Jahr (Abstand 7–10 Tage)	4,0 I/ha in max. 1.000 I/ha Wasser	14 Tage
Johannisbeere (rot, weiß, schwarz), Stachelbeere	Blattfallkrankheit (Drepanopeziza ribis)	bzw. ab Sichtbar- werden der ersten Symptome	2 pro Kultur und Jahr (Abstand 7–10 Tage)	4,0 I/ha in max. 1.000 I/ha Wasser	14 Tage

SCORE®*

- ► Lokalsystemisches Fungizid mit infektionsstoppender und vorbeugender Wirkung
- ➤ Schnelle Aufnahme rasch regenfest
- ► Kurze Wartezeit

TIPP



SCORE ist der ideale Mischpartner, um die Azolkomponente in anderen Fungiziden zu erhöhen

Produktbeschreibung			
Wirkstoff:	250 g/l Difenoconazol		
Formulierung:	Emulsionskonzentrat (EC)		
Zugelassene Kultur:	Kernobst		
Auflagen:	Siehe Seiten 20–21		
Gebinde:	4 x 5 l		

Zugelassene Anwendung						
Kultur	Schad- organismus	Anwendungs- zeitpunkt	Max. Anzahl Anwendungen	Max. Aufwandmenge	Warte- zeit	
Kernobst	Schorf (Venturia ssp.)	Ab Beginn der Blüte: etwa 10 % der Blüten geöffnet	4 (Abstand 5–10 Tage)	0,075 l/ha in max. 500 l/ha Wasser und je m Kronenhöhe	28 Tage	

*Die Zulassung von SCORE ist extrem breit! Hier wird nur die Anwendung im Obstbau dargestellt. Alle Informationen zu weiteren Indikationen finden Sie auf unserer Internetseite.

ARINEX® 30

- ► Hervorragende Form- und Regenstabilität, besonders lange Wirkungsdauer
- ► Hohe Köderdichte mit ca. 45 Körnern/m² (bei 6,0 kg/ha)
- ► Sehr gute Anfangs- und Lockwirkung
- ▶ Ideal auch für Randbehandlungen
- ► Hohe Beständigkeit gegen Schimmel

Produktbeschreibung				
Wirkstoff:	30 g/kg Metaldehyd			
Formulierung:	Granulatköder (GB, Nasspressung)			
Bieneneinstufung:	Bienenungefährlich B4			
Zugelassene Kultur:	Erdbeere			
Gebinde:	20 kg			

Zugelassene Anwendung						
Kultur	Schad- organismus	Anwendungszeitpunkt	Max. Anzahl Anwendungen	Max. Aufwandmenge	Warte- zeit	
Erdbeere	Nacktschnecken	Bis Beginn der Aus- läuferbildung (BBCH 41)	2 (Abstand mind. 7 Tage)	2 x 6,0 kg/ha	F	

MAVRIK® VITA



Schädlingsbekämpfung mit Augenmaß

- ► Kraftvoll in der Wirkung
- ► Sicher gegen Thripse
- ► Gute Zusatzwirkung gegen Blattläuse auch als Virusvektoren
- ► Sanft zu Nützlingen, bienenungefährlich (B4)

Produktbeschreibung							
Wirkstoff:	240 g/l Tau-Fluvalinat						
Formulierung:	Emulsion (EW, Öl in Wasser)						
Bieneneinstufung:	B4 (Änderung der Einstufung in Mischungen möglich)						
Zugelassene Kultur:	Erdbeere						
Auflagen:	Siehe Seiten 20–21						
Gebinde:	12 x 1 l; 4 x 5 l						

TIPP



Aufgrund seiner Kontakt- und Fraßwirkung ist es wichtig, bei der Applikation von MAVRIK VITA auf eine ausreichende und vollständige Benetzung der befallenen Pflanzenteile zu achten.

Geringfügige Verwendung (nach Art. 51 Abs. 1 der VO [EG] 1107/2009 und Lückenindikationen nach § 18a PflSchG)									
Kultur	Schad- organismus	Anwendungszeitpunkt/BBCH	Max. Anzahl Anwendungen	Max. Auf- wandmenge	Warte- zeit				
Erdbeere	Thripse	Früchte beginnen sich sortentypisch auszufärben (BBCH-Code: 85), nach Erreichen von Schwellen- werten oder nach Warndienstaufruf (Abstand: 10-14 Tage)	2	0,2 I/ha in 1.000 I/ha Wasser	7 Tage				

COSAYR®



Produktbeschreibung								
Wirkstoff:	200 g/I Chlorantraniliprole	Zugelassene Kultur:	Kernobst (Apfel, Birne, Quitte)					
Formulierung:	Suspensionskonzentrat (SC)	Bieneneinstufung:	Bienenungefährlich B4					
Auflagen:	Siehe Seiten 20–21	Gebinde:	12 x 1 l					

Zugelass	Zugelassene Anwendung										
Kultur	Schad- organismus	Anwendungs- zeitpunkt	Max. Anzahl Anwendungen	Max. Aufwandmenge	Warte- zeit						
Kernobst	Apfelwickler	BBCH 71-87	1	1 x 0,155 I/ha in 500–1.600 I/ha Wasser bzw. 1 x 0,13 I/10.000 m² LWA in 417–1.250 I/10.000 m² Wasser	14 Tage						


WACHSTUMSREGULATOREN

Die Basis für die Qualitätserzeugung im Kernobst

WACHSTUMSREGULATOREN stellen die Grundlage für die Erzeugung von hochwertigem Obst im Apfel- und Birnenanbau dar. Hierbei spielen insbesondere die Fruchtausdünnung, die Regulierung des Triebwachstums und die Minderung der Fruchtberostung eine wesentliche Rolle. Die Fruchtausdünnung erfolgt in der Regel zu drei

unterschiedlichen Zeitpunkten: während der Blüte, an jungen Früchten nach dem initialen Fruchtansatz oder kurz nach dem natürlichen Fruchtfall arbeits- und kostenintensiv per Hand. Mit BREVIS und EXILIS 100 XL stehen aus dem Hause ADAMA zwei Produkte für die Fruchtausdünnung an jungen Früchten zur Verfügung.

Fruchtausdünnung BREVIS Ende Blüte 6 mm Fruchtgröße Fruchtgröße



Das ADAMA Prognosemodell zur Optimierung der Fruchtausdünnung und von behangsstabilisierenden Maßnahmen

Unser optimiertes, temperaturbasiertes Prognosemodell unterstützt Sie bei der Produktauswahl und bei der Bestimmung des optimalen Anwendungszeitpunktes an Ihrem Standort.

Mit den Tiefsttemperaturen und insbesondere der Warnung vor Nachtfrost können Sie bei Bedarf rechtzeitig eine behangsstabilisierende Maßnahme mit **KUDOS** einplanen. Die Prognose für Ihren Standort können Sie jederzeit wie bisher auf Ihrem PC abrufen.

Oder Sie können sie sich täglich per E-Mail auf Ihr Smartphone schicken lassen.

Achtung: Dazu müssen Sie einmalig die E-Mail-Benachrichtigung aktivieren. Sobald Sie die Prognose nicht mehr benötigen, einfach wieder deaktivieren. Immer informiert, wann und wo Sie es wünschen.

Jetzt bei myadama.com anmelden,

Standort für Ihre Prognose festlegen und E-Mail-Benachrichtigung aktivieren: myADAMA.com





- ► Gezielte Fruchtausdünnung im Nachblütebereich
- ► Zuverlässige, starke und kalkulierbare Ausdünnung
- ▶ Optimale Wirkung bei Ø-Nachttemperaturen zwischen 10 und 15 °C
- ► Solo oder in Programmen einsetzbar



Produktbesch	reibung
Wirkstoff:	150 g/kg Metamitron
Formulierung:	wasserlösliches Granulat (SG)
Zugelassene Kulturen:	Apfel, Birne
Auflagen:	Siehe Seiten 20–21
Gebinde:	4 x 5 kg; 4 x 1 kg

Zugelassene Anwendung								
Kulturen	Indikation	Anwendungszeitpunkt		Max. Anzahl Anwendungen				
Apfel, Birne	Fruchtausdünnung	Fruchtgröße: 6–20 mm	2,2 kg/ha	2	60 Tage			

An	nwendungsempfehlu	ıngen				
Äpfel	Elstar, Fuji, Gala, Junami, Kanzi (schwachwüchsig) 1,65–2,2 kg/ha	Golden Delicious, Pinova, Rubens, Kanzi (starkwüchsig) 1,1–1,65 kg/ha	Braeburn 1,1–2,2 kg/ha	Jonagold, Idared 1,1 kg/ha	Birnen	Birnen 1,65–2,2 kg/ha

EXILIS® 100 XL

Einsatz von EXILIS 100 XL an myADAMA.com

- Fruchtausdünnung mit 6-BA für Apfel und Birne
- ► Förderung der Fruchtgröße
- ► Splittinganwendung im Apfel zugelassen
- ► Wichtiger Baustein zur Vermeidung von Alternanz

Produktbeschreibung Wirkstoff: 100 g/l 6-Benzyladenin (6-BA) Formulierung: wasserlösliches Konzentrat (SL) Apfel, Birne Zugelassene Kulturen: Siehe Seiten 20-21 Auflagen: 12 x 1 l Gebinde:



Zugelassene Anwendungen										
Kulturen	Indikation	Anwendungs- zeitpunkt	Aufwandmenge	Max. Anzahl Anwendungen						
Apfel, Birne	Förderung der Fruchtgröße, Fruchtausdünnung	BBCH 71-72	0,75 I/ha m KH in 150–500 I/ha m KH Wasser (max. Aufwandmenge: 1,5 I/ha)	1						
Apfel – Splitting- anwendung	Förderung der Fruchtgröße, Fruchtausdünnung	BBCH 71-72	2 x 0,375 I/ha m KH in 150–500 I/ha m KH Wasser (max. Aufwandmenge: 1,5 I/ha)	2						

Ar	Anwendungsempfehlungen											
Äpfel	Elstar 1,0–1,5 I/ha	Fuji 1,0–1,5 I/ha	Gala 1,5 I/ha	Brae- burn 0,75- 1 I/ha	Pinova 1,0-1,5 I/ha	Kanzi 0,75-1,5 I/ha	Golden Delicious 1,0-1,5 I/ha	Jona- gold 0,75- 1 I/ha	Delba- restival 1,0–1,5 I/ha	Birnen	Birnen 1,0–1,5 I/ha	

KUDOS®

- ► Hervorragende Löslichkeit in nur 15 Sekunden
- ► Optimale Triebeinkürzung
- ► Einsparung von Schnittmaßnahmen
- ► Verbesserung der Fruchtqualität

TIPP



KUDOS zeichnet sich durch eine sehr gute Mischbarkeit mit den wesentlichen Fungiziden und Insektiziden im frühen Anwendungsbereich aus. Optimal auch nach Frostereignissen zur Behangsstabilisierung im Wechsel mit NOVAGIB.

Produktbesch	reibung
Wirkstoff:	84,79 g/kg Prohexadion (100 g/kg Calcium-Salz)
Formulierung:	wasserdispergierbares Granulat (WG)
Zugelassene Kulturen:	Apfel, Birne, Kirschen
Auflagen:	Siehe Seiten 20-21
Gebinde:	4 x 2,5 kg

Löslichkeit

KUDOS zeichnet sich durch eine hohe Anwenderfreundlichkeit aus. Bereits nach 15 Sekunden ist KUDOS vollständig gelöst und homogen in der Spritzbrühe verteilt. Andere Pflanzenschutzmittel können nun zügig hinzugefügt werden.



wendung							
KUD	OS	Abstand mind. 21 Tage	KUDOS tand mind. 21 Tage		KUDOS Abstand mind. 21 Tage		
Beginn Blüte	Vollblüte	+ +	Ende Blüte	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20 mm	40 mm
			8/1				7

Kulturen	Indikation	Anwendungs- zeitpunkt	Aufwandmenge	Max. Anzahl Anwendungen	Warte- zeit
Apfel	Hemmung des Trieb- wachstums	BBCH 31-85	3 x 1,25 kg/ha bzw. 3 x 0,83 kg/10.000 m² LWA in 300–1.000 l/ha Wasser bzw. 200–660 l/10.000 m² LWA; Max. 3,75 kg/ha/Jahr	3 (Abstand mind. 21 Tage)	35 Tage
Birne	Hemmung des Trieb- wachstums	BBCH 31-85	Erste Behandlung: 1,25 kg/ha bzw. 0,83 kg/10.000 m² LWA in 300–1.000 I/ha bzw. 200–660 I/10.000 m² LWA Wasser;	3	
			Zweite bis dritte Behandlung: 0,625 kg/ha bzw. 0,42 kg/10.000 m² LWA in 300-1.000 l/ha bzw. 200-660 l/10.000 m² LWA Wasser;	(Abstand 14–21 Tage)	35 Tage
			Max. 2,5 kg/ha/Jahr		
Kirschen (Süß-, Sauer-, Kornelkirsche)	Hemmung des Trieb- wachstums	BBCH 31-85	Max. 3 x 1,25 kg/ha bzw. 3 x 0,83 kg/10.000 m² LWA in 300–100 l/ha Wasser bzw. 200–660 l/10.000 m² LWA; Max. 3,75 kg/ha/Jahr	3 (Abstand 14–21 Tage)	21 Tage



NOVAGIB®

Das natürliche Gibberellin mit hochreinem GA4

- ► Minderung der Fruchtberostung beim Apfel
- ► Für eine gute Fruchtschalenqualität
- ► Verbesserter Fruchtansatz nach Frostperioden

TIPP




Wir empfehlen den Einsatz von **NOVAGIB** in der berostungsempfindlichen Zeit mit der Aufwandmenge von 0,25 l/ha je m Kronenhöh im Abstand von 10 Tagen. Optimal auch nach Frostereignissen zur Behangsstabilisierung im Wechsel mit **KUDOS**.

Produktbesch	reibung
Wirkstoff:	10 g/l Gibberelline (GA4/GA7)
Formulierung:	wasserlösliches Konzentrat (SL)
Zugelassene Kultur:	Apfel
Auflagen:	Siehe Seiten 20-21
Gebinde:	12 x 1 l

Kultur	Indikation	Anwendungs- zeitpunkt	Aufwand- menge	Max. Anzahl Anwendungen
Apfel	Minderung der Frucht- berostung/Erhaltung der Qualität	BBCH 69–73: während der Phase der aktiven Zellteilung	0,25 l/ha je m Kronenhöhe in 500–750 l Wasser	4 im Abstand von 10 Tagen
Apfel	Minderung der Frucht- berostung/Erhaltung der Qualität	BBCH 69–73: während der Phase der aktiven Zellteilung	0,2 l/ha je m Kronenhöhe in 500–750 l Wasser	5 im Abstand von 7 Tagen









EXELGROW®

Das innovative Biostimulanz für eine sichere Ernte

- ► Reduziert die Stressanfälligkeit:
 - ▶ im Obstbau während und nach der Blüte
 - ▶ im Gemüsebau während des vegetativen Wachstums
- ► Steigert den Anteil marktfähiger Ware
- ► Erleichtert die Anwendung durch niedrige Aufwandmengen und hervorragende Mischbarkeit



Produktbeschreibung

Zusammensetzung:

Organischer Kohlenstoff aus biologischem Ursprung

Formulierung: wasserlösliches Konzentrat (SL)

Zugelassene Obstbau- (Apfel, Birne, Kirsche),
Kulturen: Gemüsebau- (Möhren), Ackerbau- und Sonderkulturen

Siehe Seiten 20-21

Gebinde: 4 x 5 l


Auflagen:

TIPP




EXELGROW ist mit gängigen Blattdüngern und Pflanzenschutzmitteln mit Ausnahme von Kupferpräparaten mischbar. Bei der Anwendung fallen keine zusätzlichen Überfahrten an

EXELGROW in Apfel - Praxisversuch 2021



Kontrolle: betriebsüblich, EXELGROW: betriebsüblich + 3 x 0,5 I/ha EXELGROW während der Blüte. Quelle: ADAMA Praxisversuche EXELGROW, Deutschland, 2021

Anwendungsempfehlung



AGIL®-S

- ► Schnelle Wirkung und Wirkstoffaufnahme
- ► Sichere Gräser- und Hirsenbekämpfung
- ► Keine Gewässerabstandsauflagen



AGIL-S ist ein wirkungsstarkes Gräserherbizid,

Produktbeschr	Produktbeschreibung									
Wirkstoff:	100 g/l Propaquizafop									
Formulierung:	Emulsionskonzentrat (EC)									
Zugelassene Kulturen:	Erdbeere, Kernobst, Pfirsich									
Auflagen:	Siehe Seiten 20–21									
Gebinde:	12 x 1 l; 4 x 5 l; 2 x 10 l									

Zugelasse	ene Anwendungen				
Kulturen	Schadorganismus	Anwendungs- zeitpunkt	Max. Anzahl Anwendungen	Aufwandmenge	Warte- zeit
Erdbeere	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Einjähriges Rispengras, Gemeine Quecke)	-	1	0,75 l/ha in 200–400 l/ha Wasser	35 Tage
Erdbeere	Gemeine Quecke	Ab 1. Laubblatt entfaltet	1	1,5 I/ha in 75–300 I/ha Wasser	35 Tage
Kernobst, Pfirsich	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Einjähriges Rispengras, Gemeine Quecke)	Während der Vegetationsperiode	1	0,8 I/ha in 100–400 I/ha Wasser	30 Tage
Kernobst, Pfirsich	Gemeine Quecke	Während der Vegetationsperiode	1	1,5 I/ha in 100–400 I/ha Wasser	30 Tage

Bei ungünstigen Bedingungen empfehlen wir, der Mischung kein Additiv/keinen Zusatzstoff zuzugeben.



In vielen Ackerbauund Spezialkulturen

ZUGELASSEN

GOLTIX® GOLD

- ► Sichere Wirkung über Blatt und Boden
- ► Hohe UV-Stabilität
- ► Lange Wirkungsdauer

Produktbeschreibung									
Wirkstoff:	700 g/l Metamitron								
Formulierung:	Suspensionskonzentrat (SC)								
Zugelassene Kultur:	Erdbeere								
Auflagen:	Siehe Seiten 20–21								
Gebinde:	4 x 5 l								

Kultur	Schadorganismus	Anwendungs- zeitpunkt	Max. Anzahl Anwendungen	Aufwand- menge	Warte- zeit
Erdbeere	Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Kletten-Labkraut, Knöterich- Arten)	Nach der Ernte, Spät- sommer bis Herbst, vor oder nach dem Auflau- fen der Unkräuter	1	2,0 I/ha in 300–600 I/ha Wasser	F

TAIFUN® FORTE*

- ► Zugelassen zur Unkrautbekämpfung in Kernobst und Weinbau
- ► Anwendung im Frühjahr oder Sommer
- ► Aufwandmenge: 5,0 l/ha; max. 1 x (Kernobst) bzw. 2 x (Wein) pro Jahr

Produktbesc	hreibung		
Wirkstoff:	360 g/l Glyphosat, (480 g/l Isoprop	pylamin-Salz)	
Formulierung:	wasserlösliches Konzentrat (SL)	Zugelassene Kulturen:	Kernobst, Weinbau (Kelter- und Tafeltrauben)
Auflagen:	Siehe Seiten 20–21	Gebinde:	4 x 5 l; 20 l

Zugelassene Anwendungen											
Kulturen	Kulturen Schadorganismus		Aufwandmenge	Warte- zeit							
Kernobst	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	Frühjahr oder Sommer	1 x 5,0 l/ha	42 Tage							
Weinbau	Einkeimblättrige Unkräuter, zweikeimblättrige Unkräuter; ausgenommen: Acker-Winde	Während der Vegetations- periode	In der Anwendung: 2; in der Kultur bzw. je Jahr: 2; Abstand: mind. 3 Monate; 5,0 I/ha in 100-400 I/ha Wasser	30 Tage							

^{*}Bitte beachten Sie die aktuelle Zulassungssituation und den Stand der Pflanzenschutzanwendungsverordnung.

			l		Abotom do coello com			
Produkte	Wirkstoffe	Kulturen	Bienen- gefähr-	Einstufung Gefahrstoff-	Abstandsauflagen			
			lichkeit	verordnung	Gewässer	Saumstruktur/ Sonstige Auflagen		
AGIL-S	100 g/I Propaquizafop	Erdbeere, Kernobst, Pfirsich	В4	GHS 07 GHS 08 GHS 09	NW 642-1 *	Beerenobst- Quecke: NT 609-2 5 m		
ARINEX 30	30 g/kg Metaldehyd	Erdbeere	B4	GHS 08	NW 642-1	keine NT 116, NT 658, NT 665, NT 676, NT 870		
BREVIS	150 g/kg Metamitron	Apfel, Birne	B4	GHS 05 GHS 07 GHS 09	NW 642-1 *	NT 109 (20 m; 90 %)		
COSAYR	200 g/l Chlorantraniliprole	Apfel, Birne, Quitte	B4	GHS 09	NW 605-2 5-*-* m NW 606 10 m	NT 101-1 (20 m; 50 %) NG 371.1095		
EXELGROW	-	-	B4	-	-	-		
EXILIS 100 XL	100 g/l 6-Benzyladenin (6-BA)	Apfel, Birne	B4	-	NW 605-1 10-5-*m NW 606 15 m	-		
GOLTIX GOLD	700 g/l Metamitron	Erdbeere	B4	GHS 07 GHS 09	NW 642 * NG 402 2 %; 10 m	-		
KUDOS	84,79 g/kg Prohexadion (100 g/kg Calcium-Salz)	Apfel, Birne, Kirschen	B4	GHS 09	NW 642-1	-		
MAVRIK VITA	240 g/l Tau-Fluvalinat	Erdbeere	B4	GHS 09	NW 608-1 5 m	NT 112 (5 m)		
MERPAN 80 WDG	800 g/kg Captan	Kernobst, Süßkirsche, Sauerkirsche	B4 NB 507	GHS 05 GHS 07 GHS 08 GHS 09	NW 605-1 15-10-5 m NW 606 20 m NW 706 2 %; 20 m	-		
NIMROD EC	250 g/l Bupirimat	Apfel, Birne	B4	GHS 07 GHS 08	NW 605-1 5-*-* m NW 606 10 m	NT 101 (20 m; 50 %)		
		Stachelbeere, Johannisbeere (rot, schwarz, weiß)		GHS 09	NW 642-1			
		Himbeere			NW 642-1	_		
		Erdbeere			NW 642-1			
NOVAGIB	10 g/l Gibberelline (GA4/GA7)	Apfel	B4	-	NW 642-1 *	-		
SCORE	250 g/l Difenoconazol	Brombeere, Himbeere	B4	GHS 07 GHS 08 GHS 09	NW 605 15–10–5 m NW 606 20 m NW 705 2 %; 5 m	WW 7091 WW 750		
		Erdbeere (Freiland) Erdbeere (Freiland; im Pflanzjahr) Erdbeere (Freiland; in Beständen zur Pflanzgut- erzeugung)	B4		NW 608 5 m	VV 600 (Erntegut nicht verzehren)		
		Kernobst	B4		NW 607 20–15 m	WW 750		
		Pflaume, Sauerkirsche, Süßkirsche	B4		NW 607 20–15 m	WW 7091 WW 750		
TAIFUN FORTE	360 g/I Glyphosat	Kernobst, Weinbau	B4	-	NG 404 2 %; 20 m	-		
VERIPHOS	755 g/l Kaliumphosphonat	Brombeere, Himbeere (Gewächshaus)	B4	-	-	-		
		Brombeere, Himbeere (Freiland) Johannisbeere (rot, schwarz, weiß), Stachelbeere, Heidelbeere, Schwarzer Holunder	В4	-	NW 642-1	-		

Lesehinweis zur NW 605 und NW 606: Die Abstände gelten je nach Abdriftminderungsklasse, z. B. bei MAVRIK VITA: NW 605 = 10-5-5 m bedeutet: 50 % 10 m, 75 % 5 m, 90 % 5 m, 80 % 5

ÜBERSICHT ZULASSUNGEN

Kulturen	AGIL-S	ARINEX 30	BREVIS	COSAYR	EXELGROW	EXILIS 100 XL	GOLTIX GOLD	KUDOS	MAVRIK VITA	MERPAN 80 WDG	NIMROD EC	NOVAGIB	SCORE	TAIFUN FORTE	VERIPHOS
Apfel	•		•		•								-		
Aprikose					•										
Birne			-	-	-	-		-			•		-		
Brombeere					•								•		•
Erdbeere (Freiland)	•				•		•		•		•		•		
Erdbeere (Gewächshaus)		•													
Heidelbeere	•				•										•
Himbeere					•						•		•		•
Johannisbeerartiges Beerenobst	•				•										•
Johannisbeere (rot, weiß, schwarz)	•				•						•				•
Kirsche (Süβ-, Sauer-)								•		•					
Loganbeere					•										•
Melone					•										
Pfirsich	•				-										
Pflaume					•								-		
Quitte				•	•									•	
Stachelbeere	•				•						•				•
Schwarzer Holunder	•				•			•							•

® Registrierte Warenzeichen/Marken
AGIL, ARINEX, BREVIS, COSAYR, EXELGROW, GOLTIX, MAVRIK VITA, MERPAN, NIMROD, TAIFUN = ADAMA Unternehmensgruppe;
SCORE = Syngenta Konzerngesellschaft;
EXILIS, KUDOS, NOVAGIB = Fine Agrochemicals Ltd.; VERIPHOS = Luxembourg Industries Ltd.

20

^{*}Mindestabstände gemäß Länderrecht beachten! Detaillierte Informationen sowie den entsprechenden Wortlaut der Auflagen finden Sie in der Gebrauchsanleitung, in der ADAMA-Produktinformation oder auf unserer Homepage www.adama.com/de. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.



ANFORDERUNGEN AN DIE SCHUTZAUSRÜSTUNG IM PFLANZENSCHUTZ FÜR KERNOBST

PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel										
	Auflagen/ Anwendungs- bestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 Typ (PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille/ Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz DIN EN 149 oder DIN EN 143; Kennfarbe: weiß				
		<u> </u>	*	L			-				
AGIL-S	SS 2101; SE 110; SS 110	<u> </u>	*	<u>I</u>		-					
ARINEX 30		*									
BREVIS	SS 110; SE 110	<u> </u>				-					
COSAYR	SS 110-1; SS 2101	#	1	Į.							
EXELGROW		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z. B. Gummistiefel)									
EXILIS 100 XL	SS 110-1; SS 2101; SS 610	*	1	L	Â						
GOLTIX GOLD	SS 110-1; SS 2101	#	1	L							
KUDOS	SB 110		Arbeitskleid	dung und festes S	Schuhwerk (z. B. G	ummistiefel)					
MAVRIK VITA	SS 2101; SE 110; SS 110; SS 610	*	1	L	Â	•					
MERPAN 80 WDG	SE 110; SS 110-1; SS 2101		1	ı		-					
NIMROD EC	SS 110-1; SS 2101; SS 610; SE 110	#	1	L	Â	-					
NOVAGIB			Arbeitskleid	dung und festes S	Schuhwerk (z. B. G	ummistiefel)					
SCORE	SE 110; SS 110-1; SS 2101; SS 610	# #	*	L	Â	-					
TAIFUN FORTE			Arbeitskleid	dung und festes S	Schuhwerk (z. B. G	ummistiefel)					
VERIPHOS			Arbeitskleid	lung und festes S	Schuhwerk (z. B. G	ummistiefel)					

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets das Etikett und die Produktinformation lesen. Achten Sie dabei besonders auf zusätzliche Anweisungen, Piktogramme und Gefahrenhinweise für die sichere Anwendung des Produkts. Diese Information ersetzt nicht die Gebrauchsanleitung. Bindend ist der Text an der deutschen ADAMA Verkaufsware. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 11/2025

	н	andhabung	/Ausbringu	ıng des verd	ünnten Mit	tels		
Auflagen/ Anwendungs- pestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 Typ (PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille/ Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz DIN EN 149 oder DIN EN 143; Kennfarbe: weiß	NUR bei Kabinentyp 3 und 4: Schutzkleidung kann in der Kabine entfallen (SB 199)	
SS 206				chuhwerk (z. B. G				SF 245-01
SS 1201-1; SS 206	*	Art	peitskleidung und	l festes Schuhwerl	(z.B. Gummistie	efel)		
SS 206; SS 2202; SS 120; SB 199	#	*	į.				J	SF 1891
SS 206		Arbeitskleid	ung und festes S	chuhwerk (z. B. G	ummistiefel)			SF 245-02
		Arbeitskleid	ung und festes S	chuhwerk (z. B. G	ummistiefel)			
SS 206		Arbeitskleid	ung und festes S	chuhwerk (z.B.G	ummistiefel)			SF 245-02
SS 120-1; SS 2202; SS 206	#	*	į.					SF 245-02
SS 206		Arbeitskleid	ung und festes S	chuhwerk (z. B. G	ummistiefel)			SF 264
SS 120; SS 220; SB 199	#	1	L					SF 1891
SS 2202; ST 1203; SB 199		*	ı			-		SF 1891
SS 206		Arbeitskleid	ung und festes S	chuhwerk (z. B. G	ummistiefel)			SF 245-02; SF2 75-EEOS; SF 275-ZB
		Arbeitskleid	ung und festes S	chuhwerk (z. B. G	ummistiefel)			SF 245-01
SS 206		Arbeitskleid	ung und festes S	chuhwerk (z. B. G	ummistiefel)			SF 245-02
S 206		Arbeitskleid	ung und festes S	chuhwerk (z. B. G	ummistiefel)			SF 245-02
S 206		Arbeitskleid	una und festes S	chuhwerk (z. B. G	ummistiefel)			SF 179

Für jedes Produkt gilt:

(SB 001) Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. (SB 005) Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. (SB 010) Für Kinder unzugänglich aufbewahren. (SB 110) Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. (SB 111) Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten. (SB 166) Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. (SF 245-02 bzw. SF 245-01) Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.



IHRE REGIONALEN ANSPRECHPARTNER:INNEN

VERTRIEBSTEAM NORD-OST

9

TEAMLEITER

Cornell Wienholz Mobil 01 51-14 71 66 98



Henning Höper Mobil 01 51-14 71 66 68



Frederik Guerndt Mobil 01 51-14 51 82 22



Robert David Mobil 01 51-14 71 66 76



Christian Witzke Mobil 01 51-55 05 92 79



Jakob Scapan Mobil 01 51-14 51 82 28



Christoph Forner Mobil 01 51-14 51 82 24

/ERTRIEBSTEAM WE

TEAMLEITER

Christopher Brinkmann Mobil 01 51-14 71 66 32



Klaus-Uwe Oelke Mobil 01 51-14 71 66 99



Fabian Bispinghoff Mobil 01 51-53 13 71 10



Heiner Lindemann Mobil 01 51-14 51 82 23



Stefan Gockel-Böhner Mobil 01 51-14 51 82 31



Pascal Diefert Mobil 01 51-14 71 66 86



TEAMLEITER

Jochen Spall Mobil 01 51-14 71 66 89



Jochen Rief Mobil 01 51-14 71 65 21



Christian Oppel Mobil 01 51-14 61 23 43



Michael Kammermeier Mobil 01 51-14 51 82 26



Markus Hornung Mobil 01 51-14 51 82 21



Stephan Rinderle Mobil 01 71-84 27 43 5

FACHBERATUNG



TEAMLEITER

Dr. Julian Rudelt Mobil 01 51-14 51 82 32



KOORDINATION BERATUNG Dr. Gerd Dingebauer Mobil 01 51-14 71 66 75



Christian Stühmeyer Mobil 01 51-14 71 65 20 Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt



Dr. Lili Hofmann Mobil 01 51-14 71 66 79 Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen



Dr. Uwe Kreusel Mobil 01 51-14 71 66 78 Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland



Dr. Franz-Josef Weis Mobil 01 51-14 71 66 82 Bayern, Sachsen, Thüringen

