

ANTARKTIS

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA PER IL DISERBO DEI
CEREALI A PAGLIA
Sospensione Concentrata

Meccanismo d'azione: gruppi E, B (HRAC)

ANTARKTIS

Registrazione n° 14093 del 10.11.2014 del Ministero della Salute

Composizione:

100 g di prodotto contengono:
Bifenox puro 40,4 g (= 480 g/l)
Florasulam puro 0,42 g (= 5 g/l)
Coformulanti q.b. a 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 – Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P501 – Smaltire il contenitore/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA AGAN L.t.d.

P.O.B. 262 – 77100 Ashdod – ISRAELE

Rappresentata in Italia da:

ADAMA Italia S.r.l.

Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG) Tel. 035328811

Stabilimento di produzione:

ADAMA AGAN LTD-Industrial Zone
P.O. Box 262, Ashdod 77102 – Israele
IRCA Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Stabilimento di confezionamento:

SIPCAM Oxon Spa – Salerano sul Lambro (LO)
Torre - Torrenieri (Si)
Chemark Zrt- 8182 Peremarton – Ungheria

Distribuito da:

ADAMA Italia S.r.l. – Grassobbio (BG)

Contenuto: 1-5-10-15-20 l

Partita n° vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza di 20 m, vegetata, non trattata, dai corpi idrici superficiali.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m dalla zona non coltivata o in alternativa usare ugelli di fine barra.

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m dalla zona non coltivata o in alternativa utilizzare ugelli di fine barra.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

ANTARKTIS è un erbicida a base di Florasulam e Bifenox, due principi attivi dal diverso meccanismo d'azione efficaci nel controllo delle erbe infestanti dicotiledoni di **Frumento Tenero e Duro, Orzo, Segale, Triticale e Avena** in semina autunnale. Florasulam appartiene alla famiglia della triazolopirimidine ed agisce inibendo l'enzima acetolattato sintetasi (ALS) mentre Bifenox appartiene alla famiglia dei nitrodifenileteri ed esplica la sua azione erbicida inibendo l'enzima protoporfirinogeno ossidasi.

INFESTANTI SENSIBILI: Senape nera (*Brassica nigra*) Papavero (*Papaver rhoeas*), Veronica (*Veronica* spp.), Viola (*Viola arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*), Attaccamani (*Gallium aparine*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Nontiscordardimè (*Myosotis arvensis*).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI: Senape (*Sinapis arvensis*), Falloppia convolvolo (*Fallopia convolvulus*), Fiordaliso (*Cetaurea cyanus*), Senecio comune (*Senecio vulgaris*).

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega in post-emergenza da inizio accestimento fino alla levata.

ANTARKTIS viene assorbito dalle radici e dai giovani tessuti delle malerbe quali germogli e foglie che a seguito del trattamento vengono rapidamente devitalizzate.

Si consiglia di trattare le infestanti entro le prime fasi di sviluppo.

DOSE: Impiegare alla dose di 1 l/ha distribuiti con 100-400 litri d'acqua. E' consentito solo un trattamento a stagione. Irrorare omogeneamente la soluzione sulla superficie da diserbare.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:

Il prodotto contiene principi attivi inibitori degli enzimi ALS e PPO. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

In caso di fallimento della coltura dopo un'applicazione di ANTARKTIS, fagioli, semi di girasole e patate possono essere seminati con o senza aratura; per barbabietola da zucchero e lino, la semina viene raccomandata solo se preceduta da aratura del terreno.

FITOTOSSICITÀ

A seguito del trattamento si potrebbero manifestare macchie clorotiche o piccole ustioni sulle foglie le quali non hanno alcun effetto negativo sulla produzione.

Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare le colture vicine.

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

"Etichette autorizzata con decreto dirigenziale del 17.01.2020"