

# SEGURIS® ERA

Fungicida in sospensione concentrata per il frumento e l'orzo

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo H, gruppo M (FRAC)

## COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

isopyrazam g 11.2 (125 g/l)  
protioconazolo g 13.5 (150 g/l)  
coformulanti q.b. a g 100

contiene: 1,2-benzisothiazol-3-one e isopyrazam. Può provocare una reazione allergica



ATTENZIONE

## INDICAZIONI DI PERICOLO

**H319** Provoca grave irritazione oculare. **H361d** Sospettato di nuocere al feto. **H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

## CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

## SYNGENTA CROP PROTECTION AG

Rosentalstrasse 67, 4058 Basilea, (Svizzera)

Rappresentata in Italia da: SYNGENTA ITALIA S.p.A.

Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Distribuito da: Adama Italia S.r.l.

Tel. 035-328811

Registrazione Ministero della Salute n. 16635 del 11.07.2017

## Stabilimenti di produzione:

Syngenta Production France S.A.S., Aigues-Vives (Francia)

## Stabilimento di confezionamento:

Althaller Italia s.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)

S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)

Chemark Kft.- Tulipán utca - H-8182 Peremarton-Gyártelep, Hungary

ADAMA Agriculture España S.A. - Avenida de la Industria, 60,28970 Humanes (Madrid-Spain)

Partita n. vedi corpo della confezione

Altre taglie: litri 1 - 5 - 10 - 20

© marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di malessere, consultare un medico per i consueti interventi di primo soccorso.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Durante la miscelazione, il carico del prodotto e la manipolazione di superfici contaminate usare indumenti (quali ad es. pantaloni lunghi e maglia a maniche lunghe), scarpe e guanti adatti e occhiali di protezione. Per la protezione degli organismi acquatici ridurre la deriva con una zona di sicurezza non trattata di 10 m e utilizzare misure di mitigazione del ruscellamento per una riduzione dell'80% oppure rispettare una fascia vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali.

Non rientrare nelle aeree trattate prima che i depositi sulle superfici fogliari siano completamente asciutti.

## CARATTERISTICHE

Fungicida ad azione preventiva e curativa che esplica un efficace controllo delle principali malattie fogliari del frumento sfruttando i diversi metodi di azione e traslocazione dei due principi attivi componenti la miscela. Il fungicida è in grado di inibire l'infezione dei patogeni target agendo contemporaneamente sull'enzima succinato deidrogenasi (SDHI) e sulla sintesi degli steroli (IBS).

Una volta distribuito rimane in parte sulla vegetazione trattata e in parte viene assorbito ridistribuendosi all'interno della pianta (anche con movimento translaminare e sistemico).

## DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Malattie	Dosi l/ha	Dosi ml/hl*	Applicazione
Frumento	<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphe graminis</i> ) <b>Septoriosi</b> ( <i>Septoria tritici</i> ) <b>Stagonosporiosi</b> ( <i>Stagonospora nodorum</i> ) <b>Ruggine bruna</b> ( <i>Puccinia recondita</i> ) <b>Ruggine gialla</b> ( <i>Puccinia striiformis</i> )	1	250	Massimo 2 applicazioni ad intervallo minimo di 14 giorni dallo stadio d'inizio levata fino allo stadio di fine fioritura.
Frumento	<b>Fusariosi della spiga</b> ( <i>Fusarium sp</i> )	1	250	Una applicazione tra inizio e fine fioritura
Orzo	<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphe graminis</i> ) <b>Maculatura reticolare</b> ( <i>Pyrenophora teres</i> ) <b>Rincosporiosi</b> ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ) <b>Ramularia dell'orzo</b> ( <i>Ramularia collo-cygni</i> ) <b>Ruggine bruna</b> ( <i>Puccinia hordei</i> )	1	250	Massimo 2 applicazioni ad intervallo minimo di 14 giorni dallo stadio d'inizio levata fino allo stadio di fine spigatura

\* L'indicazione della dose per ettolitro si riferisce al volume d'acqua di riferimento di 400 l/ha. Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati per la distribuzione, si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella.

## Note ed istruzioni per l'uso

Limitatamente agli interventi contro la fusariosi della spiga, per una maggiore efficacia fungicida e per ottenere la maggior riduzione possibile del Deossinivalenolo (DON) prodotto dal fungo stesso, l'applicazione deve essere effettuata all'emissione delle antere.

## PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA

SEGURIS ERA è un prodotto a base di isopyrazam, sostanza attiva appartenente al gruppo 7, e di protioconazolo, sostanza attiva appartenente al gruppo 3, secondo la classificazione del FRAC (Fungicide Resistance Action Committee).

Si raccomanda di applicare il prodotto preventivamente seguendo il limite indicato in tabella di due applicazioni per anno sulla medesima coltura.

Inoltre, per ridurre il rischio di selezione di ceppi resistenti alle sostanze attive appartenenti al medesimo gruppo dell'Isopyrazam (gruppo 7) della classificazione FRAC si raccomanda di non effettuare più di due applicazioni per stagione, sulla stessa coltura, con tali sostanze.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 8 luglio 2020

### **PREPARAZIONE DELLA MISCELA**

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare.

- Riempire la botte di acqua per un terzo ed aggiungere direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio mantenendo in funzione l'agitatore.
- Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed opportuni detergenti.

### **ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per la salute umana e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

**Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 8 luglio 2020**

