

# CENTURIO

ESCA INSETTICIDA PER LA LOTTA CONTRO GLI INSETTI DEL TERRENO DA INTERRARE LUNGO LA FILA ALLA SEMINA O TRAPIANTO O APPLICARE A SPAGLIO IN SUPERFICIE, IN PIENO CAMPO

## CENTURIO

Registrazione Ministero della Sanità n. 15093 del 14.12.2011

### Composizione

Clorpirifos puro 1 g  
Coformulanti q.b. a 100 g

**INDICAZIONE DI PERICOLO:** H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**EUH401** - Per evitare rischi per la salute umana per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini; P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.



## ATTENZIONE

**ADAMA Makhteshim Ltd**

P.O.B 60 – 84100 Beer-Sheva – Israele

Rappresentata in Italia da:

**ADAMA Italia S.r.l.**

Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)

Tel. 035 328811

### Stabilimenti di produzione:

ADAMA Makhteshim Ltd.– Beer Sheva (Israele)

Sipcam Oxon SpA – Salerano Sul Lambro (LO)

ISAGRO SPA – Aprilia (LT)

KOLLANT Srl- Maniago (PN)

RIMI CHEMICALS CO. Ltd - Petach Tikva (Israele)

### Stabilimento di confezionamento:

ADAMA Agriculture España SA 8970 HUMANES MADRID (Spagna)

Sipcam Oxon SpA – Salerano Sul Lambro (LO)

IMC LIMITED – Malta

ZAPI S.p.A.- Conselve (PD)

### Distribuito da:

KOLLANT Srl – Padova

C.I.F.O. Spa - S. Giorgio di Piano (BO)

GREEN RAVENNA SRL – Ravenna (RA)

SEPRAN S.r.l. – Isola Vicentina (VI)

ZAPI S.p.A.- Conselve (PD)

Contenuto: 300 - 500 g 1-3-4-5-10-20

kg

Partita n. vedi timbro

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

In caso di applicazioni a spaglio per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**NORME PRECAUZIONALI:** Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**Sintomi:** colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

**Sintomi muscarinici (di prima comparsa):** nausea, vomito, crampi muscolari, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare, Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

**Sintomi nicotinici (di seconda comparsa):** astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

**Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma.

**Cause di morte:** generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

**Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

**AVVERTENZA:** Consultare un Centro Antiveneni.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

CENTURIO è un'esca insetticida granulare, indicato nella lotta contro gli insetti del terreno ed in superficie. Interrare il prodotto lungo la fila al trapianto o alla semina o applicare a spaglio nelle vicinanze della coltura. Il prodotto è utilizzabile in pieno campo. Effettuare un solo trattamento annuo. Per colture seminate applicare il prodotto prima o durante la semina ed incorporarlo al terreno con una leggera erpicatura o fresatura.

**Agrumi, Melo, Pero, Cotogno, Nespolo, Pesco, Nettare, Albicocco, Susino, Ciliegio, Mandorlo, Nocciolo, Noce, Castagno, Vite da vino e da tavola, Olivo, Cotone:** contro larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, maggiolino, etc...) ortotteri (grilli, cavallette, locuste, grillo talpa etc..) e *Forficula auricularia* alla dose di **10-20 kg per ettaro** di coltura. Contro formiche e oziorrinco applicare alla dose di **5-10 kg per ettaro** di coltura.

Per melo e pero eseguire il trattamento fino alla fioritura o al più tardi allo stadio di frutto appena formato. Per pesco e vite da tavola eseguire il trattamento solo fino alla fioritura.

**Fragola, Pianta ornamentali, Tappeti erbosi, Tabacco:** contro larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, maggiolino, oziorrinco,

etc...) ortotteri (grilli, cavallette, locuste, grillo talpa etc..) alla dose di **10-20 kg per ettaro** di coltura.

**Patate, Barbabietola da zucchero, Aglio, Cipolla, Scalogno, Lattuga, Scarola, Cicoria, Indivia, Radicchio, Rucola, Dolcetta:** contro larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, maggiolino, oziorrinco, etc...) ortotteri (grilli, cavallette, locuste, grillo talpa etc..) alla dose di **10-20 kg per ettaro** di coltura.

**Pomodoro, Peperone, Melanzana, Zucca :** contro larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, maggiolino, oziorrinco, etc...) ortotteri (grilli, cavallette, locuste, grillo talpa etc..), alla dose di **10-20 kg per ettaro** di coltura.

Per pomodoro, peperone e melanzana eseguire il trattamento solo fino alla fioritura.

**Mais, Cavoli (Cavoletti di Bruxelles):** contro larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, diabrotica, maggiolino, oziorrinco, etc...) ortotteri (grilli, cavallette, locuste, grillo talpa etc..), alla dose di **10-20 kg per ettaro** di coltura.

**Fumento, Orzo, Miglio, Avena, Segale, Grano saraceno:** contro larve di lepidotteri, ditteri, coleotteri (elateridi, maggiolino, oziorrinco, etc...) ortotteri (grilli, cavallette, locuste, grillo talpa etc..), formiche alla dose di **10-20 kg per ettaro** di coltura.

**COMPATIBILITÀ:** Il prodotto va impiegato da solo.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 90 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEL MELO, PERO E PESCO, 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI UVA DA TAVOLA, MANDARINO, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLA PATATA; 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI POMODORO E PEPERONE, 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI MELANZANA**

**ATTENZIONE:** da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI  
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE  
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
DA NON VENDERSI SFUSO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE  
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**