

STOPPER P

Diserbante selettivo per frumento, orzo, segale, triticale (SOSPENSIONE CONCENTRATA)

STOPPER P

Autorizzazione del Ministero della Salute
n. 15229 del 28.10.2013

Composizione

Pendimetalin puro 35,62 g (=400 g/l)
Diflufenican puro 3,56g (=40 g/l)
coadiuvanti, solventi q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410

– Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 – Contiene pendimethalin e 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.
EUH401 – Per evitare i rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA AGAN Ltd.

P.O.B 262 - Ashdod 77100 - Israele
Rappresentata in Italia da:

ADAMA Italia S.r.l.

Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:

ADAMA AGAN Ltd. - P.O.B 262 - Ashdod 77100 - Israele

Distribuito da:

Syngenta Italia S.p.A. - Milano (MI)

Contenuto: 1-5-10-15-20 Litri



ATTENZIONE

Durante le operazioni di miscelazione, carico e applicazione indossare guanti protettivi adatti.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 m dai corpi idrici superficiali, di cui 10 metri di fascia vegetata.

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m da zona non coltivata.

NORME PRECAUZIONALI:

Si consiglia di agitare il prodotto se esso non appare omogeneo dopo la conservazione.

Si consiglia di sciacquare il contenitore almeno quattro volte dopo l'uso.

INFORMAZIONI MEDICHE

Sintomi: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.

Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: STOPPER P è un diserbante di pre-emergenza e post-emergenza precoce, selettivo nei confronti di frumento, orzo, segale, triticale.

È efficace contro le seguenti malerbe a nascita da seme:

Sensibili: *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del Pastore), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum persicaria* (Poligono persicaria), *Sinapis arvensis* (Senape), *Stellaria media* (Centocchio), *Veronica* spp. (Veronica), *Viola* spp. (Viola), *Calepina* spp. (Calepina), *Poa* spp. (Poa), *Lamium purpureum* (Falsa ortica), *Matricaria* spp. (Camomilla).

Mediamente sensibili: *Chenopodium album* (Farinaccio), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Lolium* spp. (Loglietto), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Senecio vulgaris* (Senecio), *Sonchus* spp. (Sonco).

Non è efficace contro le infestanti perennanti in generale. Prevalentemente attivo nella fase di germinazione dei semi, il prodotto controlla le infestanti sensibili anche nella fase di plantula purché non oltre allo stadio di 2-3 foglie vere per le dicotiledoni e della 1ª foglia per le graminacee.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato su terreno finemente lavorato, senza zollosità e ben livellato in modo che non si possano formare ristagni d'acqua. Per un corretto funzionamento del prodotto, è necessario che intervenga una pioggia entro le 2 settimane successive all'applicazione. Le colture su cui viene effettuato il diserbo devono presentare una regolare ed uniforme profondità di semina senza avere semi scoperti in superficie.

Frumento, orzo, segale, triticale: Applicare alla dose di **1,5 - 2,5 L/ha**, in pre-emergenza o in post-emergenza precoce (fino ad accestimento).

Distribuire il prodotto in quantitativi di acqua di 100- 400 L/ha. Effettuare 1 solo trattamento per stagione.

AVVERTENZA:

Nel caso di miscele estemporanee con altre formulazioni, si raccomanda l'uso immediato della miscela.

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico sulle colture seminate irregolarmente con semi posti superficialmente e sulle colture non riportate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 90 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE
LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.