



Ficha Técnica NIMITZ 480 EC

NIMITZ®480EC

INGREDIENTE ACTIVO

NOMBRE QUÍMICO

GRUPO QUÍMICO

CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN

MODO DE ACCIÓN

FABRICANTE/ FORMULADOR

DISTRIBUIDOR EN CHILE

TOXICIDAD

ANTÍDOTO

AUTORIZACIÓN SAG N°

FLUENSULFONE

5-chloro-2-(3,4,4-trifluoro-but-3-ene-1-sulfonyl)-thiazole

FLUOROALQUENIL SULFONA HETEROCICLICA

480 g/L – 48% p/v

Contacto

Adama Makhteshim Ltd.

Adama Chile S.A.

Grupo III Producto poco peligroso

No tiene antídoto conocido. Tratamiento médico de emergencia: sintomático.

1849

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

NIMITZ®480EC es un nematocida de contacto con actividad residual, causa un efecto irreversible después de la aplicación, lo que se traduce en un cese de la alimentación, parálisis, efecto ovicida y finalmente la muerte del Nematodo de las Agallas (*Meloidogyne incognita*, *Meloidogyne arenaria*, *Meloidogyne javanica*, *Meloidogyne ethiopica*, *Meloidogyne hapla*) de acuerdo con lo señalado en el cuadro de instrucciones de uso

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS (L/há)	OBSERVACIONES
Tomate (invernadero)	Nemátodo de las Agallas (<i>Meloidogyne incognita</i> , <i>M. arenaria</i> , <i>M. javanica</i> , <i>M. ethiopia</i> , <i>M. hapla</i>)	2.0 – 3.0	Realizar 1 aplicación por temporada, mediante sistema de riego por goteo 10 días antes del trasplante, inyectando el producto en el segundo tercio del riego Realizar un primer riego, 3 días antes de la aplicación del producto Luego, en un segundo riego y 10 días antes del trasplante, aplicar el producto durante el segundo tercio del mismo riego Posteriormente, a los 6 y 8 días de la aplicación del producto, realizar un tercer y cuarto riego respectivamente. Volumen de agua: 40-80 m3, dependiendo de la textura del suelo. Suelos arenosos utilizar menor volumen de agua y en suelos arcillosos mayor volumen de agua

Preparación de la mezcla: Previo a la aplicación **NIMITZ® 480 EC**, realizar una pre – dilución de la dosis por hectárea, en un estanque de 200 Litros de agua. Para esto agregar la cantidad de producto en un estanque lleno de agua, agitar y posteriormente inyectar al sistema de riego.

Precauciones: No aplicar **NIMITZ® 480 EC** vía foliar en ninguna etapa del cultivo. No debe ser aplicado en mezcla con otros productos.

ADAMA

Casa Matriz: Camino Catemito 2800 | Calera de Tango | Santiago | Chile. Fono +56(2)2855 0048 | Fax +56(2)2855 0504

Sucursal: Av. Bernardo O'Higgins Sur N° 0270 | San Fernando | Chile. Fonos +56(72)272 1955 | +56(72)272 1541 |

adama.com/chile



Ficha Técnica NIMITZ 480 EC

Fitotoxicidad: Es fitotóxico en contacto con las plantas de tomate. No realizar aplicaciones posteriores al trasplante. **NIMITZ® 480 EC** no es fitotóxico si se emplea de acuerdo con las recomendaciones de uso de la etiqueta.

Incompatibilidad: No debe ser aplicado en mezcla con otros preparados. Una vez preparado el producto en agua, aplíquelo el mismo día.

Compatibilidad: No debe ser aplicado en mezcla con otros productos.

Periodo de Carencia: Debido a la época de aplicación del producto, no corresponde indicar un período de carencia

Tiempo de Reingreso al Área Tratada: Período de resguardo para el ingreso de las personas es de 12 horas. No corresponde indicar período de reingreso para animales por tratarse de cultivos que no son destinados al consumo animal.

ADAMA