

PLENUM[®] 50 WG

Insecticide

Specialist tegen luizen



ADAMA

Werkzame stof:

Pymetrozine

Gehalte:

50%

Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar
granulaat

Resistentiecode: IRAC 9B

Toelatingsnummer: 12491N (W.4)

Toelatinghouder:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK LEUSDEN, Nederland

www.adama.com

Scan voor gebruik



5 KG e

Plenum[®] is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Celsius B.V., Curaçao Branch

ANEPLENLSKG/01/A

PLENUM® 50 WG

Insecticide



Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 50% Pymetrozine
Toelatingsnummer: 12491N (W.4)
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

GEVARENAANDUIDINGEN

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen • P202: Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft • P273: Voorkom lozing in het milieu • P280C: Beschermende handschoenen en

beschermende kleding dragen
• P308 + P313: Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koude en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UN 3077

Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd.



8 718077 002309 >



NEDERLAND

WAARSCHUWING



ANEPLEN15KG/01/B

PLENUM® 50 WG




hier openen

Insecticide

Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 50% Pymetrozine
Toelatingsnummer: 12491N (W.4)
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

GEVARENAANDUIDINGEN

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H412:** Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen • **P202:** Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft • **P273:** Voorkom lozing in het milieu • **P280C:** Beschermende

handschoenen en beschermende kleding dragen • **P308 + P313:** Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

WAARSCHUWING



UN 3077

Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd.



NEDERLAND

ANEPLENL5KG/01/B

EERSTE HULP

GEBRUIK & DOSIS

EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

Slachtoffer in de frisse lucht brengen. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Slachtoffer warm en rustig houden. Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum waarschuwen.

Contact met de huid

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Onmiddellijk afwassen met veel water. Als de huidirritatie voortduurt, een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.

Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Contactlenzen uitnemen. Onmiddellijke medische zorg is noodzakelijk.

Inname

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. GEEN braken opwekken.

ADVIES VOOR DE ARTS

Er is geen specifieke antistof verkrijgbaar. Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden

SPECIMEN

Toepassingsvoorwaarden

| Toepassingsgebied | Type toepassing | Werkzaamheid getoetst op | Dosering* middel per toepassing | Maximale dosering (middel) per toepas- sing | Maximaal aantal toepassingen per teelt cyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal kg middel per ha per teelt cyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toe- passingen in dagen | Veilig- heids- ter- mijn in dagen |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|--|
| Pootaardappel | gewasbe- handeling | Bladluis ¹ | 0,3 kg/ha | 0,3 kg/ha | 2 per teeltcyclus | 0,6 kg/ha per teeltcyclus | 7 | 7 |
| Consumptieaardap- pel | gewasbe- handeling | Bladluis ² | 0,3 kg/ha | 0,3 kg/ha | 2 per teeltcyclus | 0,6 kg/ha per teeltcyclus | 7 | 7 |
| Zetmeelaardappel | gewasbe- handeling | Bladluis ² | 0,3 kg/ha | 0,3 kg/ha | 2 per teeltcyclus | 0,6 kg/ha per teeltcyclus | 7 | 7 |
| Sla (<i>Lactuca spp.</i>) | gewasbe- handeling | Bladluis ³ | 0,4 kg/ha | 0,4 kg/ha | 3 per 12 maanden | 1,2 kg/ha per 12 maanden | 7 | 14 |
| Andijvie (onbedekte teelt) | gewasbe- handeling | Bladluis ³ | 0,4 kg/ha | 0,4 kg/ha | 3 per 12 maanden | 1,2 kg/ha per 12 maanden | 7 | 14 |

| Toepassingsgebied | Type toepassing | Werkzaamheid getoetst op | Dosering* middel per toepassing | Maximale dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teelt cyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal kg middel per ha per teelt cyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheids-termijn in dagen |
|--|------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------|
| Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt) | gewasbehandeling | Bladluis ⁴ | 0,02% (20 gram per 100 liter water) | 0,24 kg/ha | 2 | 2,7 kg/ha | 7 | 1 |
| | | Wittevlieg ⁵ | 0,06% (60 gram per 100 liter water) | 0,9 kg/ha | 3 per 12 maanden | | | |
| Vrucht-groenten van Cucurbitaceae met niet eetbare schil (bedekte teelt) | gewasbehandeling | Bladluis ⁴ | 0,02% (20 gram per 100 liter water) | 0,24 kg/ha | 2 per 12 maanden | 2,7 kg/ha per 12 maanden | 7 | 1 |

| Toepassingsgebied | Type toepassing | Werkzaamheid getoetst op | Dosering* middel per toepassing | Maximale dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teelt cyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal kg middel per ha per teelt cyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheids-ter-mijn in dagen |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|
| Vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte teelt) (met uitzondering van tomatillo) | gewasbe-handeling | Wittevlieg ⁵ | 0,06% (60 gram per 100 liter water) | 0,9 kg/ha | 3 per 12 maanden | | | |
| | | Bladluis ⁴ | 0,02% (20 gram per 100 liter water) | 0,24 kg/ha | 2 per 12 maanden | 2,7 kg/ha per 12 maanden | 7 | 1 |
| | | Wittevlieg ⁵ | 0,06% (60 gram per 100 liter water) | 0,9 kg/ha | 3 per 12 maanden | | | |
| | druppelbe-handeling | Bladluis ⁴ | 10 gram per 1000 plan-ten | 0,24 kg/ha | 1 per 12 maanden | | | |
| | | Wittevlieg ⁵ | 15 gram per 1000 plan-ten | 0,36 kg/ha | 1 per 12 maanden | | | |
| Sluitkool | gewasbe-handeling | Bladluis ⁶ | 0,4 kg/ha | 0,4 kg/ha | 3 per 12 maanden | 1,2 kg/ha per 12 maanden | 7 | 14 |

| Toepassingsgebied | Type toepassing | Werkzaamheid getoetst op | Dosering* middel per toepassing | Maximale dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teelt cyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal kg middel per ha per teelt cyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheids-ter-mijn in dagen |
|---|-------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|
| Bloemkoolachtigen | gewasbe-handeling | Bladluis ⁶ | 0,4 kg/ha | 0,4 kg/ha | 3 per 12 maanden | 1,2 kg/ha per 12 maanden | 7 | 14 |
| Aromatische kruidgewassen (met uitzon-dering van eetbare bloemen) | gewasbe-handeling | Bladluis ³ | 0,4 kg/ha | 0,4 kg/ha | 3 per 12 maanden | 1,2 kg/ha per 12 maanden | 7 | 14 |

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

- ¹ Vuilboomluis (*Aphis frangulae*)
- ² Groene perzikluis (*Myzus persicae*), Rode luis (*Myzus nicotianae*), Katoenluis (*Aphis gossypii*), Aardappeltopluis (*Macrosiphum euphorbiae*), Wegedoorluis (*Aphis nasturtii*), Vuilboomluis (*Aphis frangulae*).
- ³ Groene perzikluis (*Myzus persicae*), Aardappeltopluis (*Macrosiphum euphorbiae*), Boterbloemluis (*Aulacorthum solani*), Groene slaluis (*Nasonovia ribisnigri*)
- ⁴ Katoenluis (*Aphis gossypii*), Groene perzikluis (*Myzus persicae*), rode luis (*Myzus nicotianae*), Aardappeltopluis (*Macrosiphum euphorbiae*).
- ⁵ Kaswittevlug (*Trialeurodes vaporariorum*)
- ⁶ Groene perzikluis (*Myzus persicae*), Aardappeltopluis (*Macrosiphum euphorbiae*), Melige koolluis (*Brevicoryne brassicae*)

Overige Toepassingsvoorwaarden

Dit middel is gevaarlijk voor bijen en hommels. Niet toegestaan is toepassing op in bloei staande gewassen of in niet-bloeiende planten wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik is wel toegestaan op in bloei staande gewassen onder glas, mits er geen bijen en hommels in de kas aanwezig zijn. Bijen en hommelskasten sluiten, afdekken of verwijderen tijdens toepassing. Bijenvolken (her)introduceren 2-3 dagen na toepassing van Plenum 50 WG.

Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof pymetrozine. De IRAC code is 9, subgroep B. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van het resistentie-management dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperving" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

SPECIMEN

PLENUM[®] 50 WG

Insecticide

Specialist tegen luizen

Werkzame stof:

Pymetrozine

Gehalte:

50%

Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat

Resistentiecode: IRAC 9B

Toelatingsnummer: 12491N (W.4)

Toelatinghouder:

ADAMA Registrations B.V.


Arnhemseweg 87

3832 GK LEUSDEN, Nederland

www.adama.com

2 x 5 KG

Plenum[®] is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Celsius B.V., Curaçao Branch



ADAMA


ANEPLNLSKG/01/C1

PLENUM[®] 50 WG

PLENUM® 50 WG

Insecticide

Specialist tegen luizen



Werkzame stof:

Pymetrozine

Gehalte:

50%

Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat

Resistentiecode: IRAC 9B

Toelatingsnummer: 12491N (W.4)

Toelatinghouder:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87

3832 GK LEUSDEN, Nederland

www.adama.com

2 x 5 KG

Plenum® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Celsius B.V., Curaçao Branch

Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 50% Pymetrozine

Toelatingsnummer: 12491N (W.4)

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

GEVARENAANDUIDINGEN

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H412:** Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **P201:** Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen • **P202:**

Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft • **P273:** Voorkom lozing in het milieu • **P280C:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • **P308 + P313:** Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Scan voor gebruik



Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd.

UN 3077



STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL



NEDERLAND

WAARSCHUWING



ANEPLNLSKG/01/C2