

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type Toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Lelie (niet grondgebonden bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Vuur ¹	1 L/ha	1 L/ha	3	7
Lelie (onbedekte teelt)	Dompelbehandeling	Fusarium ⁴	1,25 % (1,25 L middel per 100 l water)	-	1	--
Lelie (niet-grondgebonden bedekte teelt)	Dompelbehandeling	Fusarium ⁴	1,25 % (1,25 L middel per 100 l water)	-	1	--
Tulp (niet-grondgebonden bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Vuur ²	1 L/ha	1 L/ha	3	7
Tulp (onbedekte teelt)	Dompelbehandeling	Fusarium ⁴	1,25 % (1,25 L middel per 100 l water)	-	1	--
Tulp (niet-grondgebonden bedekte teelt)	Dompelbehandeling	Fusarium ⁴	1,25 % (1,25 L middel per 100 l water)	-	1	--
Gladiool	Dompelbehandeling	Fusarium ⁴	1,25 % (1,25 L middel per 100 l water)	-	1	--
Hyacint (niet-	Dompel-	Fusarium ⁴	1,25 %	-	1	--

Toepassingsgebied	Type Toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
grondgebonden bedekte teelt)	behandeling	huidziekte ⁶	(1,25 L middel per 100 l water)			
Nerines (niet-grondgebonden bedekte teelt)	Dompelbehandeling	Bolrot ⁵	1,25 % (1,25 L middel per 100 l water)	-	1	--
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt), lage teelt tot 50 cm hoogte	Gewasbehandeling	Bladvlekken ³	0,35% (0,35 L middel per 100 liter water)	1,05 l/ha	2	7

¹ Vuur (*Botrytis elliptica*)

² Vuur (*Botrytis tulipae*)

³ Bladvlekken (*Phoma* spp. en *Septoria* spp.)

⁴ *Fusarium* (*Fusarium* spp.)

⁵ Bolrot (*Fusarium sacchari*)

⁶ Huidziekte (*Embellisia*)

Toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is een gewasbehandeling in de teelt van boomkwekerijgewassen uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

Bij toepassing als gewasbehandeling in de teelt van boomkwekerijgewassen geldt dat het middel uitsluitend toegepast mag worden voor de bloei.

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas, inclusief bollen en/of knollen.

Als er nog geen ervaring is opgedaan in een gewas of ras, verdient het aanbeveling om door een proefbespuiting vast te stellen of het gewas of ras de behandeling verdraagt.

Bij toepassing in boomkwekerijgewassen dient Mirage Plus verspoten te worden met een volume van 150-300 liter water per ha.