

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Actueel WG van het middel Spirit, 13168 N
1 juli 2016

W.3

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
lelie (onbedekte teelt)	Vuur ¹	1,5 l/ha	1,5 l/ha	1	1,5 l/ha	-
tulp (onbedekte teelt)	Vuur ¹	1,5 l/ha	1,5 l/ha	1	1,5 l/ha	-
lage boomkwekerijgewassen <50 cm (onbedekte teelt)	Bladvlekkenziekte ²	0,35% (350 ml middel per 100 liter water)	1,4 l/ha	2	2,1 l/ha	5
lage vaste planten <50 cm (onbedekte teelt)	Bladvlekkenziekte ²	0,35% (350 ml middel per 100 liter water)	1,4 l/ha	2	2,1 l/ha	5

¹ Vuur (*Botrytis* spp.)

² Bladvlekkenziekte (*Phoma* spp. *Septoria* spp.)

Het gebruik in de bedekte bolbloemteelt van lelie en tulp is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassings-gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter/kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bolbloementeelt van lelie (bedekte, niet grondgebonden teelt)	Vuur ¹	1,5-2,0 l/ha	2,0 l/ha	4	6 l/ha	7
Bolbloementeelt van tulp (bedekte, niet grondgebonden teelt)	Vuur ¹	1,5-2,0 l/ha	2,0 l/ha	4	6 l/ha	7

¹ Vuur (*Botrytis* spp.)

Toepassingsvoorwaarden

In de onbedekte teelt van tulp en lelie toepassen in een watervolume van 200 tot 400 liter water per ha.

In lage boomkwekerijgewassen en vaste planten toepassen in een watervolume van maximaal 400 liter water per ha.

Het is niet toegestaan dit middel toe te passen door middel van een met de hand getrokken of geduwde spuitboom (spuitfiets).

Om de zoogdieren te beschermen is toepassing in onbedekte teelten van lage boomkwekerijgewassen en lage vaste planten uitsluitend toegestaan indien geen andere vegetatie dan het geteelde gewas aanwezig is of als de totale bodembedekking van het gewas meer dan 70% is.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van lage boomkwekerijgewassen < 50 cm, lage vaste planten <50 cm en elies en tulpen uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Daar waar geen ervaring is opgedaan in het gewas of ras, verdient het aanbeveling om door een proefbespuiting vast te stellen of het gewas of ras de behandeling verdraagt.