




EMPHASIS^{MC}

Présentation d'EMPHASIS^{MC} :

Un emballage combinant deux matières actives (carfentrazone et bromoxynil) qui, lorsque mélangées en réservoir avec du glyphosate, offrent trois modes d'action permettant un traitement de brûlage rapide d'environ 70 mauvaises herbes à feuilles larges et de graminées.



GROUPES 14 et 6

Matières actives

- Carfentrazone-éthyle à 240 g/L en tant que CE = EMPHASIS^{MC} A
- Bromoxynil (présent sous la forme d'ester octanoate) à 240 g/L en tant que CE = BROMOTRIL^{MD}

Format

Caisse combine :

- 2 bidons de 0,6 L d'EMPHASIS^{MC} A
- 2 bidons de 9,7 L de BROMOTRIL^{MD}

Volume d'eau

Voie terrestre : min. de 40 L/acre (10 gal US/acre)

Voie aérienne : Ne pas appliquer

Résistance à l'entraînement par la pluie

6 heures

Stade de la culture

Présemis

DOSES D'APPLICATION ET N^{BRE} D'ACRES POUVANT ÊTRE TRAITÉS

Canola

Doses : 15 mL/acre d'EMPHASIS^{MC} + 236 mL de BROMOTRIL^{MD}

Acres pouvant être traités : 80 acres/caisse

Avoine, blé, orge

Doses : 30 mL/acre d'EMPHASIS^{MC} + 472 mL de BROMOTRIL^{MD}

Acres pouvant être traités : 40 acres/caisse

CULTURES HOMOLOGUÉES

- Avoine
- Blé (printemps, hiver)
- Canola
- Orge

COMMENT LE PRODUIT AGIT-IL ?

EMPHASIS^{MC} est un herbicide de contact et à modes d'action multiples qui permet de supprimer les mauvaises herbes à feuilles larges, y compris les biotypes résistants* aux herbicides des groupes 2 et 9, tels que le Kochia.

Dans les quelques heures suivant l'application, le feuillage des mauvaises herbes sensibles montre des signes de dessiccation, et dans les jours qui suivent, la nécrose et la mort de la plante surviennent.

* N'inclut pas la vergerette du Canada résistante aux herbicides du Groupe 9

EMPHASIS^{MC}

MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES

Lorsqu'utilisé conformément au mode d'emploi, l'emballage combiné d'EMPHASIS^{MC} permet de supprimer les mauvaises herbes indiquées ci-dessous. Consulter l'étiquette du glyphosate pour les doses et le choix des stades des mauvaises herbes spécifiques et toujours suivre le mode d'emploi de l'étiquette la plus stricte.

MÉLANGE EN RÉSERVOIR HOMOLOGUÉ ET VALIDÉ

Glyphosate

Canola : présemis (80 acres/caiss)		
Mauvaises herbes supprimées par EMPHASIS^{MC} utilisé seul :		Doses :
<ul style="list-style-type: none"> • Abutilon • Acnide tuberculée¹ • Amarante à racine rouge • Canola spontané⁶ 	<ul style="list-style-type: none"> • Chénopode blanc² • Gloire du matin³ • Morelle noire • Morelle noire de l'Est¹ 	<ul style="list-style-type: none"> • EMPHASIS^{MC} A : 15 ml/acre • BROMOTRIL^{MD} : 236 ml/acre
Autres mauvaises herbes supprimées lorsqu' EMPHASIS^{MC} est mélangé en réservoir avec du glyphosate (à la dose indiquée)*		
Mauvaises herbes supprimées par EMPHASIS^{MC} utilisé seul ainsi que :		
<ul style="list-style-type: none"> • Amarante hybride • Céréales spontanées (orge, avoine, blé) • Lampourde • Moutarde des champs 	<ul style="list-style-type: none"> • Renouée persicaire • Renouée scabre • Saponaire des vaches • Sétaire verte 	<ul style="list-style-type: none"> • EMPHASIS^{MC} A : 15 ml/acre • BROMOTRIL^{MD} : 236 ml/acre • Glyphosate : 180 g é. a./acre
Mauvaises herbes supprimées avec 180 g é. a./acre, ainsi que :		
<ul style="list-style-type: none"> • Astragale peigné • Bourse-à-pasteur • Brome des toits • Chardon des champs (stade de la rosette, terre en jachère) • Chiendent⁵ • Crépis des toits • Digitale • Gaillet gratteron • Kochia • Laiteron potager 	<ul style="list-style-type: none"> • Laitue scariole • Ortie royale • Pâturin glauque (annuel) • Petite herbe à poux • Pissenlit (moins de 15 cm) • Renouée liseron • Sagesse-des-chirurgiens • Sétaire géante • Soude roulante • Tabouret des champs • Vergerette du Canada⁴ 	<ul style="list-style-type: none"> • EMPHASIS^{MC} A : 15 ml/acre • BROMOTRIL^{MD} : 236 ml/acre • Glyphosate : 360 g é. a./acre
Blé, avoine, orge : présemis (40 acres/caisse)		
Mauvaises herbes supprimées par EMPHASIS^{MC} lorsqu'utilisé seul :		Doses :
<ul style="list-style-type: none"> • Abutilon • Acnide tuberculée¹ • Amarante (blanche, à racine rouge, rugueuse) • Canola spontané • Chénopode blanc² • Gloire du matin³ • Mollugine verticillée 	<ul style="list-style-type: none"> • Morelle (d'Amérique, noire, noire de l'Est¹, poilue) • Moutarde-tanaisie • Persicaire pâle • Pourpier potager • Sarrasin (commun, de Tartarie) • Séneçon vulgaire • Stramoine commune 	<ul style="list-style-type: none"> • EMPHASIS^{MC} A : 30 ml/acre • BROMOTRIL^{MD} : 472 ml/acre
La combinaison d'EMPHASIS ^{MC} + glyphosage permet de supprimer environ 70 mauvaises herbes (ne sont pas toutes indiquées ici). Voir l'étiquette sur le glyphosate pour la liste complète des mauvaises herbes supprimées selon la dose.		

¹ Jusqu'à 5 cm | ² Jusqu'à 7,5 cm | ³ Jusqu'à 3 feuilles | ⁴ N'inclut pas la vergerette du Canada résistante aux herbicides du Groupe 9 |

⁵ Infestations légères ou moyennes, 3-4 feuilles vertes ou plus | ⁶ y compris les variétés tolérantes au glyphosate

* Les autres mauvaises herbes supprimées par le glyphosate concernent les traitements de canola et de blé/avoine/orge.

DIRECTIVES DE MÉLANGE

1. Remplir le réservoir de pulvérisation avec la ½ du volume d'eau propre nécessaire.
2. Avec l'agitateur en marche, ajouter la quantité requise d'EMPHASIS^{MC} dans le réservoir de pulvérisation.
3. Ajouter la quantité requise de BROMOTRIL^{MD}.
4. Ajouter plus d'eau, puis mettre du glyphosate.
5. Terminer de remplir le réservoir jusqu'au niveau voulu.

ROTATION DES CULTURES

Aucune restriction

ENTREPOSAGE

Garder à l'abri du gel.



ADAMA

Il est important de toujours lire et suivre le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette.
1 855 264-6262 ADAMA.COM

^{MD/MC} BROMOTRIL est une marque déposée et EMPHASIS est une marque commerciale d'ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltée. Tous les autres produits mentionnés sont des marques de leurs fabricants respectifs.
© 2022 ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltée.