



THRASHER^{MD}

Offre un excellent double mode d'action pour la suppression de 26 mauvaises herbes à feuilles larges résistantes dans le blé et l'orge.



GROUPES 4 ET 6

Matières actives

Ester d'octanoate de bromoxynil 225 g/L et 2,4-D (ester 2-éthylhexylique) 225 g/L = EC

Format

Caisse : 2 bidons de 10 L

Doses d'application et nombre d'acres pouvant être traités

Dose : 500 mL/ac

Acres traités : 20 ac/bidon

Volume d'eau

Voie terrestre : 20 à 40 L/ac (5-10 gal US/ac)

Voie aérienne : 12 à 16 L/ac (3 à 4 gal US/ac)

Résistance à l'entraînement par la pluie

1 heure

CULTURES HOMOLOGUÉES

- Blé (de printemps)
- Orge

MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES (STADE DE 4 FEUILLES SAUF SI INDIQUÉ)

- Abutilon (3 pouces de hauteur)
- Amarante à racine rouge
- Amarante résistante à la triazine
- Bardanette
- Bourse-à-pasteur
- Canola spontané
- Chénopode blanc (8 feuilles)
- Kochia à balais (2 pouces de hauteur 1 à 12 feuilles)
- Lampourde glouteron
- Morelle d'Amérique
- Moutarde des champs (8 feuilles)
- Moutarde sauvage
- Persicaire pâle
- Petite herbe à poux
- Renouée liseron (8 feuilles)
- Renouée persicaire
- Sagesse-des-chirurgiens
- Saponaire des vaches
- Sarrasin (8 feuilles)
- Sarrasin de tartarie (8 feuilles)
- Séneçon vulgaire (8 feuilles)
- Sétaire verte
- Silène de nuit
- Soude roulante (2 à 12 feuilles)
- Tabouret des champs (8 feuilles)
- Tournesol spontané

¹ stade de 8 feuilles

² y compris l'amarante résistante aux triazines.

COMMENT LE PRODUIT AGIT-IL ?

Combinaison d'activité systémique et de contact avec de mauvaises herbes jaunissant en 2 à 4 jours et présentant une croissance anormale (feuilles tordues et coupées) en 2 à 10 jours.



THRASHER^{MD}

STADE DES CULTURES

4 feuilles jusqu'au début de la feuille étendard

MÉLANGES EN RÉSERVOIR HOMOLOGUÉS ET VALIDÉS

BISON^{MD} 400 L

DIRECTIVES DE MÉLANGE

1. Remplir le réservoir du pulvérisateur à moitié avec de l'eau.
2. Ajouter la quantité requise de THRASHER^{MD} et bien agiter.
3. Remplir le réservoir avec l'eau restante et agiter à nouveau avant utilisation.

ROTATION DES CULTURES

Aucune restriction l'année suivant l'application

INTERVALLES AVANT RÉCOLTE

30 jours

RESTRICTIONS DE PÂTURAGE

- Ne pas permettre au bétail de paître dans les champs dans les 30 jours suite à l'application.
- Ne pas récolter, fourrager ou couper pour le foin dans les 30 jours suite à l'application.
- Retirer les animaux de boucherie des champs traités au moins 3 jours avant l'abattage.

ENTREPOSAGE

- Peut être conservé à n'importe quelle température.
- Bien agiter avant d'utiliser.

CONSEILS PRATIQUES

Pour obtenir les meilleurs résultats en cas de couvert végétal important ou lorsque la majorité des mauvaises herbes sont la saponaire des vaches, la renouée ou l'amarante, utiliser des volumes d'eau plus importants. Pulvériser lorsque les mauvaises herbes sont au stade de plantule.

Appliquer dans de bonnes conditions de croissance. L'application doit être effectuée avant que le couvert végétal ne protège les mauvaises herbes.



Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette du pesticide.
1.855.264.6262 ADAMA.COM

^{MD/MC} THRASHER et BISON sont des marques déposées de commerce de ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltée.

Tous les autres produits mentionnés sont des marques de leurs fabricants respectifs.
© 2022 ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltée.