



ADAMA

Lorsqu'il s'agit de pommes, la protection contre les insectes nuisibles et les maladies est essentielle à la production de fruits de haute qualité. En utilisant la plus grande bibliothèque d'actifs au monde pour formuler des solutions nouvelles et appropriées, ADAMA peut offrir aux producteurs de pommes Canadiens plus de choix et de meilleures options pour les protéger contre les insectes et les maladies.

CORMORAN^{MD}

La synergie des deux modes d'action de CORMORAN^{MD} avec du novaluron et de l'acétamipride permet un contrôle plus constant, une plus grande souplesse en ce qui concerne le moment de l'application et un meilleur contrôle de des principaux insectes qui aiment les pommes autant que vous!

Bénéfices Principaux :

- Action rapide d'élimination combinée à un contrôle résiduel prolongé
- Double mode d'action pour la gestion de la résistance
- Lutte contre tous les stades nuisibles des insectes ciblés, y compris les formes immatures et adultes
- Deux modes d'action distincts assurant un excellent contrôle
- Excellent produit de rotation

Réinsertion et Intervalles Avant Récolte :

Intervalle de Réinsertion :

- Amincissement des fruits : 7 jours
- Toutes les activités : 12 heures

Intervalles Avant Récolte : 14 jours

CLIQUEZ ICI À ACCÉDER TOUS LES DÉTAILS DE PRODUIT.



GROUPE 4 & 15

Meilleur pour le contrôle :

Principaux ennemis des cultures : Pucerons, carpocapse de la pomme, cicadelles, charançon de la prune, mineuse des feuilles

Autres ennemis des cultures : Mouche de la pomme, sésie du cornouiller, hoplocampe des pommes, noctuelle des fruits verts, spongieuse, scarabée japonais, petit carpocapse de la pomme, punaise de la molène, tordeuse orientale du pêcher, punaise terne

FOLPAN^{MD} 80 WDG

FOLPAN^{MD} 80 WDG, un fongicide granulaire dispersable dans l'eau, contrôle la gale ainsi qu'une multitude d'autres maladies foliaires. Il offre une protection exceptionnelle contre les maladies les plus courantes et les plus dommageables sur le plan économique pour les pommes. Utiliser FOLPAN^{MD} 80 WDG dans le cadre d'un programme d'entretien régulier.

Bénéfices Principaux :

- Mode d'action de contact multi-site
- Capacité de protection
- Contrôle des maladies à large spectre
- Délai de sécurité favorable et souplesse de récolte.

Réinsertion et Intervalles Avant Récolte :

Intervalle de Réinsertion :

- Récolte (manuelle et mécanique) : 1 jour
- Éclaircissage à la main des fruits : 6 jours
- Toutes les activités : 12 heures

Intervalles Avant Récolte : 1 jour

CLIQUEZ ICI À ACCÉDER TOUS LES DÉTAILS DE PRODUIT.



GROUPE M4

Meilleur pour le contrôle :

Tache alternarienne de la pomme, pourriture noire, tache phoméenne du pommier, moucheture de la pomme, tavelure, tache de suie

VANTANA^{MC} NOUVEAU

Ce fongicide protecteur à large spectre du groupe 29 est un outil de lutte contre la résistance très important qui agit sur les maladies fongiques les plus difficiles à contrôler dans les pommes.

Bénéfices Principaux :

- Outil de gestion contre la résistance
- Maîtrise à large spectre des maladies
- Des doses multiples pour un contrôle précis

Réinsertion et Intervalles Avant Récolte :

Intervalle de Réinsertion : 24 heures

Intervalles Avant Récolte : 28 jours

CLIQUEZ ICI À ACCÉDER TOUS LES DÉTAILS DE PRODUIT.




GROUPE 29

Meilleur pour le contrôle :

Rouille de Virginie du pommier (contrôle)

Pourriture noire, tache phoméenne du pommier, rouille du cognassier (suppression)



Pour les graminées/non graminées cultivées pour la production de semences uniquement, NE PAS donner de déchets de prêtrement et des repousses au bétail.

Il est important de toujours lire et suivre le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette.

Numéro sans frais : 1.855.264.6262 | ADAMA.COM

ARMORY^{no}, CORMORAN^{no}, FOLPAN^{no} et SQUADRON^{no} sont des marques déposées, et VANTANA^{sc} sont des marques de commerce d'ADAMA Group Company. Tous les autres produits sont des marques de commerce de leurs sociétés respectives. © 2025 ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltée.