FONGICIDE

ADAMA

ORIUS[MD] 430 SC

ORIUS[MD] 430 SC représente votre nouvel outil de choix pour la protection contre le fusarium. La gamme unique de fongicides d'ADAMA vous permet de mener une lutte intégrée pour les maladies dans vos cultures céréalières.

Matière active :
Tébuconazole

Groupe de fongicides :
Groupe 3

Formulation :
Tébuconazole 430 g/L = SC

Doses d'application et formats :
- Avoine : 89 mL/acre
- Blé et Orge : 89 à 118 mL/acre
- 80 à 105 acres/bidon

- 2 bidons de 9,44 L par caisse

Cultures homologuées :
Avoine, blé (printemps, hiver), orge

PRINCIPAUX AVANTAGES :

- Large fenêtre d'application
- Protection éprouvée contre le fusarium
- Maîtrise les pertes de rendement causées par les maladies foliaires affectant le blé, l'orge et l'avoine

PRINCIPALES MALADIES SUPPRIMÉES :

- Fusariose de l'épi (répression)
- Tache des glumes causée par Stagonospora (Septoria)

Maîtrise aussi les maladies foliaires et maladies des tiges suivantes :

- Rouilles (brune, noire, jaune)
- Tache septorienne
- Taches bronzées (auréolées)
- Oïdium (blanc)
- Rayure réticulée
- Tache helminthosporienne
- Rhynchosporiose

FONCTIONNEMENT :

Le fongicide foliaire ORIUS[MD] 430 SC peut être appliqué comme traitement de postlevée pour le blé (de printemps, d'hiver), l'orge et l'avoine afin de réprimer la fusariose de l'épi et de maîtriser les maladies foliaires.

FONGICIDE

ORIUS[MD] 430 SC

STADES DE LA CULTURE :

Culture	Maladies	Période d'application	Dose
Blé (de printemps, d'hiver)	Pour réprimer la fusariose de l'épi Pour maîtriser la tache des glumes causée par Stagonospora (Septoria)	Pour la répression optimale de la fusariose de l'épi et la maîtrise de la tache des glumes causée par Stagonospora (Septoria), appliquer le fongicide foliaire ORIUS[MD] 430 SC entre le moment où au moins 75 % des épis sur la tige principale sont totalement sortis et celui où 50 % des épis sur la tige principale sont en fleur. Pour la pulvérisation, une bonne couverture s'avère essentielle : s'assurer de bien couvrir tous les épis.	118 mL/acre
	Rouilles (brune ou des feuilles), des tiges (noire) et jaune (striée) Tache septorienne Taches bronzées (auréolées)	Appliquer le fongicide foliaire ORIUS[MD] 430 SC sur les feuilles dès les premiers signes ou au tout premier stade de la maladie, surtout si les conditions météorologiques favorisent le développement de la maladie, jusqu'à la fin de la floraison. Envisager l'utilisation d'une dose plus élevée lorsque les conditions météo favorisent un important développement de la maladie.	89 à 118 mL/acre
	Oïdium (blanc)		118 mL/acre
Orge	Rayure réticulée Tache helminthosporienne Rouille des feuilles (brune) Rouille des tiges (noire) Rouille jaune (striée) Tache septorienne Taches bronzées (taches auréolées)	Appliquer le fongicide foliaire ORIUS[MD] 430 SC aux tous premiers stades de développement de la maladie. Envisager l'utilisation de la dose plus élevée lorsque les conditions météo favorisent un important développement de la maladie.	89 à 118 mL/acre
Avoine	Rouille des tiges	Appliquer le fongicide foliaire ORIUS[MD] 430 SC aux tous premiers stades de développement de la maladie.	89 mL/acre

ORIUS[MD] 430 SC POUR MAÎTRISER LA FUSARIOSE DE L'ÉPI DANS LE BLÉ ET LE BLÉ DUR – SOMMAIRE DE 10 ESSAIS (2016)



⚠ Il est important de toujours lire et suivre le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette.

ORIUS[MD] 430 SC

Lutte intégrée contre les maladies foliaires

Mise au point expressément pour les céréales, notre gamme de fongicides est formulée pour vous aider à gérer certaines maladies foliaires parmi les plus nuisibles. Utilisez ce guide pour vous aider à déterminer le meilleur produit et le bon moment de pulvérisation pour votre culture, afin de vous protéger des maladies lorsque vous en avez le plus besoin.

Blé d'hiver	Blé	Orge	Avoine	Stade de croissance	Germination			Tallage				Montaison						Épiaison		Maturation
					0	5	9	10-13	21	25	29	30	31	32	37	39	45	49-51	61	70-92
				Produit (n° de groupe)																
•	•	•	•	**BUMPER[MD] 432 EC** (3) **Tache septorienne, taches auréolées (bronzées)** Application du fongicide avec un herbicide : une demi-dose au moment du traitement herbicide est une assurance peu coûteuse, surtout si les conditions météorologiques sont propices à l'apparition de maladies.				■	■	■	■									
•	•	•		**CUSTODIA[MD]** (3 & 11) **Rouille des feuilles (rouille brune), rouille jaune (striée), taches auréolées (bronzées), tache septorienne, tache helminthosporienne** Application du fongicide si les conditions météorologiques sont favorables à l'apparition de maladies foliaires. L'objectif est de protéger la feuille étendard.								■	■	■	■	■	■			
•	•	•	•	**ORIUS[MD] 430 SC** (3) **Fusariose de l'épi, rouille des feuilles (rouille brune), rouille jaune (striée), taches auréolées (bronzées), tache septorienne, tache helminthosporienne** Pour la fusariose de l'épi, application à l'épiaison														■	■	

⚠ Il est important de toujours lire et suivre le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette.

FONGICIDE

ORIUS[MD] 430 SC

VOLUME D'EAU :

Application terrestre : minimum de 40 L/acre ou 10 gal/acre

Application aérienne : minimum de 20 L/acre ou 5 gal/acre

RÉSISTANCE À L'ENTRAÎNEMENT PAR LA PLUIE :

Éviter de pulvériser quand de fortes pluies sont prévues.

MÉLANGES EN RÉSERVOIR VALIDÉS :

Il est recommandé d'utiliser le fongicide foliaire ORIUS[MD] 430 SC avec un agent tensioactif non ionique homologué, comme Agral 90[MD] ou AgSurf, à raison de 0,125 % v/v.

DIRECTIVES DE MÉLANGE :

1. Utiliser 40 L d'eau/acre pour les applications terrestres et 19 L d'eau/acre pour les applications aériennes.
2. Utiliser un filtre de 50 mailles (ou dont les mailles sont plus espacées).
3. Emplir la cuve du pulvérisateur avec de l'eau jusqu'aux trois quarts.
4. Ajouter dans le pulvérisateur la quantité nécessaire de fongicide foliaire ORIUS[MD] 430 SC.
5. Agiter jusqu'à ce que le fongicide soit bien mélangé.
6. Continuer d'agiter et ajouter la quantité nécessaire de produit d'association pour mélange en réservoir.
7. Continuer d'agiter tout en ajoutant la quantité nécessaire de l'agent tensioactif non ionique homologué recommandé, à raison de 0,125 % v/v.
8. Finir de remplir la cuve avec de l'eau au niveau désiré.
9. Une fois la pulvérisation terminée, rincer complètement la cuve, la rampe, les boyaux et les filtres de conduite et les tamis de buse avec de l'eau propre afin d'éviter tout dommage éventuel aux autres cultures.
10. Répéter les étapes de nettoyage du pulvérisateur en utilisant une solution de nettoyage adéquate pour système de pulvérisation.

ROTATION DES CULTURES :

Aucune restriction

DÉLAIS D'ATTENTE AVANT LA RÉCOLTE :

Blé, orge et avoine : les applications ne peuvent pas être effectuées dans les 36 jours précédant la récolte.

RESTRICTIONS DE PÂTURAGE :

Au cours des 6 jours suivant un traitement, ne pas permettre aux animaux d'aller au pâturage ou ne pas leur servir de fourrages verts. La paille coupée après la récolte peut être servie aux animaux ou utilisée comme litière.

ENTREPOSAGE :

1. Conserver dans le contenant d'origine, hermétiquement fermé, à plus de 5 °C.
2. Ne pas expédier ni conserver le produit à proximité de la nourriture destinée à la consommation humaine ou animale, ni près des semences et des engrais fertilisants.
3. Conserver dans un endroit frais, sec, verrouillé, bien aéré et sans drain au sol.
4. Garder à l'abri du gel.

Conseils pratiques

Le moment d'application est critique : pour la répression optimale de la fusariose de l'épi et la suppression de la tache des glumes causée par Stagonospora (Septoria), appliquer le fongicide foliaire ORIUS[MD] 430 SC entre le moment où au moins 75 % des épis de la tige principale sont totalement sortis et celui où 50 % des épis sur la tige principale sont en fleur. Une bonne couverture de pulvérisation est essentielle : s'assurer de couvrir complètement tous les épis de blé. Il est recommandé d'utiliser le fongicide foliaire ORIUS[MD] 430 SC avec un agent tensioactif non ionique homologué, comme Agral 90[MD] ou AgSurf à 0,125 % v/v.

ADAMA

Il est important de toujours lire et suivre le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette.
Pour appeler sans frais : 1 855 264 6262
Site Web : ADAMA.COM/CANADA/FR

[MD/MC] BUMPER, CUSTODIA et ORIUS sont des marques déposées d'ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd.
Tous les autres produits sont des marques de commerce de leur société respective. © 2021 Adama Agricultural Solutions Canada Ltd.