FONGICIDE

ADAMA

TOPNOTCH[MC]

Nouvelle option à large spectre et à modes d'action multiples pour maîtriser les maladies dangereuses chez les légumineuses ainsi que les maladies foliaires des céréales.

Matières actives :

Azoxystrobine et propiconazole

Groupes de fongicides :

Groupe 3 et Groupe 11

Formulation :

Azoxystrobine 143 g/L et Propiconazole 124 g/L = SC

Doses d'application et formats :

- 0,21 à 0,62 mL/ac
- 135 à 410 acres/bidon

- 2 bidons de 8,6 L par caisse

Culture homologuées :

- Avoine
- Blé
- Haricots comestibles
- Lentilles
- Orge
- Pois des champs
- Seigle
- Soya
- Triticale

PRINCIPAUX AVANTAGES :

- Modes d'action multiples pour la gestion de la résistance
- Action systémique curative et préventive
- Peut être utilisé sur plusieurs cultures, avec une sécurité exceptionnelle pour celles-ci
- Homologué pour la pulvérisation terrestre ou aérienne
- Excellente maîtrise de la rouille couronnée de l'avoine

PRINCIPALES MALADIES SUPPRIMÉES :

- Anthracnose
- Ascochytose (brûlure ascochytique)
- Moisissure blanche[1] (pourriture sclérotique)
- Mycosphaerella blight
- Oïdium (blanc)
- Rayure réticulée
- Rouille des feuilles (rouille brune) de l'orge
- Rouille des feuilles (rouille brune)
- Rouille striée (rouille jaune)
- Tache auréolée
- Tache helminthosporienne
- Tache pâle
- Tache septorienne

COMMENT LE PRODUIT AGIT-IL ? :

Utilisé à la fois pour ses propriétés préventives et curatives, le fongicide TOPNOTCH[MC] procure une activité de contact et systémique à large spectre.

MOMENT D'APPLICATION ET STADE DE LA CULTURE:

Culture	Maladies	Période d'application	Dose
Orge	Rayure réticulée de l'orge, tache pâle, tache septorienne, rouille striée (rouille jaune), rouille des feuilles (rouille brune) de l'orge, tache auréolée	Appliquer une fois entre la montaison et la mi-épiaison (stades de croissance 29 à 55).	0,21 L/acre
Haricots, pois des champs, lentilles, soja	Ascochytose (brûlure ascochytique), anthracnose	Effectuer la première application au premier signe de la maladie. Appliquer la dose supérieure uniquement en conditions de forte pression de la maladie. Une seconde application peut être requise 14 jours plus tard si les conditions persistent. Pour des résultats optimaux, il est important que le produit pulvérisé couvre et pénètre bien le couvert végétal.	0,31 à 0,62 L/acre
	Oïdium (blanc), moisissure blanche[1] (pourriture sclérotique)		0,31 L/acre
Avoine	Rayure réticulée de l'orge, rouille couronnée, tache septorienne	Appliquer une fois entre la montaison et la mi-épiaison (stades de croissance 29 à 55).	0,21 L/acre

[1]Répression seulement

FONGICIDE

TOPNOTCH[MC]

Crop	Diseases	Application Timing	Rate
Seigle	Tache septorienne, tache pâle de l'orge, tache auréolée	Appliquer une fois entre la montaison et la mi-épiaison (stades de croissance 29 à 55).	0,21 L/acre
Triticale	Tache septorienne, tache auréolée		
Blé	Tache septorienne, tache auréolée, rouille striée (rouille jaune), rouille brune (des feuilles)		

STADES DE CROISSANCE DES POIS

STADE DE CROISSANCE	PRÉSEMIS	LEVÉE	1	2	3	4	6	8	AVANT LA RÉCOLTE
PRODUIT TOPNOTCH[MC]		■	■	■	■	■	■	■	

STADES DE CROISSANCE DU SOYA

STADE DE CROISSANCE	TRAITEMENT DES SEMENCES	PRÉSEMIS	LEVÉE	1	2	3	FLORAISON	AVANT LA RÉCOLTE
PRODUIT TOPNOTCH[MC]			■	■	■	■	■	

Le moment de l'application est basé sur le produit utilisé seul. Veuillez consulter les étiquettes des produits d'association pour les moments d'application de ces produits sur les cultures.

⚠ Il est important de toujours lire et suivre le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette.

TOPNOTCH[MC]

STADES DE CROISSANCE DES LENTILLES

STADE DE CROISSANCE	PRÉSEMIS	LEVÉE	1	2	3	FLORAISON	AVANT LA RÉCOLTE
PRODUIT							
TOPNOTCH[MC]		■	■	■	■	■	

STADES DE CROISSANCE DES CÉRÉALES

		Germination			Tallage				Montaison						Épiaison		Maturation
Blé d'hiver / Blé / Orge / Avoine	Stade de croissance	0	5	9	10-13	21	25	29	30	31	32	37	39	45	49-51	61	70-92
	Produit (no de groupe)																
• • • •	**BUMPER[MD] 432 EC** (3) **Tache septorienne, taches auréolées (bronzées)** Application du fongicide avec un herbicide : une demi-dose au moment du traitement herbicide est une assurance peu coûteuse, surtout si les conditions météorologiques sont propices à l'apparition de maladies.				■	■	■	■									
• • •	**CUSTODIA[MD]** (3 et 11) **Rouille des feuilles (rouille brune), rouille jaune (striée), taches auréolées (bronzées), tache septorienne, tache helminthosporienne** Application du fongicide si les conditions météorologiques sont favorables à l'apparition de maladies foliaires. L'objectif est de protéger la feuille étendard.								■	■	■	■	■	■			
• • • •	**ORIUS[MD] 430 SC** (3) **Fusariose de l'épi, rouille des feuilles (rouille brune), rouille jaune (striée), taches auréolées (bronzées), tache septorienne, tache helminthosporienne** Pour la fusariose de l'épi, application à l'épiaison.														■	■	
• • • •	**TOPNOTCH[MC]** (3 et 11) **Tache septorienne, taches auréolées (bronzées), rouille jaune (striée), rouille des feuilles (rouille brune)**								■	■	■	■	■	■			

Le moment de l'application est basé sur le produit utilisé seul. Veuillez consulter les étiquettes des produits d'association pour les moments d'application de ces produits sur les cultures.

⚠ Il est important de toujours lire et suivre le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette.

FONGICIDE

TOPNOTCH[MC]

VOLUME D'EAU :

Application terrestre : minimum de 100 L/ha ou 40 L/acre

Application aérienne : 45 L/ha ou 20 L/acre

RÉSISTANCE À L'ENTRAÎNEMENT PAR LA PLUIE :

Ne pas appliquer lorsque le risque de pluie est imminent. La couverture des feuilles et la pénétration dans le couvert végétal sont cruciales.

MÉLANGES EN RÉSERVOIR VALIDÉS :

Insecticides:

- SILENCER[MD] 120 EC, Matador[MD], Coragen[MD], Voliam XPress[MD], Decis[MD]

Herbicides:

- Assure[MD]II, ARROW[MD]240 EC, ARROW ALL IN[MC], LEOPARD[MD],Liberty[MD,], Poast Ultra[MD]

DIRECTIVES DE MÉLANGE :

1. Remplir la cuve du pulvérisateur de la moitié ou les deux tiers avec de l'eau.
2. Le dispositif d'agitation en marche, ajouter la quantité requise de TOPNOTCH[MC] et continuer l'agitation en ajoutant le reste de l'eau.
3. Commencer l'application quand TOPNOTCH[MC] est complètement dissous dans l'eau de mélange et maintenir l'agitation durant toute l'application.

ROTATION DES CULTURES :

Ne pas ensemencer une autre culture destinée à l'alimentation, au pâturage ou à tout autre ingrédient faisant partie de l'alimentation ou de la litière animale pendant les 105 jours suivant l'application.

DÉLAIS D'ATTENTE AVANT LA RÉCOLTE :

Céréales : 45 jours

Pois des champs, haricots, soya : 15 jours

Lentilles : 30 jours

RESTRICTIONS DE PÂTURAGE :

Aucune restriction

ENTREPOSAGE :

Ne pas entreposer à des températures inférieures à 0 °C.

Conseils pratiques

Pour des résultats optimaux, il est important que le produit pulvérisé couvre et pénètre bien le couvert végétal.

ADAMA

Il est important de toujours lire et suivre le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette.
Pour appeler sans frais: 1.855.264.6262
Site Web: ADAMA.COM/CANADA/FR

[MD/MC] BUMPER, CUSTODIA, ORIUS et SILENCER sont des marques déposées et TOPNOTCH est une marques de commerce d'ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd. Tous les autres produits sont des marques de commerce de leur société respective.
© 2021 ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd.