HERBICIDE

ADAMA

ARROW[MD] 240 EC

Obtenez une suppression à large spectre des mauvaises herbes graminées dans le soya, les pommes de terre, les haricots et autres cultures à feuilles larges et de spécialité.

Matière active :
Cléthodime

Groupe d'herbicides :
Groupe 1

Formulation:
Cléthodime 240 g/L = EC

Doses d'application et format :
- 50 mL/acre pour infestations légères ou 60 acres/caisse
- 75 mL/acre pour infestations modérées ou 40 acres/caisse
- 150 mL/acre pour le chiendent ou 20 acres/caisse
- 1 bidon de 3 L + 1 bidon de 9 L de l'adjuvant X-ACT[MD]

CULTURES HOMOLOGUÉES :
- Bleuets en corymbe
- Canneberges
- Canola
- Coriandre
- Épinards
- Fenugrec
- Haricots
- Lentilles
- Lin
- Luzerne (plantules)
- Moutarde
- OEillets
- Oignons, secs
- Pois de grande culture
- Pois chiches
- Pommes de terre
- Solin
- Soya
- Tournesol

MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES :

Espèces de graminées	Stade de feuilles	Doses
Sétaire (verte, jaune), folle avoine, céréales spontanées (blé, orge, avoine)	2 à 4	50 mL/acre
Pied-de-coq, panic d'automne, millet commun, maïs spontané, alpiste roseau spontané, panic capillaire	2 à 6	50 mL/acre
Pied-de-coq, digitaire (sanguine, astringente), panic d'automne, sétaire (verte, jaune), ivraie de Perse, millet commun, alpiste roseau spontané, céréales spontanées (blé, orge, avoine), maïs spontané, folle avoine, panic capillaire Répression du chiendent	2 à 6	75 mL/acre
Suppression du chiendent	2 à 6	150 mL/acre

COMMENT LE PRODUIT AGIT-IL ?
La matière active est transféré du feuillage traité aux points de croissance des feuilles, des pousses et des racines. Le feuillage passe d'abord du vert au jaunâtre, puis au violacé et enfi n au brun. La nouvelle feuille de la plante aff ectée s'arrache facilement en 3 à 5 jours. Le temps nécessaire pour une suppression complète est normalement de 7 à 21 jours après le traitement, en fonction des conditions de croissance et de la concurrence des cultures.

HERBICIDE

ARROW[MD] 240 EC

VOLUME D'EAU :

- Application terrestre : 20 à 90 L/acre pour obtenir une couverture de pulvérisation uniforme
- Ne pas appliquer par voie aérienne.

RÉSISTANCE À L'ENTRAÎNEMENT PAR LA PLUIE :

1 heure

STADE DES CULTURES :

- La plupart des cultures sont tolérantes à tous les stades, il faut donc cibler les applications au stade optimal des mauvaises herbes.
- Toujours respecter le délai d'attente avant la récolte pour chaque culture.

MÉLANGES EN RÉSERVOIR HOMOLOGUÉS ET VALIDÉS :

- Canola : Lontrel[MD] ou Muster[MD]
- Canola Clearfield[MD] seulement : PHANTOM[MD] 240 SL
- Canola LibertyLink[MD] seulement : Liberty[MD]
- Pois de grande culture : PHANTOM[MD] 240 SL
- Lin (y compris les variétés à faible teneur en acide linoléniqu) : BADGE[MD]
- Lin (excluant les variétés à faible teneur en acide linolénique) : Lontrel[MD], MCPA (ester)
- Soya tolérant au glyphosate : glyphosate

DIRECTIVES DE MÉLANGE :

1. Remplir le réservoir de pulvérisation propre à moitié avec de l'eau. Commencer l'agitation.
2. Ajouter la quantité appropriée d'ARROW[MD] 240 EC. Continuer à agiter.
3. Ajouter la quantité appropriée d'adjuvant X-ACT[MD] ainsi que la quantité d'eau restante nécessaire pour remplir le réservoir du pulvérisateur.
4. Continuer à agiter ou à faire fonctionner le système de dérivation.
5. Après toute interruption de l'opération de pulvérisation, bien agiter avant de pulvériser à nouveau.
6. Ne pas laisser le mélange reposer toute la nuit.
7. En cas de mélange en réservoir, suivre les instructions de l'étiquette pour chaque produit ajouté.

DOSE DE L'ADJUVANT :

- 0,5 à 1,0 % v/v X-ACT[MD]
- Utiliser une dose plus élevée (1 % v/v) de X-ACT[MD] pour une meilleure suppression du chiendent.

RESTRICTIONS DE PÂTURAGE :

Ne pas couper les cultures traitées pour l'alimentation ou le pâturage avant 60 jours après l'application.

ENTREPOSAGE :

- Peut être conservé à n'importe quelle température.
- Bien agiter avant utilisation.

ROTATION DES CULTURES :

Aucune restriction lorsqu'appliqué seul

INTERVALLES AVANT RÉCOLTE :

- Luzerne, fenugrec : 30 jours
- Bleuets, épinards : 14 jours
- Canola, coriandre, haricots, lentilles, lin (incluant les variétés à faible teneur en acide linoléique), moutarde, pommes de terre, pois chiches: 60 jours
- Oignons : 45 jours
- Soya, pois de grande culture : 75 jours
- Tournesol : 72 jours

CONSEILS PRATIQUES :

ARROW[MD] 240 EC fonctionne mieux lorsqu'il est appliqué sur des mauvaises herbes en pleine croissance. La repousse des talles peut se produire si le produit est appliqué sur les mauvaises herbes dans des conditions de stress. ARROW[MD] 240 EC doit être utilisé avec l'adjuvant X-ACT[MD].

ADAMA

Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette du pesticide.
1.855.264.6262
ADAMA.COM/CANADA/FR

[MD/MC] ARROW, BADGE, PHANTOM et X-ACT sont des marques déposées de commerce de ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd. Tous les autres produits mentionnés sont des marques de leurs fabriquants respectifs.
© 2021 ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltée.