HERBICIDE

ADAMA

ARROW ALL IN[MC]

Simplifiez la pulvérisation et gardez une longueur d'avance grâce à l'antigraminée de nouvelle génération du Canada, qui contient un surfactant intégré pratique.

Matière active :
Cléthodime 120 g/L

Groupe d'herbicides :
Groupe 1

Formulation :
Cléthodime 120 g/L = EC

Dose d'application et format :
- Dose standard : 150 mL/acre ou 80 acres par caisse
- Infestations légères et mauvaises herbes faciles à supprimer : 100 mL/acre ou 120 acres par caisse
- Suppression du chiendent : 300 mL/acre pour ou 40 acres par caisse

- 2 bidons de 6 L par caisse

Ne vous contentez pas d'une suppression minimale des graminées lorsque vous pouvez bénéficier d'une formulation avancée avec ARROW ALL IN[MC].

Il offre la même suppression efficace que les autres herbicides à base de cléthodime, mais avec une formulation plus concentrée, un nombre réduit de bidons et la commodité supplémentaire d'un surfactant intégré. Cela se traduit par moins de temps passé à préparer la pulvérisation et plus de temps consacré à faire le travail.

PRINCIPAUX AVANTAGES :

- Options flexibles de mélange en réservoir
- Une seule solution pour lutter contre les mauvaises herbes graminées dans plusieurs cultures, notamment le soya, le canola, les légumineuses, et diverses cultures spéciales
- Il a été prouvé qu'il était aussi efficace que d'autres produits à base de cléthodime, comme Centurion[MD].
- Le surfactant est prémélangé : cela simplifie la pulvérisation, est pratique et permet de gagner du temps.
- Une caisse avec surfactant intégré permet de traiter 80 acres, ce qui réduit de moitié le nombre de caisses par champ et permet d'économiser temps et tracas.
- Une solution éprouvée : bien que nouvelle au Canada et unique sur notre marché, la formulation d'ARROW ALL IN[MC] est utilisée par des producteurs du monde entier, qui lui font confiance.
- La formulation supérieure assure un mélange systématiquement meilleur que celui des produits concurrents.

HERBICIDE

ARROW ALL IN[MC]

Résultats des essais au champ

Résumé

- Après avoir fait le total des résultats, on a constaté qu'ARROW ALL IN[MC] était tout aussi efficace, ou légèrement plus efficace, que les autres applications : ARROW ALL IN[MC] a permis un taux de suppression de 93 %, tandis qu'ARROW[MC] 240 EC et Centurion[MD], de BASF, ont permis un taux de suppression de 91 %.
- Les résultats statistiques ont reflété les témoignages des producteurs, qui ont noté qu'ARROW ALL IN[MC] était une solution pratique et offrait une efficacité comparable (ou supérieure) aux autres traitements à base de cléthodime.

À propos des essais

- On a réalisé de vastes essais au champ chez des agriculteurs qui ont appliqué le produit dans neuf lieux du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta (Brunkild, MB.; Brandon, MB.; Carlyle, SK.; Norquay, SK.; Cando, SK.; Swift Current, SK.; Foremost, AB.; Spirit River, AB.; Vegreville, AB.)
- On a traité diverses mauvaises herbes, dont la folle avoine, les céréales spontanées, le blé spontané, la sétaire verte, le blé dur spontané, le brome des toits et l'orge queue-d'écureuil.

OUEST CANADIEN (vastes essais au champ dans 9 sites)



*Quatre sites seulement

TÉMOIGNAGES DE PRODUCTEURS SUR LES ESSAIS EN PARCELLES

« La culture est belle. La suppression des mauvaises herbes est excellente. » – Brandon, Man.

« ARROW ALL IN[MC] est beaucoup plus facile et pratique à utiliser. » – Cando, Sask.

« ARROW ALL IN[MC] est facile à utiliser grâce au surfactant intégré. » – Foremost, Alb.

« ARROW ALL IN[MC] a permis d'obtenir de façon constante une bonne suppression des graminées lorsqu'il a été mélangé avec DAVAI[MC] 80 SL. Aucune différence notable n'a été constatée dans le champ entre les deux traitements. Dans l'ensemble, très bon désherbage. » – Swift Current, Sask.

ARROW ALL IN[MC] contre Centurion[MD]

- Efficacité égale ou supérieure à celle de Centurion[MD] avec la moitié des emballages
- Surfactant intégré : moins de bidons, plus de commodité
- Simplification du mélange en réservoir, du chargement, de l'entreposage et de l'élimination grâce à un emballage réduit



Centurion[MD]
640 acres = **32 bidons**

=

ARROW ALL IN[MC]
640 acres = **16 bidons**

Caisse = 2 bidons × 6 L

⚠ Il est important de toujours lire et suivre le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette.

COMMENT LE PRODUIT AGIT-IL ?

La matière active se déplace du feuillage traité vers les points de croissance des feuilles, des pousses et des racines. Les feuilles jaunissent d'abord, puis deviennent pourpres avant de finalement brunir. Les nouvelles feuilles se détachent facilement de la mauvaise herbe traitée en 3 à 5 jours. Normalement, une suppression complète est obtenue de 7 à 21 jours après le traitement, selon les conditions de croissance et la concurrence exercée par la culture.

Cultures homologuées	Principales mauvaises herbes supprimées		
Bleuets en corymbe Canneberges Canola Coriandre Épinards Fenugrec Haricots Lentilles Lin Moutarde Œillet des fleuristes Oignons Plantule de luzerne Pommes de terre Pois chiches (types desi, kabuli) Pois des champs Soya Tournesols	**Graminées**	**Stade de feuilles**	**Dose**
	Céréales spontanées (blé, orge, avoine), folle avoine, sétaire (verte et glauque)	2 à 4	100 mL/acre
	Alpiste (phalaris) des Canaries spontané, échinochloa pied-de-coq, maïs spontané, millet commun, panic capillaire, panic d'automne	2 à 6	100 mL/acre
	Alpiste (phalaris) des Canaries spontané, céréales spontanées (blé, orge, avoine), chiendent (répression), digitaires (astringente et sanguine), échinochloa pied-de-coq, folle avoine, ivraie de Perse, maïs spontané, millet commun, panic capillaire, panic d'automne, sétaires (verte et glauque)	2 à 6	150 mL/acre
	Chiendent (suppression)	2 à 6	300 mL/acre

STADES DE LA CULTURE :

- La plupart des cultures sont tolérantes à cet herbicide à tous les stades, effectuer les traitements au stade optimal de développement des mauvaises herbes.
- Toujours respecter le délai d'attente avant la récolte pour toutes les cultures.

VOLUME D'EAU :

- Utilisation recommandée : 40 L/acre ou 10 gal/acre
- Par voie terrestre seulement

RÉSISTANCE À L'ENTRAÎNEMENT PAR LA PLUIE :

Une heure après l'application

MÉLANGES EN RÉSERVOIR VALIDÉS :

- Lin : BADGE[MD][1]; MCPA (ester)[2]; Lontrel[MD] 360[2]
- Canola : Lontrel[MD] 360; Muster[MD]; PHANTOM[MD] 240 SL ou Pursuit[MD] (canola tolérant à l'imazéthapyr seulement); Liberty[MD] (variétés de canola tolérantes au glufosinate-ammonium)
- Pois des champs : PHANTOM[MD] 240 SL ou Pursuit[MD]
- Soya (tolérant au glyphosate) : glyphosate, PHANTOM[MD] 240 SL ou Pursuit[MD]

[1] Y compris les variétés à faible teneur en acide linolénique
[2] À l'exception des variétés à faible teneur en acide linolénique

HERBICIDE

ARROW ALL IN[MC]

DIRECTIVES DE MÉLANGE :

1. Nettoyer soigneusement le pulvérisateur en rinçant le système avec de l'eau contenant un détergent.
2. Remplir la cuve du pulvérisateur préalablement nettoyée à moitié d'eau propre. Mettre le système d'agitation en marche.
3. Ajouter la quantité requise de produit d'association en cuve. Continuer l'agitation.
4. Ajouter la quantité requise d'ARROW ALL IN[MC]. Continuer l'agitation.
5. Continuer d'ajouter la quantité d'eau nécessaire pour remplir la cuve du pulvérisateur. Continuer l'agitation.
6. Après toute interruption de la pulvérisation, bien agiter le mélange avant de pulvériser de nouveau. Vérifier l'intérieur de la cuve afin de s'assurer que l'agitation du pulvérisateur est suffisante pour bien mélanger les liquides de pulvérisation. Ne pas laisser le mélange de pulvérisation reposer dans la cuve pendant la nuit. En cas de mélanges en cuve contenant des herbicides à feuilles larges, il y aura sédimentation si l'agitation n'est pas continue.
7. Si une pellicule huileuse commence à se former dans la cuve, la vidanger et la nettoyer à l'aide d'un détergent puissant.
8. Immédiatement après l'usage, nettoyer soigneusement le pulvérisateur en rinçant le système avec de l'eau propre contenant un détergent.

ROTATION DES CULTURES :

Dans le cas de toutes les cultures non indiquées sur l'étiquette, il faut respecter un délai d'attente de 30 jours avant le semis.

DÉLAIS D'ATTENTE AVANT LA RÉCOLTE :

- Luzerne (plantule), canneberges, fenugrec : 30 jours
- Canola, pois chiches (de types desi et kabuli), coriandre, haricots secs (Pinto, noir, Great Northern, rouge, rose, rond blanc), lin (y compris les variétés à faible teneur en acide linolénique), lentilles, moutarde (de type condiment seulement : orientale, brune, jaune), Pommes de terre : 60 jours
- Oignons secs : 45 jours
- Pois des champs, soya : 75 jours
- Bleuets en corymbe, épinards : 14 jours
- Tournesols : 72 jours

RESTRICTIONS DE PÂTURAGE :

Ne pas faire paître le bétail dans les cultures traitées ni couper celles-ci comme fourrage pendant les 60 jours suivant le traitement.

ENTREPOSAGE :

Ne pas laisser geler.

Conseils pratiques

Comme ARROW ALL IN[MC] contient un adjuvant intégré, aucun autre n'est nécessaire! Appliquer ARROW ALL IN[MC] lorsque les graminées annuelles et les céréales spontanées sont au stade de 2 à 6 feuilles. On obtient la meilleure suppression lorsque l'application se fait avant le tallage, au moment où les graminées annuelles sont petites et en croissance active. ARROW ALL IN[MC] sera moins efficace lorsque les plantes sont stressées par un manque d'humidité, une humidité excessive, une température basse ou une humidité relative très basse. Il peut y avoir repousse par tallage si l'application est faite dans l'une de ces conditions de stress.

ADAMA

Il est important de toujours lire et suivre le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette.
Numéro sans frais : 1.855.264.6262
ADAMA.COM/CANADA/FR

[MD/MC] ARROW, BADGE, DAVAI et PHANTOM sont des marques déposées, et ARROW ALL IN[MC] est une marques de commerce d'ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd. Tous les autres produits sont des marques de commerce de leur société respective.
© 2021 ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd.