



ADAMA

# FOLPAN<sup>MD</sup> 80 WDG

Un fongicide granulaire dispersible dans l'eau qui offre une protection exceptionnelle contre les maladies les plus courantes et les plus dommageables pour l'économie dans les vignes et autres cultures fruitières, maraîchères et ornementales.



GROUPE M4

## Matière active :

80 % Folpet = SC

## Doses d'application et superficie pouvant être traitée :

Doses : 0,5 à 2 kg/acre

Acres traités : 2,5 à 10 acres/sac

## Format :

Caisse : 2 sacs de 5 kg

## Volume d'eau :

 Voie terrestre : 400 à 1200 L/acre  
(100 à 317 gal US/ac)

Voie aérienne : Ne pas appliquer.

## Résistance à l'entraînement par la pluie :

Sans objet.

CLIQUEZ ICI À ACCÉDER TOUS LES DÉTAILS DE PRODUIT.



## CULTURES HOMOLOGUÉES :

- Azalées
- Chrysanthèmes
- Citrouilles
- Concombres de grande culture
- Canneberges
- Courges
- Fraises
- Iris
- Melons
- Muffiers
- OEillets des fleuristes
- Poinsettias (de serre)
- Pommes
- Pommettes
- Raisins
- Tagètes
- Tomates de plein champ
- Zinnias

## PRINCIPALES MALADIES SUPPRIMÉES :

- Alternariose
- Anthracnose
- Excoriose
- Mildiou
- Moucheture
- Moucheture de la pomme
- Oïdium blanc
- Pourriture de la tige
- Pourriture du fruit
- Pourriture noire, brune et grise
- Pourridié pythien
- Tache des feuilles
- Tache des feuilles (Didymellina)
- Tache de suie
- Tache phoméenne
- Tache septorienne
- Tavelure

## COMMENT LE PRODUIT AGIT-IL ?

FOLPAN<sup>MD</sup> 80 WDG agit par contact multisite et est doté d'une capacité protectrice. Utiliser ce produit régulièrement dans le cadre d'un programme de protection établi.

## MÉLANGES EN RÉSERVOIR HOMOLOGUÉS ET VALIDÉS :

 Kumulus<sup>MD</sup> DF

Ce produit peut être mélangé avec un engrais, un supplément ou avec des produits antiparasitaires homologués, dont les étiquettes permettent aussi les mélanges en cuve, à la condition que la totalité de chaque étiquette, notamment le mode d'emploi, les mises en garde, les restrictions, les précautions relatives à l'environnement et les zones tampons sans pulvérisation, soit suivie pour chaque produit. Lorsque les renseignements inscrits sur les étiquettes des produits de mélange en cuve diffèrent, il faut suivre le mode d'emploi le plus restrictif. Ne pas faire de mélanges en cuve avec des produits contenant le même principe actif, à moins que ce ne soit spécifiquement indiqué sur cette étiquette.

Dans certains cas, les produits de lutte antiparasitaire mélangés en cuve peuvent réduire l'efficacité du pesticide ou augmenter les dommages à la culture hôte. L'utilisateur devrait communiquer avec ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd. au 1 855-264-6262 pour obtenir des renseignements avant d'appliquer tout mélange en cuve qui n'est pas recommandé spécifiquement sur cette étiquette.



# FOLPAN<sup>MD</sup> 80 WDG

## MOMENT D'APPLICATION ET STADE DES CULTURES :

Culture	Maladies	Moment d'application
Canneberges	Pourriture du fruit	Appliquer lorsque 5 % des bourgeons floraux sont ouverts. Répéter 10 à 14 jours plus tard lorsque 50 à 75 % des bourgeons sont ouverts.
Concombres de grande culture, melons, citrouilles, courges	Anthraxose, Mildiou	Appliquer dès l'apparition des feuilles véritables. Répéter à intervalles de 7 jours jusqu'à la récolte.
Fraises	Pourriture grise, Pourriture du fruit, Tache des feuilles	Appliquer avant l'infection initiale et répéter à intervalles de 7 jours jusqu'à la récolte.
Pommes, pommettes	Alternariose, Pourriture noire, Tache phoméenne, Moucheture, Tavelure, Tache de suie	Appliquer dans le cadre d'un programme de protection régulier, à partir du stade du bouton vert jusqu'à la récolte.  Ne pas faire plus de 6 applications par saison. Consulter l'étiquette pour les précautions supplémentaires.
Raisins	Excoriose	Appliquer lorsque les nouvelles pousses mesurent de 1 à 2 po de longueur et répéter lorsqu'elles mesurent de 4 à 6 pouces de hauteur.
	Oïdium blanc	Appliquer dans un mélange en réservoir avec Kumulus <sup>MD</sup> DF dès l'apparition du mildiou et répéter 10 jours plus tard.
	Pourriture noire, Mildiou	Appliquer avant et juste après la floraison et lors du premier traitement postfloral. Pour supprimer le mildiou, un traitement supplémentaire 2 ou 3 semaines plus tard pourrait s'avérer nécessaire.
Tomates de plein champ	Anthraxose	Appliquer pendant la première floraison et répéter à intervalles de 7 jours jusqu'à la récolte.
Azalées, chrysanthèmes, iris, mufliers, œillets, poinsettias, tagètes, zinnias	Brûlure, pourridié pythien, pourriture de la tige, alternariose, tache septorienne, tache des feuilles (didymellina), anthracnose (selon l'espèce ornementale)	De façon générale, appliquer lors de la levée des plantes ornementales et répéter les traitements à intervalles réguliers. Consulter l'étiquette pour connaître le moment d'application spécifique selon la maladie et l'espèce ornementale.

## RÉINSERTION ET INTERVALLES AVANT RÉCOLTE :

- Plantes ornementales NON destinées à la production de fleurs coupées : 12 heures
- Pommes, Pommettes : 1 jour
- Concombres de grande culture, Melons, Citrouilles, Courges : 11 jours
- Plantes ornementales cultivées à l'extérieur pour la production de fleurs coupées : 16 jours
- Canneberges : 30 jours
- Plantes ornementales cultivées en serre pour la production de fleurs coupées : 48 jours

### Récolte mécanique,\* :

- Fraises, Raisins, Tomates de grande culture : 1 jour

### Récolte manuelle\* :

- Raisins : 3 jours
- Fraises : 11 jours
- Tomates de grande culture : 22 jours

\* Les intervalles avant récolte sont différentes pour la récolte manuelle et mécanique.

## DIRECTIVES DE MÉLANGE :

1. Remplir le réservoir du pulvérisateur presque
2. Démarrer l'agitation de la cuve du pulvérisateur.
3. Verser la quantité recommandée de Folpan<sup>MD</sup> 80 WDG à la surface de l'eau. Le fongicide peut être prémélangé dans un seau rempli à moitié d'eau. Le mélange peut être versé à travers un tamis dans un réservoir de pulvérisation presque plein.

4. Terminer le remplissage du réservoir.
5. Maintenir l'agitateur en marche pendant le remplissage et la pulvérisation.

REMARQUE: En cas de mélange en cuve, consulter l'étiquette de l'adjuvant pour connaître l'ordre de mélange précis ou suivre WAMLEGS ou WALES pour connaître le protocole de mélange approprié.



Il est important de toujours lire et suivre le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette.  
Numéro sans frais : 1.855.264.6262 | ADAMA.COM

FOLPAN® sont des marques déposées d'ADAMA Group Company. Tous les autres produits sont des marques de commerce de leurs sociétés respectives.  
© 2025 ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltée.