GROUPE 29

Matière Active :

Fluazinam 500 g/L = SC

Doses d'application et nombre d'acres pouvant être traités :

Dose : 162 à 906 mL/ac
Acres traités : 27 à 80 ac/bidon

Format :

Caisse : 2 bidons de 10 L

Volume d'eau :

Voie terrestre : Varie par culture.
Se référer à l'étiquette pour plus de détails.

Voie aérienne : Minimum de 18,2 L/acre

Résistance à l'entraînement par la pluie :

Éviter d'appliquer lorsque les fortes pluies sont prévues.

POUR OBTENIR TOUS LES DÉTAILS SUR LE PRODUIT, **BALAYEZ LE CODE QR.**

BÉNÉFICES PRINCIPAUX :

- Outil de gestion contre la résistance
- Homologué dans des cultures multiples
- Maîtrise à large spectre des maladies
- Des doses multiples pour un contrôle précis

CULTURES HOMOLOGUÉES :

- Baies de gaylussaquier
- Baies de sureau
- Bleuets (nains, en corymbe)
- Carottes
- Oignons bulbes
- Ginseng
- Graines sèches de haricot
- Groseilliers
- Légumineuses à gousse comestible (sauf les pois)
- Poivrons des champs
- Pommes
- Pommes de terre
- Raisins de Corinthe
- Tiges et feuilles pommées de Brassica (Sous-groupe de cultures 5A)
- Feuilles libres de Brassica (Sous-groupe de cultures 5B)
- Soya

Pour une liste complète de cultures homologuées, se référer à l'étiquette.

COMMENT LE PRODUIT AGIT-IL ?

VANTANA[MC] agit en inhibant la production d'ATP (triphosphate d'adénosine) fongique dans les mitochondries (nuisant la production de l'énergie). Active contre une vaste gamme de maladie, VANTANA[MC] est un fongicide protectif qui inhibe la germination de spores fongiques.

DIRECTIVES DE MÉLANGE :

1. Remplir le réservoir du pulvérisateur d'eau jusqu'à la moitié.
2. Démarrer l'agitation de la cuve du pulvérisateur.
3. Ajouter la quantité requise de VANTANA[MC]
4. Ajouter la quantité requise d'agent de surface non ionique (NIS) et continue l'agitation.
5. Terminer le remplissage de la cuve avec de l'eau.

REMARQUE : En cas de mélange en cuve, consulter l'étiquette de l'adjuvant pour connaître l'ordre de mélange précis ou suivre WAMLEGS ou WALES pour connaître le protocole de mélange approprié.

ROTATIONS DES CULTURES :

Les zones traitées avec VANTANA[MC] pourrait être ensemencées avec des pommes de terre et les haricots secs et écossés aussitôt que pratique après la dernière application. Des autres légumes-racines et légumes-feuilles peuvent être ensemencées 30 jours après la dernière application. Toutes les autres cultures peuvent être ensemencées 70 jours après la dernière application.

FONGICIDE

VANTANA[MC]

MALADIES PRINCIPALES ET DOSES D'APPLICATION PAR CULTURE :

N.B. : Pour les moment d'application par culture, se référer à l'étiquette.

Culture	Maladies	Doses
Pommes	Rouille de Virginie, Rouille de Virginie, Tavelure du pommier, Chiures de mouche et Tache de suie	304 à 405 mL/ac (0,75 à 1,0 L/ha)
	Pour la suppression des ACARIENS : Tétranyque à deux points, tétranyque rouge du pommier et ériophyide du pommier	
	Pourriture noire*, moucheture*, rouille du cognassier*	405 mL/ac (1,0 L/ha)
Bleuets nains	Tache valdensinéenne	462 à 324 ml/ac (0,4 à 0,8 L/ha)
Bleuets en corymbe, Bleuets nains	Pourriture sclérotique*, excoriose*, anthracnose du fruit*	907 mL/ac (2,24 L/ha)
Baies de gaylussaquier, Baies de sureau, Groseilliers, Raisins de Corinthe	Anthracnose du fruit*	
Carrotes	Moisissure blanche, Alternariose	469 mL/ac (1,16 L/ha)
Oignons bulbes	Tache pourpre, Brûlure des feuilles	469 mL/ac (1,16 L/ha) (584 g)
Graines sèches de haricot	Moisissure blanche	243 à 405 mL/ac (0,6 à 1,0 L/ha)
	Anthracnose	
Légumineuses à gousse comestible (sauf les pois)	Moisissure blanche	
Ginseng	Pourriture des racines Rhizoctonia	486 mL/ac (1,2 L/ha)
	Alternariose, brûlure de la feuille	
Poivrons des champs	Phytophthora et pourriture brune des cabosses	688 mL/ac (1,7 L/ha)
Pommes de terre	Mildiou	162 mL/ac (0,4 L/ha)
	Moisissure blanche	162 à 242 mL/ac (0,4 à 0,6 L/ha)
Soya	Moisissure blanche	356 à 473 mL/ac (0,88 à 1,17 L/ha)
	Moisissure blanche*	178 mL/ac (0,44 L/ha)
Feuilles libres de Brassica (Sous-groupe de cultures 5B) **Traitement avant transplant**	Hernie	1,17 L dans 202 L d'eau par acre (2,9 L dans 500 L d'eau par hectare)
Tiges et feuilles pommées de Brassica (Sous-groupe de cultures 5A) Feuilles libres de Brassica (Sous-groupe de cultures 5B) **Traitement transplant**		Mélanger 50 mL avec de l'eau pour créer une solution de 100 L.

* Répression

RESTRICTIONS DE PÂTURAGE :

Ne pas servir au bétail le feuillage traité.

- Tiges et feuilles pommées de Brassica (Sous-groupe de cultures 5A) : 65 jours

MÉLANGES EN RÉSERVOIR HOMOLOGUÉS ET VALIDÉS :

Aucun inscrit.

ENTREPOSAGE :

Garder à l'abri du gel.

INTERVALLE DE RÉINSERTION :

- Oignons bulbes : 3 jours
- Toutes les autres cultures : 24 heurs

INTERVALLES AVANT RÉCOLTE:

- Carottes, Oignons bulbes : 7 jours
- Légumineuses à gousse comestible (sauf les pois), Pommes de terre : 14 jours
- Pommes : 28 jours
- Soya : NE PAS appliquer après le stade de croissance R3 (formation des gousses).
- Baies de gaylussaquier, Baies de sureau, Bleuets (nains, en corymbe), Feuilles libres de Brassica (Sous-groupe de cultures 5B), Graines sèches de haricot, Ginseng, Groseilliers, Poivrons des champs, Raisins de Corinthe : 30 jours

CONSEIL PRATIQUES :

Pour une efficacité optimale, VANTANA[MC] requiert une bonne couverture plus facilement réalisable avec des volumes d'eau élevés. Les volumes d'eau actuels varient selon la culture. Se référer à l'étiquette pour plus de details.

2025-03

ADAMA

Il est important de toujours lire et suivre le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette.
Numéro sans frais : 1.855.264.6262 | ADAMA.COM

VANTANA™ est une marque de commerce d'ADAMA Group Company. Tous les autres produits sont des marques de commerce de leur fabriquants respectifs.
© 2025 ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltée.