



INSECTICIDE



ADAMA

CORMORAN^{MD}

Option unique dotée de multiples modes d'action permettant de maîtriser le carpocapse de la pomme, le doryphore de la pomme de terre ainsi qu'une large gamme d'autres insectes dans les cultures spécialisées.

**GROUPE 4 & 15****Matières Actives :**

Novaluron 100 g/L et
Acétamipride 80 g/L = EC

Doses d'application :

Dose : 180 à 840 ml/acre

Emballage et**superficie traitée :**

Caisse : 2 bidons de 10,08 L

Acres traités : 12 à 56 acres/bidon

Volume d'eau :

Voie terrestre : 80 à 400 L/ac
(20 à 150 gal US/ac)

Voie aérienne : Ne pas appliquer.

**Résistance à
l'entraînement
par la pluie :**

Éviter d'appliquer lorsque des
fortes pluies sont prévues.

CULTURES HOMOLOGUÉES :

- Brassica, choux (groupe de cultures 5-13)
- Fraises
- Fruits à noyau (groupe de cultures 12-09)
- Légumes-feuilles du genre Brassica (sous-groupe de cultures 4-13B)
- Luzerne (pour la production de semences)
- Maïs sucré
- Petits fruits (sous-groupe de cultures 13-07B)
- Piments et poivrons
- Pommes
- Pommes de terre

PRINCIPAUX INSECTES SUPPRIMÉS :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| • Altise de l'airelle | • Drosophile à aile tachetée | • Piéride du chou |
| • Anthonome de la fleur du fraisier | • Enrouleuse | • Puceron |
| • Arpenteuse de l'airelle | • Fausse arpenteuse du chou | • Punaise |
| • Autographe de la luzerne | • Fausse-teigne des crucifères | • Punaise de la molène |
| • Capside de la luzerne | • Hoplocampe des pommes | • Punaise terne |
| • Carpocapse de la pomme | • Légionnaire | • Pyrale des atocas |
| • Cécidomyie du chou-fleur | • Mineuse des feuilles | • Pyrale du maïs |
| • Cécidomyie du myrtilleur | • Mouche de l'airelle | • Scarabée japonais |
| • Charançon de la prune | • Mouche de la pomme | • Sésie du cornouiller |
| • Chrysomèle du fraisier | • Noctuelle des cerises | • Spongieuse |
| • Cicadelle | • Noctuelle des fruits verts | • Thrips |
| • Doryphore de la pomme de terre | • Petit carpocapse de la pomme | • Tordeuse orientale du pêcher |
| | | • Trypète des cerises |

COMMENT LE PRODUIT AGIT-IL ?

CORMORAN^{MD} tue les œufs d'insectes par contact et les larves par ingestion. Grâce à ses deux modes d'action, CORMORAN^{MD} permet à la fois une suppression rapide et résiduelle des insectes nuisibles.

MÉLANGES EN RÉSERVOIR HOMOLOGUÉS ET VALIDÉS :

- Acramite^{MD} 50 WS
- Luna Sensation^{MC}
- Polyram^{MD} DF WSP
- Pristine^{MD} WG

Ce produit peut être mélangé avec un engrais, un supplément ou avec des produits antiparasitaires homologués, dont les étiquettes permettent aussi les mélanges en cuve, à la condition que la totalité de chaque étiquette, notamment le mode d'emploi, les mises en garde, les restrictions, les précautions relatives à l'environnement et les zones tampons sans pulvérisation, soit suivie pour chaque produit. Lorsque les renseignements inscrits sur les étiquettes des produits de mélange en cuve diffèrent, il faut suivre le mode d'emploi le plus restrictif. Ne pas faire de mélanges en cuve avec des produits contenant le même principe actif, à moins que ce ne soit spécifiquement indiqué sur cette étiquette.

Dans certains cas, les produits de lutte antiparasitaire mélangés en cuve peuvent réduire l'efficacité du pesticide ou augmenter les dommages à la culture hôte. L'utilisateur devrait communiquer avec ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd. au 1 855-264-6262 pour obtenir des renseignements avant d'appliquer tout mélange en cuve qui n'est pas recommandé spécifiquement sur cette étiquette.

**CLIQUEZ ICI À
ACCÈDER TOUS
LES DÉTAILS
DE PRODUIT.**





CORMORAN^{MD}

MOMENT D'APPLICATION ET STADE DES CULTURES :

La nécessité et le calendrier d'une application doivent être basés sur la présence de parasites à des stades de développement vulnérables et de populations importantes, tel que déterminé par le réseau de surveillance local. Consulter l'étiquette pour connaître les cultures et les insectes spécifiques.

DIRECTIVES DE MÉLANGE :

1. Remplir la cuve du pulvérisateur aux ½ plein de l'eau
2. Démarrer l'agitation de la cuve du pulvérisateur.
3. Ajouter la quantité requise de CORMORAN^{MD}.
4. Ajouter la quantité requise d'agent de surface non ionique (NIS) et continue l'agitation.
5. Terminer le remplissage de la cuve avec de l'eau.

REMARQUE : En cas de mélange en cuve, consulter l'étiquette de l'adjuvant pour connaître l'ordre de mélange précis ou suivre WAMLEGS ou WALES pour connaître le protocole de mélange approprié.

INTERVALLE DE RÉINSERTION :

Cultures	Activités de réinsertion	Intervalle d'entrée restreint
Luzerne (pour la production de semences)	Toutes les activités	12 heures
Pommes	Amincissement des fruits	7 jours
	Toutes les autres activités	12 heures
Petits fruits (sous-groupe de cultures 13-07B)	Toutes les activités	12 heures
Fruits à noyau	Amincissement des fruits	6 jours
	Toutes les autres activités	12 heures
Fraises	Toutes les activités	12 heures
Brassica, Choux (groupe de cultures 5-13)	Désherbage manuel, repérage, ligature et formation	2 jours
	Toutes les autres activités	12 heures
Légumes-feuilles du genre Brassica (sous-groupe de cultures 4-13B)	Toutes les activités	12 heures
Piments et poivrons		
Pommes de terre		
Maïs sucré		

INTERVALLES AVANT RÉCOLTE :

- Fraises : 1 jour
- Fruits à noyau, Légumes-feuilles du genre Brassica (groupe de cultures 5-13 et sous-groupe de cultures 4-13B), Poivrons, Pommes de terre : 7 jours
- Petits fruits (sous- groupe de cultures 13-07B): 8 jours
- Maïs sucré : 10 jours
- Luzerne (pour la production de semences), Pommes : 14 jours

ROTATION DES CULTURES :

Aucune restriction.

ENTREPOSAGE :

- Conserver dans le récipient d'origine, fermé hermétiquement.
- Ne pas expédier ni entreposer à proximité de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux, de semences et d'engrais.
- Entreposer dans un endroit frais, sec, fermé à clé, bien ventilé et sans écoulement au sol.
- Tenir à l'écart du feu, des flammes nues ou d'autres sources de chaleur.

CONSEILS PRATIQUES :

Envisager des applications précoces (avant la chute des pétales) de CORMORAN^{MD} pour permettre aux insectes bénéfiques de s'accumuler plus tard dans la saison. Pour minimiser la possibilité d'effets transitoires sur le développement du couvain d'abeilles, ne pas utiliser CORMORAN^{MD} sur les cultures en fleurs lorsque les abeilles butinent activement.



Il est important de toujours lire et suivre le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette.
Numéro sans frais : 1.855.264.6262 | ADAMA.COM

CORMORAN[®] est une marque déposée d'ADAMA Group Company. Tous les autres produits sont des marques de commerce de leur fabricants respectifs. © 2026 ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltée.