


NOUVEAU

SORADUO^{MC} ALL IN

Bénéficiez de deux modes d'action éprouvés contre la Fusariose et les maladies foliaires à large spectre des grains. Maintenant dans une formulation pratique et un emballage en vrac.

GROUPE 3

Matières Actives :

Prothioconazole 125 g/L
Tébuconazole 125 g/L
EC (Concentrés émulsifiables)

Doses d'application :

Dose : 324 ml/ac

Emballage et superficie traitée :

Baril : 104,0 L

Acres traités : 320 ac/baril

Volume d'eau :

Voie terrestre : 40 L/ac
Voie aérienne : 20 L/ac

Résistance à l'entraînement par la pluie :

Éviter d'appliquer lorsque les fortes pluies sont prévues.

CULTURES HOMOLOGUÉES :

- Blé (de printemps, d'hiver)
- Orge
- Triticale (de printemps, d'hiver)

PRINCIPALES MALADIES SUPPRIMÉES :

- Fusariose de l'épi (répression)
- Rouille (des feuilles, tiges et striée)
- Tache septorienne et glumes
- Tache helminthosporienne
- Oïdium blanc
- Rayure réticulée
- Rhynchosporiose

COMMENT LE PRODUIT AGIT-IL ?

SORADUO^{MC} ALL IN est une combinaison de fongicides triazolés qui offre une action systémique à large spectre et une protection foliaire longue durée.

STADE DES CULTURES :

Culture	Maladie	Dose	Moment d'application
Blé (de printemps, d'hiver)	Réprime : Fusariose de l'épi Supprime : Rouille (des feuilles, tiges et striée), tache septorienne et glumes, Tache helminthosporienne, blanc	324 ml/ac	75 % des épis sur la tige principale sont entièrement jusqu'au moment précis où 50 % des épis sur la tige principale sont en fleurs.
Orge	Réprime : Fusariose de l'épi Supprime : Rayure réticulée, Tache helminthosporienne, rhynchosporiose, tache septorienne, rouille des feuilles, rouille des tiges et rouille striée, blanc	324 ml/ac	70 à 100 % des épis sur la tige principale sont entièrement émergés, jusqu'à 3 jours après l'émergence complète des épis.
Triticale (de printemps et d'hiver)	Réprime : Fusariose de l'épi Supprime : Rouilles, tache septorienne et glumes, tache helminthosporienne, blanc, tache helminthosporienne	324 ml/ac	75 % des épis sur la tige principale sont entièrement émergés, jusqu'au moment précis où 50 % des épis sur la tige principale sont en fleurs.



SORADUO^{MC} ALL IN

MÉLANGES EN RÉSERVOIR HOMOLOGUÉS ET VALIDÉS :

Aucune

DIRECTIVES DE MÉLANGES :

1. Lorsque SORADUO^{MC} ALL IN est appliqué seul, verser la moitié de la quantité d'eau requise dans le réservoir du pulvérisateur ou de mélange et mettre le système d'agitation en marche.
2. Verser la quantité requise de SORADUO^{MC} ALL IN dans l'eau puis ajouter le reste du volume d'eau total nécessaire.
3. Maintenir l'agitation pendant le mélange et la pulvérisation.

RESTRICTIONS RELATIVES À LA ROTATION DES CULTURES :

Blé, orge, triticales, soja : Aucune

Intervalle de rotation de 120 jours pour toutes les autres cultures.

INTERVALLE DE RÉINSERTION :

24 heures

INTERVALLES AVANT LA RÉCOLTE :

36 jours

RESTRICTIONS DE PÂTURAGE :

6 jours

ENTREPOSAGE :

Garder à l'abri du gel.

Veuillez noter que l'ARLA a procédé à une réévaluation du tébuconazole; la dose saisonnière totale est limitée à un maximum de 136 g m.a./ha/an, sauf pour les cultures dont la dose annuelle totale est actuellement inférieure à 136 g m.a./ha.



**CLICKEZ ICI À ACCÈDER TOUS
LES DÉTAILS DE PRODUIT.**



Il est important de toujours lire et suivre le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette.
Numéro sans frais : 1.855.264.6262 | ADAMA.COM

SORADUO^{MC} ALL IN est une marque de commerce d'ADAMA Group Company. Tous les autres produits sont des marques de commerce de leur fabricants respectifs. © 2026 ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltée.

CONSEILS PRATIQUES :

Appliquer SORADUO^{MC} ALL IN tôt comme mesure préventive contre la fusariose de l'épi, ce qui présente également l'avantage de lutter contre de nombreuses maladies foliaires importantes des céréales sur la dernière feuille et l'avant-dernière feuille.