



NOUVEAU

CAZADO^{MC}

La SEULE solution qui offre un véritable double mode d'action contre la folle avoine, donnant aux producteurs de blé leur toute première occasion de protéger de manière proactive leurs cultures contre la résistance des mauvaises herbes graminées.



GROUPE 1 & 2

Matières Actives :

Pinoxadène 100 g/L + Thienicarbazone-méthyle 8,33 g/L = OD

Doses d'application :

Dose : 243 ml/ac

Emballage et
superficie traitée :

Caisse : 2 bidons de 9,72 L

Baril : 77,8 L

Acres traités : 40 ac/bidon;
320 ac/baril

Volume d'eau :

Voie terrestre : 20 – 40 L/ac
(5 – 10 US gal/ac)

Voie aérienne : 12 L/ac (3 US gal/ac)

Résistance à
l'entraînement
par la pluie :

1 heure

AVANTAGES CLÉS :

- Seule option à double mode d'action
- Doses complètes de pinoxadène (Groupe 1) et de thienicarbazone-méthyle (Groupe 2) dans une seule formulation.
- Le meilleur herbicide de culture pour la gestion de la folle avoine dans le blé.
- Approche proactive pour retarder l'apparition future d'une résistance de la folle avoine.
- Flexibilité du mélange en cuve.

CULTURES HOMOLOGUÉES :

Culture	Stade
Blé de printemps	1 à 6 feuilles sur la tige principale, plus 3 talles mais avant la montaison (présence du premier nœud)
Blé d'hiver	Appliquer en'automne ou au printemps quand la majorité des plantes ont une feuille à tallage complète, mais avant la montaison (présence du premier nœud)

MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES :

Mauvaises herbes graminées à 1-6 feuilles :

- Échinochloa pied-de-coq
- Setaire verte
- Chénopode blanc^R
- Millet commun
- Avoine spontanée
- Folle avoine¹
- Setaire glauque

Mauvaises herbes à feuilles larges à 1-6 feuilles :

- Gaillet gratteron
- Ortie royale
- Ivraie de Perse^R
- Persicaire pale
- Amarante à racine rouge
- Mauve à feuilles rondes^R
- Bourse-à-pasteur
- Tabouret des champs
- Canola spontané²
- Renouée liseron
- Moutarde des champs

^R Répression seulement.

¹ Y compris les biotypes de folle avoine résistants aux herbicides du Groupe 1 ou du Groupe 2. Pour un meilleur contrôle de populations résistantes, il est recommandé d'appliquer le produit lorsque les mauvaises herbes sont de 1 à 6 feuilles, et avant la 3^e talle.

² Ne tolérant pas les inhibiteurs de l'enzyme ALS.

CAZADO^{MC} ne supprimera pas les mauvaises herbes résistantes aux herbicides du Groupe 1 et du Groupe 2.

CAZADO^{MC} ne permet pas de lutter contre les mauvaises herbes à feuilles larges du Groupe 2 (résistantes à l'ALS).

CAZADO^{MC}

COMMENT LE PRODUIT AGIT-IL ?

CAZADO^{MC} est absorbé par les feuilles et rapidement transporté vers les points de croissance des feuilles et des tiges. Les graminées vulnérables en croissance active cessent de se développer dans les 48 heures suivant le traitement.

DIRECTIVES DE MÉLANGE :

1. Remplir le réservoir du pulvérisateur au quart ou à la moitié du volume d'eau, et débiter l'agitation ou mettre en marche le système de dérivation.
2. Ajoutez des conditionneurs d'eau (AMS à raison de 0,405 L/AC de solution à 49 % si utilisé **uniquement sur du blé de printemps**)
3. Ajoutez des partenaires de mélange en cuve, si vous le souhaitez (formulations WDG, WG, SL ou SC).
4. Ajoutez la dose appropriée de CAZADO^{MC}, directement dans le réservoir du pulvérisateur. Maintenir une agitation suffisante durant le mélange et la pulvérisation.
5. Ajoutez des partenaires de mélange en cuve si la formulation est EC.
6. Ajoutez l'adjuvant recommandé du partenaire du mélange en cuve. Si aucun n'est requis, vous pouvez utiliser les recommandations d'adjuvants de CAZADO^{MC}.
7. Remplissez le réservoir du reste d'eau nécessaire.
8. Maintenez une agitation suffisante durant le mélange et la pulvérisation de CAZADO^{MC}.

RECOMMANDATION CONCERNANT LES ADJUVANTS :

Dans des conditions difficiles (présence importante de mauvaises herbes, conditions environnementales stressantes, etc.), un adjuvant peut être ajouté pour améliorer le contrôle des mauvaises herbes graminées :

- MSO ou COC (ex Cohere ou Addit à 0,5 % v/v blé de printemps uniquement)

N'utilisez pas d'adjuvant supplémentaire si le partenaire de mélange en cuve n'est pas compatible. Cliquez sur l'image du produit pour obtenir de plus amples renseignements ou communiquez avec votre responsable commercial de la région.

INTERVALLES AVANT RÉCOLTE :

Blé de printemps pour le grain ou la paille : 60 jours
Blé d'hiver pour le grain ou la paille : 72 jours

ROTATION DES CULTURES :

Luzerne, Orge de printemps, Canola, Maïs de grande culture, Haricots secs, Lin (y compris les variétés à faible teneur en acide linoléique), Moutarde, Avoine de printemps, Pois de grande culture, Soja, Tournesol, Mil, Blé : 10 mois

RESTRICTIONS DE PÂTURAGE :

NE PAS laisser paître le bétail dans les cultures traitées ni récolter celles-ci comme fourrage dans les 7 jours ni comme foin dans les 30 jours suivant l'application.

ENTREPOSAGE :

Ne pas congeler. Bien agiter les bidons avant utilisation. Mélanger les fûts à l'aide de l'adaptateur pour perceuse fourni.

MEILLEURES PRATIQUES :

- Pour obtenir les meilleurs résultats, appliquez lorsque le ravageur ciblé est au stade 2-3 feuilles et dans des conditions de croissance idéales.
- Il est préférable d'appliquer le produit sur des champs qui n'ont jamais présenté de résistance au pinxadène et au thiencarbazone.
- Pour une efficacité optimale, pulvériser à raison de 10 gallons américains par AC.
- Pour un contrôle plus efficace, en particulier dans les situations où l'eau est très dure, il est possible d'ajouter du sulfate d'ammonium à raison de 202 g/AC (99 %) ou 0,405 L/AC (solution à 49 %). Si vous utilisez un produit à base de sulfate d'ammonium dont la concentration est différente, ajustez le dosage en conséquence. N'utilisez le sulfate d'ammonium comme conditionneur d'eau que dans les applications sur le blé de printemps

**CLIQUEZ ICI À ACCÈDER TOUS
LES DÉTAILS DE PRODUIT.**



CONSEILS PRATIQUES :

Ne pas pulvériser CAZADO^{MC} dans les trois jours précédant ou suivant une température inférieure ou égale à 3 °C. Ne pas pulvériser si le délai entre le semis et la pulvérisation dépasse 35 jours (car la sécheresse accélère le développement des cultures) – utilisable à chaque application.



Il est important de toujours lire et suivre le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette. Numéro sans frais : 1.855.264.6262 | ADAMA.COM

CAZADO^{MC} sont des marques déposées d'ADAMA Group Company Ltée. Tous les autres produits sont des marques de commerce de leurs sociétés respectives. © 2026 ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltée.