


Ficha técnica :

# Carbin®

Registro N°:29-I 6 / NA

TITULAR: ADAMA ANDINA B.V.



<b>Tipo de Producto:</b>	Insecticida
<b>Formulación:</b>	Suspensión Concentrada (SC)
<b>Concentración:</b>	350 gramos por litro de producto comercial.
<b>Ingrediente Activo:</b>	Thiodicarb
<b>Categoría Toxicológica:</b>	II Moderadamente peligroso.
<b>Grupo Químico:</b>	Carbamato, IRAC 1A
<b>Presentación:</b>	100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 litro.

Modo de acción: **CARBIN** es un insecticida con acción estomacal predominante. También posee una acción de contacto limitada. Para el tratamiento de semillas, presenta una translocación sistémica rápida a través de la planta.

Mecanismo de acción: **CARBIN** es un insecticida del grupo de los carbamatos, inhibidor de la colinesterasa.

## Generalidades:

**CARBIN** es un insecticida del grupo de los carbamatos, inhibidor de la colinesterasa, con acción estomacal predominante. También posee una acción de contacto limitada. Para el tratamiento de semillas, presenta una translocación sistémica rápida a través de la planta.

## Sistema de preparación y aplicación:

**CARBIN** debe ser aplicado directamente a la semilla antes de la siembra; es decir se recomienda una sola aplicación. Sobre una bolsa de plástico resistente colocar la semilla y adicionar la mezcla de agua con la dosis de **CARBIN** recomendada, cierre la bolsa y agite con movimientos para poder impregnar uniformemente el producto, asegurándose que toda la semilla quede tratada, deje secar la semilla a la sombra durante 30 minutos. No guarde la semilla tratada, sembrar el mismo día de su aplicación.

## Recomendaciones de uso:

ADAMA

ADAMA Andina B.V. Sucursal Ecuador, Puerto Santa Ana, Manzana 1, Solar 8-1, Edificio "The Point", piso 5to, oficina 506  
Guayaquil – Ecuador PBX: + (593) 2597919 – 3883800 | www.adama.com  
Oficina Quito: Calle del Establo y Calle del Charro, Santa Lucía Alta. Edificio Site Center, Torre 3, oficina 008 - Cumbayá

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
<b>MAIZ</b> ( <i>Zea mays</i> )	<b>Tratamiento de semillas contra</b> Gusano trozador ( <i>Agrotis ipsilon</i> )	20 ml/kg semilla

**Gasto de agua:** 250 ml/kg de semilla

#### Época y Frecuencia de Aplicación:

Carbin debe ser aplicado directamente a la semilla antes de la siembra; es decir se recomienda una sola aplicación.

#### Periodo de reingreso:

24 horas.

#### Periodo de carencia:

No aplica.

#### Fitotoxicidad:

Usado a las dosis y con los métodos de aplicación recomendados no presenta fitotoxicidad en los cultivos.

#### Compatibilidad:

No se recomienda mezclar con otros productos, debido a su método de aplicación.

“El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

**Elaborado por:**  
**Departamento Técnico ADAMA**  
**Fecha de actualización:**  
**07-02- 2019 (PARB)**

**ADAMA**

ADAMA Andina B.V. Sucursal Ecuador, Puerto Santa Ana, Manzana 1, Solar 8-1, Edificio “The Point”, piso 5to, oficina 506  
 Guayaquil – Ecuador **PBX:** + (593) 2597919 – 3883800 | [www.adama.com](http://www.adama.com)  
**Oficina Quito:** Calle del Establo y Calle del Charro, Santa Lucía Alta. Edificio Site Center, Torre 3, oficina 008 - Cumbayá