



Mirage

REGISTRO N°: 70 - F 14 / NA

TITULAR: ADAMA ANDINA B.V

Tipo de producto:	Fungicida Agrícola
Formulación:	Concentrado Emulsionable (EC)
Ingrediente activo:	Prochloraz
Concentración:	450 gramos por litro
Categoría Toxicológica:	4 Ligeramente Peligroso
Cultivo:	Rosa y Aguacate
Target:	<i>Botrytis y Colletotrichum</i>
Presentación:	1 l y 100 ml
Grupo químico:	Imidazoles FRAC (G1)

Modo de acción: Fungicida sistémico con acción protectante, recomendado para el control preventivo y curativo de una amplia gama de enfermedades en diferentes cultivos. Movilidad translaminar

Mecanismo de acción: Es un inhibidor de la dimetilación del esteroles (14-dimetilación en la ruta de la biosíntesis del ergosterol de las células fúngicas; presumiblemente por ligazón a una función oxigenasa mixta constitutiva, involucrada en el metabolismo del esteroles fúngico.

Riesgo de resistencia:

Para un buen manejo de la enfermedad y reducir los riesgos de resistencia, se recomienda alternar **Mirage** con plaguicidas de distinto mecanismo de acción; debido a que el uso frecuente y/o una dosificación inadecuada de un mismo plaguicida puede generar biotipos de organismos resistentes al mismo.

Generalidades:

Sistema de preparación y aplicación:

Mirage es un derivado de los imidazoles, utilizado en el control de diversas enfermedades en ornamentales, frutales y hortalizas causados por hongos Deuteromicetes. Su modo de acción es preventivo y curativo. Es ideal para programas de rotación en el manejo integrado de enfermedades.

ADAMA



Para la preparación de la mezcla, disuelva completamente la cantidad recomendada de Mirage en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta $\frac{1}{4}$, agitar y completar el volumen de agua recomendado, continuar agitando hasta que la mezcla sea homogénea.

Recomendaciones de Uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Rosas (<i>Rosa</i> sp.)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.8 ml/l*
Aguacate (<i>Persea americana</i>)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	0.5 l/ha

*Volumen de agua: 1100 l/ha

Época y frecuencia de aplicación:

Rosas En post cosecha se puede utilizar tanto en inmersión como micro aspersión; en el momento que la flor llega del campo. Aguacate realizar 2 aplicaciones entre 7 y 10 días

Período de Reingreso:

4 horas

Período de Carencia:

Rosa NA, 7 días aguacate

Fitotoxicidad:

Usado a las dosis y con los métodos de aplicación recomendados no presenta fitotoxicidad en los cultivos.

Compatibilidad:

No es compatible con productos ácidos o alcalinos fuertes. En caso de requerirse mezcla con otros productos, bajo responsabilidad del usuario, se recomienda hacer pruebas a pequeña escala, para garantizar su compatibilidad.

Elaborado por:

Departamento Técnico ADAMA

Fecha de actualización:

12-11- 2025 (PARB)

ADAMA