



TOMAHAWK® 200 EC



ADAMA

©ADAMA Agan Ltd.



HERBICĪDS/HERBICIDAS/HERBITSIID

emulsijas koncentrāts/ koncentrūota
emulsija/ emulsioonikonsentraat
(EC)



Darbīgā viela/Veikļioji medžiaga/Toimeaine

• fluroksipirs/fluroksipiras/fluroksūpūr 200 g/L (20.4 % w/w)



Informācija / Informacija / Informatsoon



LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0536

Reģistrācijas klase: 2.

Partijas Nr. un izgatavošanas datums:

skatīt uz iepakojuma

Derīguma termiņš: 2 gadi no
izgatavošanas datuma, glabājot
neatvērtā oriģinālā iepakojumā

Pārstāvniecība Latvijā:

Tālr.: +371 2 729 33 30



EESTI

Eesti reg. nr.: 0623/21.06.16

Partij nr. ja valmistamise kuupäev:

vaata pakendilt

Säilivusaeg: 2 aastat



LIETUVA

Registracijos numeris: AS2-34H (2016)

Partijos numeris ir pagaminimo data:

žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai

Atstovas Lietuvoje:

Tel.: Tālr.: +370 85 210 86 22

Reģistrācijas apliecības īpašnieks,

tā adrese/Registrācijas savininkas/

Registreerimise haldaja:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Niederlande/Nyderlandai/

Madalmaad

Tālr./Tel./Tel.: +31 (0)33 205 68 00

www.adama.com

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/Tootja/

pakendaja:

ADAMA Agan Ltd.

P. O. Box 262

77102 Ashdod

Izraēla/Izraelis/

Iisrael



BRIESMAS
PAVOJINGA
ETTEVAATUST

UN3082

NO VARNISH
AREA

L111179IPFR_08

5 L e



Skānet informācijai /
Nuskaityti QR kodą /
QR-koodi lugemine



SKALAIK TEISINGAI



TOMAHAWK® 200 EC



LATVIJA

Tomahawk® 200 EC - Sistēmas iedarbības herbicīds īsmaiņa un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos (arī ar stiebrzāļu pašējū), daudzgadīgo stiebrzāļu sējumos (sekāli un lopbarības), ganībās, zālēnā, zālēnā gofā laukumā, kā arī stiebrzāļu sējumos sekāli sējās gada.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. ● **H318** Izraisa nopietnus acu bojājumus.

● **H336** Var izraisīt miegainību vai reiboni.

H410 Loti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošu sekām. ● **EUH066** Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

● **EUH 401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

● **P280** Izmantot acu aizsargus/ sejas aizsargus. ● **P261** Ievairīties ieelpot smidzinājumu.

● **P301+P310+P313** NORĪŠANAS GADĪJUMA: NEKAVĒJOTIS sazinieties ar SAINDĒŠANAS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. ● **P304+P340** IEELPOŠANAS GADĪJUMA: izvest cietušo

svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. ● **P312** Sazinieties ar SAINDĒŠANAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikti pašsajūta.

● **P305+P351+P338** SASKARĒ AR ACIEM: uzreiz izskalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalojiet. ● **P501** Atbīdīties no satura/vertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. ● **SP1** Nepiesāņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu/ netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstēzju tuvumā/ izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

● **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. ● **SPe3** Lai aizsargātu ar lietojumu nesāpīgus zīdīgus augus, stiebrzāļu sējumos, ganībās, zālēnā un zālēnā gofā laukumā ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei un 3 m aizsargjoslu graudaugu un stiebrzāļu sējumos sējās gadā līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana – Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzamās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem.

Nepieļaut sasaļšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemāk par 0 °C un ne augstāk par +35 °C.

LIETUVA

Tomahawk® 200 EC - sisteminio veikimo herbicidas vienmetams (ypač kibiesiems lipkams), ir daugiamečms dvieklitms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose kvietrgiuose, žieminiuose rugiuose, avižose, vėrose, gofio aikštėnyuose, kultūrinėse pievose ir ganyklose, sėkliniuose varpinių žolių pasėliuose. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. ● Smarkiai pažeidžia akis. ● Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. ● Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgusiklus pokitimus. ● Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dirgimą arba skilnelėjimą. ● Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerazolio. ● Naudoti akių (veido) apsaugos priemonės. ● PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. ● NESKATINTI vėmimo. ● PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandenu. Išimti kontaktinius lėšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. ● Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. ● Surinkti išteklėjusį medžiagą. ● Taisyklą šalinti pagal nacionalines taisyklų reikalavimus. ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakute (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenąž iš sodybų ar nuo kelių). ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių, kai purškiamos vejos, gofio aikštynai, kultūrinės pievos ir ganyklos bei sėkliniai varpiniai žolių pasėliai. ● Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Apinuodijimo atveju kreiptis į Apinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Sandėliavimas - Laikykite preparatą vėsioje, sausose, gerai vėdinamose patalpose, ori-

ginalioje gamintojo taroje. Tomahawk® 200 EC turi būti saugomas ne žemesnėje nei -5 °C temperatūroje. Laikykite atskirai nuo maisto, vandens, gyvulių pašaro ir trąšų. Saugokite nuo vaikų.

Užglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzamās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem.

Nepieļaut sasaļšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemāk par 0 °C un ne augstāk par +35 °C.

EESTI

Tomahawk® 200 EC - on selektiivne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suvioras, tali- ja suvitritikaale, rukkis, kaeras, maisis, murus, golfiväljakutel, kultuurniitudel ja karjamaadel, heintaimedele seemnepõldudel.

Ainult professionaalseks kasutamiseks.

H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. ● **H318** Põhjustab raskeid silmakahjustusi. ● **H336** Võib põhjustada unisust või peapööritust. ● **H410** Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

● **EUH066** Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. ● **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. ● **P280** Kanda kaitseprille/kaitsemaski. ● **P261** Vältida pihustatud aine sissehingamist. ● **P301+P310** ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE / arstiga. ● **P331** MITTE kutsuda esile oksendamist. ● **P305+P351+P338** SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui need kasutatava ja kui need on kerge eemaldada. Loputada veel kord. ● **P310** Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE / arstiga. ● **P331** Mahavoolanud toode kokku koguda. ● **P501** Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. ● **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte pihustada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Hoiustamine - Hoida otsese päikesevalguse eest. Kaitsa külmumise eest. Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas originaalpakendis. Säilitustemperatuur: minimaalne temperatuur 0°C, maksimaalne temperatuur +35°C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzamās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem.

Nepieļaut sasaļšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemāk par 0 °C un ne augstāk par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzamās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem.

Nepieļaut sasaļšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemāk par 0 °C un ne augstāk par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzamās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem.

Nepieļaut sasaļšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemāk par 0 °C un ne augstāk par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzamās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem.

Nepieļaut sasaļšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemāk par 0 °C un ne augstāk par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzamās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem.

Nepieļaut sasaļšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemāk par 0 °C un ne augstāk par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzamās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem.

Nepieļaut sasaļšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemāk par 0 °C un ne augstāk par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzamās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem.

Nepieļaut sasaļšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemāk par 0 °C un ne augstāk par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzamās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem.

Nepieļaut sasaļšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemāk par 0 °C un ne augstāk par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzamās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem.

Nepieļaut sasaļšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemāk par 0 °C un ne augstāk par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzamās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem.

Nepieļaut sasaļšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemāk par 0 °C un ne augstāk par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzamās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem.

Nepieļaut sasaļšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemāk par 0 °C un ne augstāk par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzamās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem.



UFI: 9F3D-J3X2-F00K-9GVV



8 718077 010649



TOMAHAWK® 200 EC



LATVIJA

Tomahawk® 200 EC - Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos (arī ar stiebrzāļu pasēju), daudzgadīgo stiebrzāļu sējumos (sēklas un lopbarības), ganībās, zālēnā, zālēnā golfa laukumā, kā arī stiebrzāļu sējumos sēklas sējās gadā.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. **H318** Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboni. **H410** Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. **EUH066** Aikārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgšanu.

EUH 401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot acu aizsargus/ sejas aizsargus. **P261** Izvairīties ieelpot smidzinājumu.

P301+P310+P331 NORISĀNAS GADIJUMĀ: nekavējoties sazināties ar SAINĒSĀNAS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. **P304+P340** IEELPOŠANAS GADIJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt mierā stāvoklī, lai būtu ārī elpot. **P312** Sazināties ar SAINĒSĀNAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir šķīta pašsajūta.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalo ar ūdeni vairākas minūtes. Izpētiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skatot. **P501** Atbrīvoties no saturs/vertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. **SP1** Nepiesārnāt ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu/ netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstēzē tuvumā/ izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargzonu līdz ūdenstilpēm un ūdens-
tecēm. **SPe3** Lai aizsargātu ar lietojumu nesaisīstus izdīgus augus, stiebrzāļu sējumos, ganībās, zālēnā un zālēnā golfa laukumā ievērot 5 m aizsargzonu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei un 3 m aizsargzonu groudāgu un stiebrzāļu sējumos sējās gadā līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Avārijas gadījumā zīnot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

LIETUVA

Tomahawk® 200 EC – sistēmīno veikimo herbicīds vienmērētis (ypac ķibiesiems lipikams), ir daugiavietēms divskīlētms pīkzāles naikinti ziemiņnuose ir vasariņnuose kviečiuose, ziemiņnuose ir vasariņnuose miežuose, ziemiņnuose kvietruigiuse, ziemiņnuose rugiuose, avizose, vejose, golfo aikstynuose, kultūrinise pievose ir ganyklose, sekliniuose varpinju žoliu paseliuose. **Skirts profesionaliajam naudojimui.**

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. **•** Smarkiai pažeidžia akis. **•** Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. **•** Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. **•** Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

• Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerazolio. **•** Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. **•** PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. **•** NESKATINTI vėmimo. **•** PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsigariai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius įšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. **•** Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. **•** Surinkti ištekėjusį mižiagą.

• Talpyklą šalinti pagal nacionalines teisės aktų reikalavimus. **•** Siekiant išvengti žmonių sveikatos ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. **•** Neuzteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakute (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinio / vengti taršos per drenąž iš sodybų ar nuo kelio). **•** Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinio ir melioracijos griovių, kai purškiamo vejos, golfo aikštynai, kultūrinės pievos ir ganyklos bei sekliniai varpiniai žolii pasėliai. **•** Siekiant apsaugoti netiklinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Sandėliavimas - Laikykite preparatą vėsiuose, sausose, gerai vėdinamose patalpose, originalioje gamintojo taroje. Tomahawk® 200 EC turi būti saugomas ne žemesnėje nei -5 °C temperatūroje. Laikykite atskirai nuo maisto, vandens, gyvulių pašaro ir trąšų. Saugokite nuo vaikų.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

EESTI

Tomahawk® 200 EC - on selektiivne herbitsiid kahelehelheliste umbratunde tõrjeks tali- ja suviniis, tali- ja suviõdras, tali- ja suvitrikales, rikkis, kaeras, maisis, murus, golfivõjakatel, kultuuritõudel ja karjamaadel, heintaimedele seemnepõldudel. **Ainult professionaalseks kasutamiseks.**

H304 Allaneelamisel võib hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. **H318** Põhjatus raskeid silmakahjustusi. **H336** Võib põhjustada unisust või peapõõritust. **H410** Våga mürģine veorganismidele, pikaajaline toime. **EUH066** Kõrduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. **P280** Kanda kaitseprille/kaitsemaski. **P301** Våltida pihustatud aine sissehingamist. **P310+P310** ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGIUSTUSTABEKESKUSE / arstiga. **P331** MITTE kutsuda esile oksendamist. **P305+P351+P338** SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlõõtsed, kui need kasutatakse ja kui need on kerge eemaldada. Loputada veel kord. **P310** Våtta viivitamata ühendust MÜRGIUSTUSTABEKESKUSE / arstiga. **P391** Mahavõalunud toode kokku koguda. **P501** Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. **SP1** Våltida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmee pinnavee lõhed mitte puhastada/Våltida saastamist lähi lauda ja teede drenaažidele). **Hådaabi telefon 112. Mürģustustabekeskuse lõunõnumber 16662.**

Hoiustamine - Hoida otsese påikesevalguse eest. Kaitsta kõlmumise eest. Hoida kuivas, jahedas ja hõsti ventileeritud kohas originaalpakendis. Sõilitustemperatuur: minimaalne temperatuur 0 °C, maksimaalne temperatuur +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepelējaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

UFI: 9F3D-J3X2-F00K-9GVV



atidaryti čia
atverti čia
avada siit

LATVIJA

LIETUVA

EESTI



PIRMĀ PALĪDZĪBA

Jā augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Jā augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Jā augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 mL ūdens.

Jā augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārstu konsultācija. Uzrādīt ārstam attiecīgu augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Norādījumi ārstam: simptomātiska ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms.

Saīdēšanās informācijas centra tālruna numurs 67042473.

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darboties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, lietot individuālās aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, respiratoru, aizsargbrilles vai sejas aizsargu, ķīmiski izturīgus aizsargcimdus (neoprēna vai nitrila gumijas) un ķīmiski izturīgus zābakus.

Izvairīties no preparāta nokļūšanas uz ādas, acīs vai apģērba. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi rūpīgi jānotīra – jāmazgā.

PREPARĀTA APRAKSTS

Tomahawk® 200 EC satur darbīgo vielu fluroksipiru, kas pieder piridīna karboksilskābju ķīmisko savienojumu grupai.

Fluroksipirs augos iekļūst caur lapām un dzinumiem, un tiek novadīts arī uz saknēm, tam praktiski nav augšnes iedarbības. Fluroksipirs iedarbojas kā sintētisks hormonu tipa herbicīds, ierosinot augiem reakcijas, kas tipiskas augsni izraisītām reakcijām, piemēram, lapu izliekšanos, čokurošanos, malu ieritināšanos, stublāju paresināšanos, izliekšanos, deformēšanos. Preparāta iedarbība uz aktīvi augošajām nezālēm ir novērojama jau 1.-2.dienā pēc apsmidzināšanas. Nezāļu augšana ir apstājusies un tās iet bojā 2-3 nedēļu laikā.

Tomahawk® 200 EC ir sistēmas iedarbības herbicīds ismūža (īpaši ķeraīņu madaras *Galium aparine*) un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai vasaras kviešu, ziemas kviešu, vasaras miežu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, auzu (arī ar stiebrzāļu pasēju) sējumos. Nevar apstrādāt sējumus ar tauriņziežu pasēju. Efektīvi tiks kontrolēta tikai pavasarī dīgstošā ķeraīņu madara *Galium aparine*. Rudenī sadīgušie īpatņi būs mazāk jutīgi. Herbicīds kontrolē nezāles zālienā, zālienā golfa laukumā, daudzgadīgo stiebrzāļu sējumos (sēklai un lopbarībai), ganībās, stiebrzāļu sēklu laukos sējas gadā. Īpaši ieteicams, lai kontrolētu skābenes (*Rumex spp.*), ārstniecības pieneni (*Taraxacum officinale*). Skābenēm un ārstniecības pieneni apstrādes brīdī jābūt rozetes stadijā.

TOMAHAWK® 200 EC KONTROLES EFEKTIVITĀTE

>85%

Nezāļu suga	0.6 L/ha	0.7 L/ha	1.8 L/ha
Ganu plikstiņš <i>Capsella bursa-pastoris</i>	x	x	x
Ķeraiņu madara <i>Galium aparine</i> *	x	x	x
Tīruma neaizmirstule <i>Myosotis arvensis</i>	x	x	x
Tīruma kumelīte <i>Tripleurospermum inodorum</i>		x	x
Veronikas <i>Veronica</i> spp.*	x	x	x
Parastā vibotne <i>Artemisia vulgaris</i>			x
Baltais āboliņš <i>Trifolium repens</i>			x

* Efektīvi tiks kontrolēta tikai pavasarī dīgstošā ķeraiņu madara *Galium aparine*, veronikas *Veronica* spp.. Rudenī sadiģušie īpatņi būs mazāk jutīgi.

< 85% (nezāļu attīstība tiks būtiski kavēta, apspiesta)

Nezāļu suga	0.6 L/ha	0.7 L/ha	1.8 L/ha
Baltā balanda <i>Chenopodium album</i>	x	x	x
Ārstniecības matuzāle <i>Fumaria officinalis</i>	x	x	x
Sārtā panātre <i>Lamium purpureum</i>	x	x	x
Ārstniecības pienene <i>Taraxacum officinale</i>			x
Tīruma vijolīte <i>Viola arvensis</i>	x	x	x
Krūzainā skābene <i>Rumex crispus</i>			x

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Tomahawk® 200 EC ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas iedarbojas caur augu zaļajām daļām, un tā iedarbības efektivitāte nav atkarīga no augsnes vai gaisa mitruma. Augstāka efektivitāte tiks sasniegta, apsmidzinot jaunākas nezāles, vislabāk dīglapu stadijā. Herbicīds uz nezālēm iedarbojas efektīvāk, ja gaisa temperatūra ir > +7-8 °C. Optimālā temperatūra +12-24 °C.

Nav ieteicams lietot Tomahawk® 200 EC, ja nezāles ir stresa stāvoklī sausuma, pārmitras augsnes dēļ, ja ir ļoti augsta gaisa temperatūra (> +27 °C), ja pirms apstrādes bijušas vai tuvākajās dienās pēc apstrādes tiek prognozētas naktssalnas. Naktssalnas īsi pirms vai pēc apstrādes (3 dienas) var samazināt herbicīda nezāļu kontroles efektivitāti un kultūraugu toleranci pret herbicīdu.

Tomahawk® 200 EC strauji iekļūst augos caur lapām un dzinumiem un ir lietus noturīgs jau 1 stundu pēc izsmidzināšanas.

Apstrādājamais kultūraugs	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, L/ha	Apstrādes laiks, norādījumi
Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi (arī ar stiebrzāļu pasēju)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.5-0.7	Apsmidzināt sējumus pavasārī, atsākoties veģetācijai, sākot ar graudaugu cerošanas fāzes sākumu līdz karoglapas maksts uzbriešanas stadijai (AS 20-45)
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas (arī ar stiebrzāļu pasēju)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.45-0.60	Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 2 lapu stadiju līdz karoglapas maksts uzbriešanas stadijai (AS 12-45)
Zālieni, zālieni golfa laukumos, daudzgadīgās stiebrzāles (sēklai un lopbarībai), ganības (zelmenī stiebrzāles)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.8	Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu sadīgšanas no stiebrzāļu 3 lapu stadijas līdz karoglapas maksts uzbriešanas stadijai (AS 13-45)
Stiebrzāļu sēklu lauki sējas gadā	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.45-0.6	Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu sadīgšanas no stiebrzāļu 2 lapu stadijas līdz 5 lapu stadijai (AS 12-15)

Lai nodrošinātu augstu nezāļu kontroles efektivitāti, ieteicams Tomahawk® 200 EC lietot tvertnes maisījumos ar citiem tam pašam lietojumam paredzētiem herbicīdiem.

Darba šķidruma patēriņš: ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu (arī ar stiebrzāļu pasēju), stiebrzāļu sēklu laukos sējas gadā - 100-300 L/ha; zālienos, zālienos golfa laukumos, daudzgadīgajās stiebrzālēs, ganībās - 100-400 L/ha.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1 reize.

Nogaidīšanas laiks: daudzgadīgo stiebrzāļu sējumos, ganībās – 7 dienas.

Piezīmes.

Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, stiebrzāļu sējumos, ganībās, zālienā un zālienā golfa laukumā ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei un 3 m aizsargjoslu graudaugu un stiebrzāļu sējumos sējas gadā līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Neganīt lopus pļavās un ganībās 7 dienas pēc apstrādes ar preparātu.

Aizliegts cilvēkiem un dzīvniekiem uzturēties uz apstrādāta zāliena, zāliena golfa laukumā 24 stundas pēc apstrādes ar preparātu.

Nelietot sējumos, kur zelmenī ir āboliņš vai lucerna.

SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM (TVERTNES MAISĪJUMU VEIDOŠANA)

Tomahawk® 200 EC ieteicams izmantot tvertnes maisījumos ar citiem minētajos kultūraugos reģistrētajiem herbicīdiem, lai paplašinātu ierobežojamo nezāļu spektru.

Neskaidrību gadījumos konsultēties ar firmas pārstāvi.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šļūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā.

Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto Tomahawk® 200 EC daudzumu tieši tvertnē. Pievieno pārpalikušo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā.

SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS TĪRĪŠANA

Smidzinātāji rūpīgi jāattīra no lietotajiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas.

- Uzreiz pēc smidzināšanas pilnībā iztukšojiet smidzinātāja tvertni un izmazgājiet ar tīru ūdeni. Izskalojiet tvertni, izlaižot ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm.
- Piepildiet tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto tīrīšanas līdzekļa daudzumu. Samaisiet un izlaidiet mazgājamo ūdeni cauri maisītājam un šļūtenēm. Aizveriet smidzinātāja tvertni un piepildītu līdz augšai atstājiet uz 15 minūtēm ar ieslēgtu maisītāju. Vēlreiz izlaidiet ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm, pilnībā iztukšojot tvertni.
- Noņemiet sprauslas un filtrus, tos atsevišķi notīriet mazgāšanas līdzekli, kas atšķaidīts 10 litros ūdens.
- Izskalojiet smidzinātāja tvertni vēlreiz ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 10% no tilpuma, kā arī noregulējiet tā pozīciju drošai mazgāšanai.
- Sekojiet Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem

REZISTENCES VEIDOŠANĀS IEROBEŽOŠANAS STRATĒGIJA

Fluroksipiram saskaņā ar HRAC klasifikāciju ir kods O. Šīs ķīmisko savienojumu grupas darbīgās vielas ietekmē hormonu līdzsvaru nezāļu augos līdzīgi kā augsni. Jebkurā nezāļu populācijā var būt sastopamas mazāk jutīgas vai dabiski rezistentas nezāles. Ja tā paša iedarbības veida herbicīdi tiek lietoti atkārtoti vienā un tajā pašā laukā vairākus gadus, tad mazāk jutīgās nezāles sāk dominēt. Rezistentas nezāļu populācijas var attīstīties īpaši tajos gadījumos, ja lieto samazinātas herbicīdu devas.

Lai novērstu rezistences veidošanos, sekot etiķetē aprakstītajām Tomahawk® 200 EC lietošanas rekomendācijām, kā arī vienās un tajās pašās platībās mainīt herbicīdus ar atšķirīgu iedarbības veidu.

ATKĀRTOTA SĒJA UN PĒCKULTŪRAS

Tomahawk® 200 EC praktiski nav augsnes iedarbības, tāpēc nav ierobežojumu augmaiņai vai augsnes apstrādes veidiem.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Pēc preparāta izmantošanas tara jāizskalo ar ūdeni un skalojamais ūdens jāizmanto darba šķidruma

sagatavošanai. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot citām vajadzībām. Tukšais iepakojums jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBA

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņojuma. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” rekomendācijas. Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepieļaut sasaldšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par 35°C.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – laika, augsnes apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē sava preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz preparāta piemērošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā preparāta glabāšana un darbs ar to ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs. Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepareizas uzglabāšanas vai lietošanas rezultātā.

LIETUVA

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

BENDRA INFORMACIJA

Tomahawk® 200 EC - sisteminio veikimo herbicidas vienmetėms (ypač kibiesiems lipikams), ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žiemiiniuose ir vasariniuose kviečiuose, žiemiiniuose ir vasariniuose miežiuose, žiemiiniuose rugiuose, žiemiiniuose kvietruguose, avižose, vejose, golfo aikštynuose, kultūrinėse pievose ir ganyklose, sėkliniuose varpinių žolių pasėliuose.

VEIKIMO BŪDAS

Tomahawk® 200 EC veiklioji medžiaga fluroksipiras yra sintetinis hormoninio tipo herbicidas, priklausantis priridino karboksirūgščių cheminei klasei. Jis veikia kaip augimo hormonas auksinas sutrikdydamas ląstelių vystymąsi naujai besiformuojančiuose piktžolių ūgliuose bei lapuose ir sukelia šiai herbicidų grupei būdingus požymius. Poveikis jautrioms piktžolėms pastebimas praėjus 1–2 dienoms po purškimo – jos nustoja augusios, išsitraipo, deformuojasi bei sunyksta per 3–4 savaites (daugiametės dviskiltės piktžolės – per 6 savaites). Fluroksipiras į piktžolės patenka per lapus, dirvinio poveikio neturi.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Tomahawk® 200 EC yra sisteminis herbicidas, kuris patenka į piktžolės kontaktiškai per lapus. Siekiant gero efektyvumo, rekomenduojama panaudoti herbicidą kai piktžolės mažos bei aktyviai auga, oro temperatūra nuo + 7° C iki + 25° C, piktžolės bei kultūriniai augalai nėra paveikti stresinių aplinkybių t.y. šalnų, sausros, užmirkimo, ligų bei kenkėjų pažeidimų.

Tomahawk® 200 EC žiemiiniuose javuose naudojamas pavasarį, nuo vegetacijos atsinaujinimo iki lapamastės sustorėjimo tarpsnio, vasariniuose javuose – nuo dviejų lapelių iki lapamastės sustorėjimo tarpsnio. Kultūrinėse pievose, ganyklose, sėkliniuose varpinių žolių pasėliuose, vejose bei golfo aikštynuose galima naudoti sėjos metais kai varpinės žolės turi 2–5 lapelius, o sekančiais metais po sėjos: nuo trijų lapelių iki lapamastės sustorėjimo, kai piktžolės intensyviai auga.

Tomahawk® 200 EC gali būti naudojamas javuose su varpinių žolių įsėliais, tačiau jo negalima naudoti javuose su dobilų, liucernos arba kitų ankštinių žolių įsėliais.

Tomahawk® 200 EC nerekomenduojamas naudoti pasėliuose, kuriuose augalai paveikti streso dėl nepalankių aplinkos sąlygų, pvz., ilgalaikių šalnų, sausros, užmirkimo, maisto medžiagų trūkumo ir kt. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

NORMOS IR PURŠKIMO LAIKAS

Augalai	Normos, L/ha	Purškimų skaičius per sezoną	Karencijos laikotarpis	Vandens kiekis, L/ha	Purškimo laikas
Žieminiai javai: kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai	0.7	1	-	100–300	Pavasarinis purškimas; BBCH 20-45 (nuo vegetacijos atsinaujinimo iki lapamakštės sustorėjimo tarpsnio)
Vasariniai javai: kviečiai, miežių, avižos	0.5	1	-	100–300	BBCH 12-45 (nuo dviejų lapelių iki lapamakštės sustorėjimo tarpsnio)
Pievos / ganyklos (antrais metais) šieno / siloso gamybai, žolių sėklų gamybai, vejoms, golfo laukai	1.8	1	7	100–400	Kovas–rugsėjis; BBCH 13–45 (nuo trijų lapelių iki lapamakštės sustorėjimo)
Pievos (pirmaisiais metais)	1.0	1	7	100–300	Kovas–gegužė; BBCH 12-15 (kai varpinės žolės turi 2–5 lapelius)

Tomahawk® 200 EC veiksmingumas:

*** - 85–95%

** - 75–85%

Piktžolės	0.7 L/ha žieminuose jaluose	0.5 L/ha vasariniuose jaluose	1.8 L/ha antrų metų pievos	1.0 L/ha pirmų metų pievos
Bekvapis šunramunis (<i>Tripleurospermum perforatum</i>)	***	-	-	-
Trikertė žvaginė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	***	-	-	-
Kibusis lipikas (<i>Galium aparine</i>)	**	***	***	***

Piktžolės	0.7 L/ha žieminiuose javuose	0.5 L/ha vasariniuose javuose	1.8 L/ha antrų metų pievos	1.0 L/ha pirmų metų pievos
Veronikos (<i>Veronica sp.</i>)	-	***	-	-
Plačioji balandūnė (<i>Atriplex patula</i>)	**	-	-	-
Daržinė žliugė (<i>Stellaria media</i>)	-	***	-	-
Dirvinė neužmirštuolė (<i>Myosotis arvensis</i>)	**	***	-	-
Dirvinė našlaitė (<i>Viola arvensis</i>)	**	-	-	-
Raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>)	-	**	-	-
Vaistinė žvirbliarūtė (<i>Fumaria officinalis</i>)	-	**	-	-
Paprastasis kietis (<i>Artemisia vulgaris</i>)	-	-	***	-
Baltasis dobilas (<i>Trifolium repens</i>)	-	-	***	-
Raukta lapė rūgštyinė (<i>Rumex crispus</i>)	-	-	***	-
Juodoji kliauliuogė (<i>Solanum nigrum</i>)	-	-	***	***

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusė purkštuvo talpos pripildoma vandeniu. Įjungiamas maišytuvas ir supilamas reikalingas Tomahawk® 200 EC kiekis. Po to pripilamas trūkstamas vandens kiekis ir gerai išmaišoma.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Prieš purškiant Tomahawk® 200 EC, purkštuvą turi būti gerai išplautas, pagal anksčiau naudoto preparato purkštuvo plovimo rekomendacijas. Baigus purkšti, purkštuvą turi būti gerai išplautas vandeniu arba specialia priemone. Purkštukai ir filtrai nuimami ir išplaunami atskirai. Vengti, kad paplavos nepatektų į vandens telkinius.

SĖJOMAINA

Tomahawk® 200 EC veikioji medžiaga neturi dirvinio poveikio, todėl laukuose purkštuose Tomahawk® 200 EC gali būti auginami visi žemės ūkio augalai be apribojimų, nepriklausomai nuo žemės dirbimo būdo.

ŠALIA AUGANTYS ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI

Ypatingai saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių žemės ūkio augalų.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Fluroksipiras pagal HRAC/WSSA sistemą klasifikuojamas kaip 4 grupės herbicidas. Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Ilgai naudojant to paties veikimo būdo herbicidus, gali išsivystyti piktžolių atsparumas.

Siekiant sumažinti atsparumo atsiradimo pavojų, būtina būtinai griežtai laikytis šių rekomendacijų:

1. taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą.
2. mišiniuose, paėliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.
3. naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku.
4. panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daigintis vegetatyviškai ir sėklomis.

MAIŠYMAS

Tomahawk® 200 EC rekomenduojama maišyti su kitais tose kultūrose registruotais herbicidais veikimo spektroo praplėsti. Informacijos apie Tomahawk® 200 EC maišymą su kitais augalų apsaugos produktais ieškokite gamintojo informacinėje medžiagoje, tinklalapyje arba kreipkitės į gamintojo atstovą.

SAUGOS PRIEMONĖS

Nėščios ir vaisingo amžiaus moterys turėtų vengti kontakto su produktu.

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt.

Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166).

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374). Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis arba kombinezoną bei rekomenduojama avėti sandarius batus ir mūvėti pirštines.

Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokių sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus

drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

SAUGOJIMAS

Laikykite preparatą vėsioje, sausose, gerai vėdinamose patalpose, originalioje gamintojo taroje. Tomahawk® 200 EC turi būti saugomas ne žemesnėje nei -5 °C temperatūroje. Laikykite atskirai nuo maisto, vandens, gyvulių pašaro ir trąšų. Saugokite nuo vaikų.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti tuščių pakuotės kitiems tikslams.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutęs blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 mL) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

PASTABA

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

Tomahawk® – registruotas ADAMA Agricultural Solutions Ltd. prekinis ženklas.

EESTI

ESMAABI

Halva enesetunde tekkimisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata etiketti.

Kokkupuutel nahaga: võtta seljast saastunud riieus ja pesta kemikaaliga kokku puutunud nahka pehme seebi ja veega. Pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: loputada silma puhta veega vähemalt 15 minuti jooksul ja pöörduda viivitamatult arsti poole.

Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte. Pöörduda viivitamatult arsti poole.

Allaneelamisel: mitte esile kutsuda oksendamist. Tagada kannatanule rahu. Pöörduda viivitamatult arsti poole.

Ärge püüdke teadvusetule või krampides inimesele suu kaudu midagi manustada.

Nõuanne arstile: Spetsiifiline vastumürk puudub. Jälgida kannatanut, ravi on sümptomaatiline.

TÖÖOHUTUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Kanda sobivat kaitseriietust, kaitsekindaid ja silmade/näo kaitset. Vältida valmistise või lahuse kokkupuudet naha, rõivaste ja silmadega. Kasutamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Valmistise auru sissehingamise vältimiseks kanda sobiva filtriga hingamisteede kaitsevahendit. Pärast pritsimist pesta ennast duši all. Pärast tööd pesta kaitseriietust ja puhastada isikukaitsevahendid.

TULEKAITSE

Sobivad kustutusvahendid: Väikese tulekahju korral: kuiv keemiline pulber, pihustatav vesi, süsinikdioksiid.

Suure tulekahju korral: vaht, veeuud, pihustatav vesi.

Ohtlikud lagusaadused: kloriidid ühendid, fluoriid, süsiniku oksiidid (CO , CO_2), lämmastikoksiidid (NO , NO_2).

Tuletõrjujate kaitse: suletud aladel nõutakse autonoomset hingamisaparaati ja kogu keha katvat kaitseriietust.

TOIMEMEHHANISM

Tomahawk® 200 EC toimeaine fluroksüspüür on sünteetiline hormoon-tüüpi herbitsiid, mis kuulub püridiini karboksüülhappe keemilisse klassi. See toimib nagu kasvuhormoon auksiin, takistades rakkude arengut umbrohu võrsetes ja lehtedes ning põhjustab selle herbitsiidi grupele iseloomulikud tunnused. Mõju vastuvõtlikele umbrohtudele on täheldatud kõigest 1-2 päeva jooksul pärast pritsimist: nende kasv peatub, taim moondub, lõpuks deformeerub ja hävib 3-4 nädala jooksul. Fluroksüspüür satub umbrohtu lehtede kaudu, mulla kaudu mõju puudub.

KASUTUSOOVITUS

Tomahawk® 200 EC on süsteemne herbitsiid, seetõttu selle tõhusus ei sõltu õhu ja mulla niiskusest.

Paremini hävivad aktiivselt kasvavad väikesed umbrohud. Toote aktiivsus on parim, kui õhutemperatuur on pritsimise ajal üle 7°C.

Tomahawk® 200 EC satub umbrohtu lehtede kaudu ja vihm 1 tund pärast pritsimist toote efektiivsust

ei mõjuta. Tomahawk® 200 EC'd kasutatakse teraviljades alates kahe lehe faasist kuni viljatupe lahtikeerdumiseni. Maisi pritsitakse 3-6 lehe faasis kas üks või kaks korda. Tomahawk® 200 EC'd võib kasutada teraviljas kõrreliste heintaimede allakülvidega, kuid mitte kasutada teraviljas koos ristiku, lutserni või muude kaunviljade allakülvidega. Tomahawk® 200 EC'd ei soovitata kasutada põllukultuurides, kus kultuurid on mõjutatud stressist ebasoodsate keskkonningimuste, näiteks pikaajalise külma, põua, liigniiskuse, toitainete vaeguse jne tõttu. Vältige pritsitava aine sattumist kõrval kasvavatele taimedele.

PRITSIMISKOGUS JA -AEG

Taimed	Pihustusmäär L/ha	Pihustusaeg	Märkused
Talinisu, -oder, tritikaals, rukis	0,5-0,6	Kevadine pritsimine võrsuissõlme moodustumisest kuni viljatupe lahtikeerdumiseni (BBCH 20-45)	
Suvinisu, -oder, kaer	0,35-0,4	Kevadine pritsimine kolmanda lehetipu nähtavale ilmnemisest kuni viljatupe lahtikeerdumiseni (BBCH 12-45)	
Mais	0,5	3-6 lehe faasis (BBCH 13-16)	
Mais	0,45 + 0,45	3-6 lehe faasis (BBCH 13-16)	Pritsitakse kaks korda a' 0,45 l/ha, intervall pritsimiste vahel on 10 päeva
Karjamaad, rohumaad silo ja heina tootmiseks, kõrrelised seemneks, muru, golfiväljakud	1,8	Kolme lehe faasist kuni viljatupe lahtikeerdumiseni (BBCH 13-45)	
Kõrreliste rohumaad külviaastal	1,0	2-5 lehe faasis (BBCH 12-15)	

Pritsimiskordade arv: teraviljadel, rohumaadel ja heintaimede seemnepõldudel 1, maisil 1 või 2.

Ooteaeg rohumaadel 7 päeva.

Soovitav vee hulk: 100 - 300 L/ha.

Vihmakindlus: 1 tund pärast pritsimist.

Tomahawk® 200 EC'le tundlikud umbrohud:

Roomav madar (*Galium aparine*)
Vesihein (*Stellaria media*)
Raudnõges (*Urtica urens*)
Kare kõrvik (*Galeopsis tetrahit*)
Verev iminõges (*Lamium purpureum*)
Valge pusurohi (*Melandrium album*)
Erilehine linnurohi (*Polygonum aviculare*)
Põld-konnatatar (*Fallopia convolvulus*)
Kärnoblakas (*Rumex crispus*)
Harilik võilill (*Taraxacum officinale*)

Keskmiselt tundlikud umbrohud:

Põld-litterhein (*Thlaspi arvense*)
Harilik nälghein (*Spergula arvensis*)
Põldsinep (*Sinapis arvensis*)
Must maavits (*Solanum nigrum*)
Põldmailane (*Veronica arvensis*)
Valge hanemalts (*Chenopodium album*)
Põld-kapsasrohi (*Brassica campestris*)
Kollane jaanikakar (*Chrysanthemum segetum*)
Linnurohud (*Polygonum* spp.)
Põldmagun (*Papaver dubium*)
Rukkilill (*Centaurea cyanus*)
Põldohakas (*Cirsium arvense*)
Harilik punand (*Fumaria officinalis*)
Suur teeleht (*Plantago major*)
Harilik kesalill (*Tripleurospermum perforatum*, *T. inodorum*)

SEGATAVUS

Toimespektri laiendamiseks on soovitatav Tomahawk® 200 EC'd segada teiste samadele kultuuridele registreeritud herbitsiididega. Teavet Tomahawk® 200 EC segamise kohta muude taimekaitsevahenditega leiab toote infomaterjalil, kodulehel või võttes ühendust tootja esindajaga.

TOOTE KASUTAMINE

Enne kasutamist peavad kõik pihustusseadmed olema õigesti kalibreeritud, et oleks vastav liikumiskiirus, voolukiirus ja jaotuse tasasus.

TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE

Veenduge, et prits on puhas ja ei ole saastunud. Arvutage hoolikalt välja nõutud pritsimissegude kogus vältimaks ülejääkide jäämist pärast pritsimist pritsipaaki.

Täitke 1/4 - 1/2 pritsipaaki puhta veega, lülitage sisse segisti, lisage arvutatud ja mõõdetud kogus toodet ning jätkake ülejäänud pritsipaagi täitmist, lisades vajadusel juurde muud tooted. Jätkake segamist kuni segu ühtlase konsistentsi tekkimiseni. Pritsipaagi täitmisel peab täitevoolik olema alati veetasemest kõrgemal, et oleks välditud tagasivool.

Töölahus ei tohi sattuda kanalisatsiooni, jõgedesse vm veekogudesse.

PRITSI PESEMINE

Enne pritsimist Tomahawk® 200 EC'ga tuleb prits hoolikalt puhastada varem kasutatud tootest vastavalt selle etiketil toodud puhastussoovitustele. Pärast pritsimist Tomahawk® 200 EC'ga tuleb prits põhjalikult loputada vee või spetsiaalse vahendiga. Pihusti otsad ja filtrid eemaldada ning pesta eraldi. Vältida pesuvee sattumist veekogudesse.

PRITSI PESEMINE

Puhastage prits kohe pärast kasutamist nii väljast kui ka seest.

Alustage pritsi puhastamisega seestpoolt:

1. Tühjendage prits pritsides lahjendatud töölahuse ülejäägid eelnevalt töödeldud põllule.
 2. Siis täitke pritsipaak kolmandikuni puhta veega ja loputage.
 3. Pritsige loputusvesi välja eelnevalt töödeldud kultuuri peale.
 4. Täitke uuesti paak kolmandiku ulatuses veega.
 5. Teisele loputamisele lisage sobiv puhastusvahend.
 6. Laske tootel ja veel süsteemis ringelda ning laske siis välja.
 7. Täitke viimast korda paak kolmandiku ulatuses veega.
 8. Laske vedelikul süsteemis ringelda ja laske siis välja.
- Jätkake pritsipaagi ja poomi välise puhastamisega.

RESISTENTSUSE TEKKIMISE RISK TÕRJEVAHENDI SUHTES

Fluoksüüpüür on HRAC süsteemi alusel liigitatud O-rühma herbitsiidiks. Mistahes umbrohu populatsioonis võib olla vähem tundlikke või loomulikult vastupidavaid taimi. Kui samal põllul on mitu aastat järjest kasutatud sama toimeviisiga herbitsiide, siis loodusliku valiku käigus vastupidavad umbrohud paljunevad ja muutuvad domineerivaks. Sama toimeviisiga herbitsiidide pikaajalisel kasutamisel, eriti alla keskmist määra, võib umbrohol tekkida herbitsiidi suhtes vastupidavus.

Selleks, et vähendada resistentsuse tekkimise riski, tuleb täita etiketil märgitud kasutamissoovituste ja nõuete ning on soovitatav kasutada järgmisel aastal teistsuguse toimeviisiga herbitsiide.

KÜLVIKORD

Tomahawk® 200 EC toimeaine ei mõju mulla kaudu, seetõttu võib Tomahawk® 200 EC'ga pritsitud põldudel sõltumata maaharimise viisist kasvatada ilma piiranguteta kõiki põllukultuure.

TÜHJADE PAKENDITE HÄVITAMINE

Taara korduvkasutamine on keelatud! Loputada tühjaks saanud taarat vähemalt 3 korda puhta veega, loputusvesi valada valmistatava töölahuse hulka. Juhul, kui pritsil on tankimisseade koos loputusmehhanismiga, kasutada seda. Tühi taara viia ohtlike jäätmete kogumiskohta. Mitte visata mahuteid kanalisatsiooni või kraavidesse; vältida pinna- ja põhjavee saastumist.

HOIUTINGIMUSED

Hoida otsese päikesevalguse eest. Kaitsta külmumise eest. Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas originaalpakendis. Säilitustemperatuur: minimaalne temperatuur 0°C, maksimaalne temperatuur +35°C.

MÄRKUS

Enne kasutamist lugege juhised hoolikalt läbi. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud teguritest, mille üle tootjal puudub kontroll. Kõik soovitusel valmistise kasutamise suhtes põhinevad tootjale saadaval kogemusel. Kuna nii ladustamise kui ka käitlemise tingimused on väljaspool tootja kontrolli, siis mistahes ohu tõttu saadud kahju kannab kasutaja.



TOMAHAWK® 200 EC



ADAMA

©ADAMA Agan Ltd.



HERBICĪDS/HERBICIDAS/HERBITSIID

emulsijas koncentrāts/
koncentruota emulsija/
emulsioonikontsentraat (EC)



Darbīgā viela/Veiklīji medžiaga/Toimeaine

• fluroksipirs/fluroksipiras/fluroksüpūūr . . . 200 g/L (20.4 % w/w)



Informācija / Informacija / Informatsooon

LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0536
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas Nr. un izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā
Pārstāvniecība Latvijā:
Tālr.: +371 2 729 33 30

**Ražotājs, tā adrese/
Gamatinojs/Totja/
pakendaja:**
ADAMA Agan Ltd.
P. O. Box 262
77102 Ashdod
Izraēla/Izraelis/Iisrael

LIETUVA

Registrācijas numeris: AS2-34H (2016)
Partijos numeris ir pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai
Atstovas Lietuvoje:
Tel.: Tālr.: +370 85 210 86 22

EESTI

Eesti reg. nr.: 0623/21.06.16
Partii nr. ja valmistamise kuupaev: vaata pakendilt
Säilivusaeg: 2 aastat

**Reģistrācijas apliecības
īpašnieks, tā adrese/
Registrācijas savininks/
Registreerimise haldaja:**
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Niederlande/Nyderlandai/
Madalmaad
Tālr./Tel./Tel.:
+31 (0)33 205 68 00
www.adama.com

LATVIJA

Tomahawk® 200 EC - Sistēmas iedarbības herbicīds izsmidzinātā un daudzgadīgo divdīgļlapu nezālū ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos (arī ar stiebrzāļu posējū), daudzgadīgo stiebrzāļu sējumos (sēklai un lopbarībai), ganībās, zālienā, zālienā golfa laukumā, kā arī stiebrzāļu sējumos sēklai sējas gadā.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
• H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. • H336 Var izraisīt miegainību vai reiboni. • H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. • EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgšanu. • EUH 401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un vidi, ievērojiet lietošanas pamācību. • P280 Izmantot acu aizsargus/ sejas aizsargus. • P261 Izvairīties ieelpot smidzinājumu. • P301+P310+P331 NORĪŠANAS GADIJUMĀ: nekavējoties sazināties ar SAINĒŠANAS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. • P304+P340 IEELPOŠANAS GADIJUMĀ: Izvest elietos svaigā gaisā un turēt mierā stāvoklī, lai būtu ērti elpot. • P312 Sazināties ar SAINĒŠANAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. • P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACIM: uzmanīgi izskalojiet acis ūdenī vairākas minūtes. Izņem kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skatot. • P501 Atbrīvojiet no satura/ tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. • SP1 Nepiesāciet ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu/ netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā/ izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. • SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstečiem. • SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaisītu izdigušu augus, stiebrzāļu sējumos, ganībās, zālienā un zālienā golfa laukumā ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamajai zemei un 3 m aizsargjoslu draudaudu un stiebrzāļu sējumos sējas gadā līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamajai zemei. Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112.

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsērējamās telpās. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepieļaut sasaldāšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemāk par 0 °C un ne augstāk par +35 °C.

LIETUVA

Tomahawk® 200 EC - sisteminio veikimo herbicidas vienmetams (ypač kibiešiams lipikams), ir daugiametams dvisklėms piktolesms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miečiuose, žieminiuose kvietrugiuose, žieminiuose rugiuose, avižose, vejose, golfo aikštynuose, kultūrinėse pievose ir ganyklose, sėkliniuose varpinų žolių pasėliuose. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. • Smarkiai pažeidžia akis. • Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. • Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. • Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dirginimą arba skilnelę. • Stengtis neįkvėpti rūko/ garų/aerolio. • Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. • PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. • NESKATINTI vėmimo. • PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. • Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. • Surinkti ištekėjusią medžiagą. • Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. • Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakuotės (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenąž iš sodybų ar nuo kelių). • Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių, kai purškiamos vejose, golfo aikštynai, kultūrinės pievos ir ganyklos bei sėkliniai varpinų žolių pasėliai. • Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. • Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Sandėliavimas - Laikykite preparatą vėsioje, sausose, gerai vėdinamose patalpose, originalioje gamintojo taroje. Tomahawk® 200 EC turi būti saugomas ne žemesnėje nei -5 °C temperatūroje. Laikykite atskirai nuo maisto, vandens, gyvulių pašaro ir trąšų. Saugokite nuo vaikų.

EESTI

Tomahawk® 200 EC - on selektiivne herbitsiid kaheiduleheliste umrõhudele trõjeks tali- ja suvinisus, tali- ja suviidars, tali- ja suvitritikales, rukkis, kaeras, maisis, murus, golfivõljakutel, kultuurmitudel ja karjamaadel, heintaimede seennepõudel. Ainult professionaalseks kasutamiseks.

H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse satumisel võib olla surmav. • H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. • H336 Võib põhjustada unisust või peapöörust. • H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikajaline toime. • EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. • EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohutamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. • P280 Kanda kaitseprille/kaitsemaski. • P261 Vältida pihustatud aine sissehingamist. • P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamatult ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE / arstiga. • P331 MITTE kasutada esile oksendamist. • P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult vee. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. • P310 Võtta viivitamatult ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE / arstiga. • P391 Mahavoolanud toode vakku koguda. • P501 Sisu/mahuti kõrvaldamise vastavalt kohalikele eeskirjadele. • SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette satumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). Häädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Hoiustamine - Hoida otsese päikesevalguse eest. Kaista külmumise eest. Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas originaalpakendis. Säilitustemperatuur: minimaalne temperatuur 0°C, maksimaalne temperatuur +35°C.

**Skaneerimiseks /
Nuskaityti QR kodq /
QR-koodi lugemine**



SKALAUK TEISINGAI



8 718077 010656

UN3082

GRUPA
GRUPĖ
GRUPP

4

HERBICĪDS
HERBICIDAS
HERBITSIID



BRIESMAS
PAVOJINGA
ETTEVAATUST

4 x 5 L

1111790CFR_08



TOMAHAWK[®] 200 EC



ADAMA



LATVIJA



LIETUVA



EESTI



BRIESMAS/PAVOJINGA/ETTEVAATUST



UN3082

L111179PAAR_08

30 x 20 L