



GOLTIX[®] GOLD



ADAMA

©Adama Quena N.V.



HERBICĪDS/HERBICIDAS/HERBITSIID

suspensijas koncentrāts/
koncentruota suspensija/
suspensioonikonsentraat (SC)



Darbīgā viela/Veiklīoji medžiaga/Toimeaine

● metamitrons/metamitronas/metamitroon 700 g/L (58.3% w/w)



Informācija / Informacija / Informatsoon

 **LATVIJA**

Reģistrācijas Nr.: 0851
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas Nr. un izgatavošanas datums:
skatīt uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi no
izgatavošanas datuma neatvērtā,
oriģinālā iepakojumā
Pārstāvniecība Latvijā:
Tālr.: +371 2 729 33 30

 **EESTI**

Eesti reg. nr.: 868/19.01.24
Partii nr. ja valmistamise kuupaev:
vaata pakendilt
Säilivusaeg: 2 aastat

 **LIETUVA**

Registracijos numeris: AS2-90H(2020)
Partijos numeris ir pagaminimo data:
žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai
Atstovas Lietuvoje:
Tel.: +370 85 210 86 22

Reģistrācijas apliecības īpašnieks,
tā adrese / Registrācijas savininkas /
Registreerimise haldaja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Niederlande/Nyderlandai/Madalmaat
Tālr./Tel./Tel.: +31 (0)33 205 68 00
www.adama.com

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/Tootja/
pakendaja:
ADAMA Agran Ltd.
P. O. Box 262
77102 Ashdod
Izraēla/Izraelis/
Iisrael

**UZMANĪBU
ATSARGĪAI
HOIATUS**



UN3082

NO VARNISH AREA

L123J4IPFR_01

5 L e



Skānet informācijai /
Nuskaityti QR kodq /
QR-koodi lugemine



SKALAUK TEISINGAI



GOLTIX® GOLD



LATVIJA

Goltix® Gold – Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds izmūža divlappaju nezāļu ierobežošanai cukurbietēs, lopbarības biešu, galda biešu, ķimeņu un spinātu (sēkļa) sējumos, parastās eglēs un zemenu stādījumos.

H302 Kaitīgs, ja norij ● **H411** Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām ● **EUH208** Saturs 1,2-benzotiazolīn-3-one. Var izraisīt alerģisku reakciju ● **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un vidi, ievērojiet lietošanas pamācību ● **P280** Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/ acu aizsargus/sejas aizsargus ● **P301+P312** NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANAS INFORMĀCIJASCENTRU/ārstu, ja jums ir slikti pašajūs ● **P330** Izskalo muti ● **P391** Savākt izsīkstošo šķidrumu ● **P501** Atbrīvojiet no saturs/vertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības ● **SPI** Nepiesāpēt ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstelpju un ūdenstecu tuvumā. Izstrādāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem ● **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstelpam un ūdenstecam.

Avārijas gadījumā zīnot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112

Uzglabāšana – Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzamās telpās, bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā ne zemāk par 0 °C un ne augstāk par +35 °C.

LIETUVA

Goltix® Gold – yra selektyvus, sisteminio poveikio herbicidas, skirtas vienametams ir kai kurioms daugiametems dviskiltėms piktžolėms naikinti cukrinių runkelių, pašarinių runkelių, valgomųjų burokėlių pasėliuose.

Goltix® Gold naudojimas braškėse, sėkliniuose spinātuose, krynynuose, dekoratyvinių augalų daigynuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenų medelynuose, dekoratyviniuose medžiuose ir krūmuose, egliųčių sodinukuose išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu. Skirtas profesionalajam naudojimui.

Kenksminga prarijus ● Toksiška vandens organizmams, sukelti ilgalaikis pakitimus ● Sudėtyje yra 1,2-benzotiazolīn-3-one. Gali sukelti alerginę reakciją ● 8 procentus mišinio sudaro, nezinomo ūmaus toksiškumo įkvėpus, sudedamosios dalys ● Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijas nurodymus ● Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas kūno vietas ● Neuzteršti vandens augalų apsaugos produktą ar jo pakute (neplauti purškimo ir įrenginių šalia pavirsinio vandens telkinių / vengti taršos per drenąžį iš sodų ar nuo kelių) ● Surinkti ištekėjusį medžiagą ● Tolygių šaltini pogo nacionalines teises aktyvūs telkavimus ● Siekiant apsaugoti pašalinis asmenis ir gyventojus, operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 10 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos ir privalo naudoti dulksnų mazinančią įrangą, purškiant krynyn, braškės ● Siekiant apsaugoti pašalinis asmenis ir gyventojus, operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 5 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos ir privalo naudoti dulksnų mazinančią įrangą purškiant cukrinių runkelių, pašarinių runkelių, valgomųjų burokėlių, sėklinių spinatų pasėlius, dekoratyvinių medžių ir krūmų, egliųčių sodinukų, purškiant dekoratyvinius augalus daigynuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenų medelynuose ● Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metamitrono dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke ● Siekiant apsaugoti vandens organismus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki pavirsinio vandens telkinių ir melioracijos griovių ● Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti apsaugos zoną 5 metrus iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba naudoti 50 proc. dulksnų mazinančius purkštukus. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonais: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Sandėliavimas – Produktą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausioje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto produktų, vandens ir pašarų, ne aukštesnėje kaip +35°C ir ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

EESTI

Goltix® Gold on laia toimepektriga herbitsiid kaheiduleheliste ja mõningate uheiduleheliste umbrohtude tõrjeks suhkrupeedil, sõdapeedil, punapeedil, toaimates, dekoratiivtaimedel, metsanduses, maasikatel, kõõmnel, seermeks kasvatataval spinatil ning piivilleleel.

Goltix® Goldi võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnetust omav isik. Enne taimekaitsevahendi kasutamist loe hoolikalt toote etiketti.

Goltix® Gold on suspensioonikonsentraat, mis sisaldab 700 g/L kohta metamitroni. Toode on mõeldud külvieeliseks ja külvijärgseks ühe- ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks.

H302 Allaneelamisel kahulik ● **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit ● **EUH208** Sisaldab 1,2-benzotiazolīn-3-one. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni ● **H411** Mürgine veerogainismidele, pikajaline toime ● **P264** Pärast käitlemist pesta hooliga vahendiga kokku puutunud kehaosi ● **P270** Toote käitlemise ajal mitte tühjenda, juua ega suitsetada ● **P301+P312+P330** AL- LANEELAMISE KORRAL: hõlva enesetunde korral võta ühendust MÜRGIJUSTEABEKESKUSEGA või arstiga. Loputada suud ● **P280** Kanda kaitsekindaid ● **P391** Mahavoolanud toode kokku koguda ● **SPe3** Veerogainismide kaitsmiseks pidada maasika koristusjärgsel kasutusel kinni mittepritsustavast puhvervõõndist 10 m pinnaseekogudest ● **SPe3** Mittesihetmärkatimede kaitsmiseks pidada kinni kulunormile vastavast puhvervõõndite ja triivi vahendavate otsikute kombinatsioonist, mille leiab infolohend vastavast tabelist ● **SPI** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (See ei ole soovitatav, kuna see võib põhjustada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber: 16662.

Pinna- ja pähjavee kaitse eesmärgil toote kasutamise järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimkaitsevahendi kasutamise ja hoolduka täpsemad nõuded“ ning Veeuseadust tulenevad kasutuspiirangud.

Hoistamine – Taimkaitsevahendit hoitakse selleks sobivas ruumis, taimekaitsevahendi väikes koguse puhul ka selleks ettenähtud konteinervis või kapis, mis on lukustatud ja millel on mürgise aine puhul kasutatava hooldusmärgi. Taimkaitsevahendit hoitakse eraldi toidust, ravimitest ja sõodast, et vältida nende saastumist taimekaitsevahendiga. Hoida temperatuuril mitte alla 0°C ja mitte üle +35°C.

UFI: 2JHQ-9DFT-8VOK-69KJ

GRUPA 5 HERBICIDUS
GRUPĖ 5 HERBICIDAS
GRUPP 5 HERBITSIID



8 178077 013510

L12314IPBB_01

LATVIJA

Goltix® Gold – Selektīvs sistēms iedarbības herbicīds īsmaža divdīgļlapu nezāļu ierobežošanai cukurbietīs, lopbarības biešos, galdā biešos, ķimeņu un spinātu (sēkļa) sējamos, pašaudzēšanas ogļos un zemenņu stādījumos.

H302 Kaitīgs, ja norij | **H411** Toksišķis ūdens organismiem ar ilgstošām sekām | **EUH208** Satur 1,2-benzotiazolīnol-3-one. Var izraisīt alerģisku reakciju | **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēkiem veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību | **P280** Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus | **P301+P312** NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: saņēmis ar SAINDĒŠANAS INFORMĀCIJASCENTRU/ ārstu, ja jums ir sliktas pašsajūta | **P301** Izskalo muti | **P391** Savākt izsīkstošo šķidrumu | **P501** Atbrīvoties no satura/vietnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības | **SP1** Nepiesārot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpņu un ūdenstecu tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenažo vai nogāliem un ceļiem | **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Aviārijas gadījumā zīnot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112

Uzglabāšana – Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzāmās telpās, bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā ne zemāk par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

LIETUVA

Goltix® Gold – Ja selektīvs, sistēmīno poveikio herbicidais, skirtas vienamētms ir kai kurioms daugiameēmms divskiltēmms piktzālēmms naikinti cukurni runkelī, pašarnī runkelī, valgomjujū burkolejū pašēlīsē.

Goltix® Gold naudojamas braškėse, sekliniuose spinatuose, kmynuose, dekaratyvinių augalų daigynuose, spygliučių ir lapuočių sodmenų medelynuose, dekaratyviniuose medžiuose ir krūmuose, egliučių sodnikuose išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Kenksminga priarijus | Toksiško vandens organizmams, sukėlia ilgalaikiu pakitimus | Sudėtyje yra 1,2-benzotiazolīnol-3-one. Gali sukelti alerģinę reakciją | 8 procentus mišinio sudaro, nežmona ūmaus toksiškuma įkvėpus, sudedamosios dalys | Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus | Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštą kūno vietą | Neužteršti vandens augalų apsaugos produktai ar jo pakavė (neplauti) pargali ir įranginiū šalia paviršinio vandens telkinijū / vengti taršos per drenažū iš sodybu ar nuo kelijū | Surinkti ištekiųgių medžiagū | Talyplūkū šalinai pagal nacionalines teisės aktū reikalavimus | Siekiant apsaugoti pašalinis asmenis ir gyventojus, operatoriai privalo laikytis ne mažesnis kaip 5 metrū apsaugos zonos iki kelijū kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomenines parkities, rekreaciniū ir bendro naudojimo teritorijū ribos ir privalo naudoti dulksnū mažinančią įrangą, purškiant kmynus, braškes | Siekiant apsaugoti pašalinis asmenis ir gyventojus, operatoriai privalo laikytis ne mažesnis kaip 5 metrū apsaugos zonos iki kelijū kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomenines parkities, rekreaciniū ir bendro naudojimo teritorijū ribos ir privalo naudoti dulksnū mažinančią įrangą purškiant cukurni runkelī, pašarniū runkelī, valgomjujū burkolejū, sekliniū spinatū pašėlus, dekaratyviniū medžiū ir krūmus, egliučių sodnikuus, purškiant dekaratyviniū augalū daigynuose, spygliučių ir lapuočių sodmenis medelynuose | Siekiant apsaugoti požeminiū vandeni, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metamitrono dažniū kaip kartą per trejus metus tame pažiame lauke | Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlikti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinijū ir melioracijas grioviū | Siekiant apsaugoti netiksliniū augalū būtinū išlikti apsaugos zona 5 metrus iki ne žemėsi ūki parkities žemės arba naudoti 50 proc. dulksnū mažinančios purkėtuos.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Sandėliavimas – Produktū laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto produktū, vandens ir pašarū, ne aukštesnėje kaip +35°C ir ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

ESTI

Goltix® Gold on laia toimespeklirga herbitsiid kaheidulehelihes ja mõningate ehituleheliste umbruhetude tõrjeks suhkrupeeldil, sõõpandusel, punapeeldil, taimesel, dekaratiivmedidel, metsandusel, maaskatel, kõmnel, seemnecs kasvatataval spinatil ning peieldel.

Goltix® Gold võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isiki. Enne taimekaitsevahendi kasutamist loe hooldikate toote etiketti.

Goltix® Gold on suspensioonkontsentraat, mis sisaldab 700 g/L khta metatritroni. Toode on mēeldud külvielceks ja külviirgeseks ūhe- ja kaheiduleheliste umbruhetude tõrjeks.

H302 Allaneelamisel kahjulik | **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit | **EUH208** Sisaldab 1,2-benzotiazolīnol-3-one. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni | **H411** Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime | **P264** Pärast käitlemist pesta hooliga vahendiga kokkupuutunud kehast | **P270** Toote käitlemise ajal mitte süü, juua ega suitsetada | **P301+P312+P330** ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võta ühendust MÜRGIUSUSTEABEKESKUSEGA või arstiga. Loputada suud | **P280** Kanda kaitsekindaid | **P301+P312** Pärast võtmist võta kohe kokku kogu | **SPe3** Veeorganismide kaitsemiseks pidada maasika koristusjārgsel kasutusel kinni mittepitsaritud pihvėrõandist 10 m pinnaveealugest | **SPe3** Mittesihtrõandit-mede kaitsemiseks pidada kinni kulunormile vastavat pihvėrõandite ja trivi vihendavate otsikute kombinatsioonist, mille leiab infolehel vastavalt tabelist | **SP1** Vāldida vahendi vōi selle pakendi vette sattumist (Seedmē pinnavee lāhedal mitte pihustada/Vāldida saastamist lābi lauda ja teede drenaaziide).

Hādaabi telefon: 112. Mūrgistusteabekeskuse lūhi-number: 16622.

Pinna- ja pōhjavee kaitse eesmārgid toote kasutamisel jārgida Põllumajandusministri 29.11.2011 mārreust nr 90 „Taimkaitsevahendi kasutamise ja hoiuhoka tūpsead nōuded“ ning Veesaadest tulevaim kasutuspõirungid.

Hoiustamine – Taimkaitsevahendit hoitakse selleks sobivas ruumis, taimekaitsevahendi vāikeks koguse puhul ka selleks ettenāhtud konteinris vōi kapis, mis on lukustatud ja millel on arģisire vire puha kutvatv hoiustamisk. Taimkaitsevahendit hoitakse arģitoidust, ravimistet ja sõõdest, et vāldida nende saastumist taimekaitsevahendiga. Hoida temperatuuril mitte alla 0°C ja mitte ūhe +35°C.

UFI: 2JHQ-9DFT-8VOK-69JK



atidaryti čia atveriet šit avad siit

L123141PBB_01

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties nomazgāt ar tekoša ūdens strūklu un ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis iekļuvis acīs, tās nekavējoties izskalot ar tekoša ūdens strūklu 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Norādījumi ārstam.

Speciāla antidota nav. Ārstēšana simptomātiska.

Saīndēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473.

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēkēt, darbojoties ar vielu. Strādājot ar preparātu lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, respiratoru, aizsargbrilles, ķīmiski izturīgus cimdus un slēgtus apavus.

Pēc darba nekavējoties novilt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi rūpīgi jānotīra-jāmazgā.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Iedarbības veids

Goltix® Gold ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds. Tas iedarbojas uz nezālēm galvenokārt caur saknēm (kā augsnes herbicīds). Tāpēc herbicīdu var lietot pirms nezāļu sadīgšanas, tādējādi nodrošinot caur augsni augsti efektīvu iedarbību uz dīgstošām nezālēm. Caur saknēm herbicīdu uzņems visas dīgstošās nezāles.

Sējumus ar Goltix® Gold var apstrādāt arī, kad jau sadīgušās nezāles. Lai panāktu labu nezāļu kontroles efektivitāti, nezālēm jābūt attīstības sākuma stadijā - dīgļlapu – pirmo īsto lapu fāzē. Produkts iedarbojas akropetāli – pa nezāļu augu audiem pārvietojas virzienā no apakšas uz augšu. Metamitrone pieder triazononu ķīmisko vielu grupai (HRAC grupa C1). Metamitrone iedarbojas uz nezālēm, kavējot fotosintēzes procesu (fotosistēmā II).

Goltix® Gold efektivitāte ar devām 0.5-1.0 L/ha

Nezāļu suga	4x0.5 L/ha	4x0.75 L/ha	3x1.0 L/ha (pēc sadīgšanas)
Rapsis-sārņaugš (<i>Brassica napus</i>)	XX	XX	XXX
Ganu plikstiņš (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	XX	XX	XX
Baltā balanda (<i>Chenopodium album</i>)	XX	XXX	X
Matuzāle ārstniecības (<i>Fumaria officinalis</i>)	XX	XX	-
Madara ķeraiņu (<i>Galium aparine</i>)	X	X	X

Nezāļu suga	4x0.5 L/ha	4x0.75 L/ha	3x1.0 L/ha (pēc sadīgšanas)
Sārtā panātre (<i>Lamium purpureum</i>)	X	XX	X
Tīruma kumelīte (<i>Matricaria inodora</i>)	X	XX	X
Dārza vējgrīķis (<i>Polygonum convolvulus</i>)	X	X	-
Virza parastā (<i>Stelaria media</i>)	XX	XXX	X
Naudulis tīruma (<i>Thlaspi arvensis</i>)	XX	XX	-
Mīkstā gandrene (<i>Geranium molle</i>)	-	-	X
Vijolīte lauka (<i>Viola arvensis</i>)	X	XX	X

XXXX efektivitāte 95–100%

XXX efektivitāte 85–94.9%

XX efektivitāte 70–84.9%

X efektivitāte 50–69.9%

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS

Ievērojiet tabulā sniegtos norādījumus.

Apstrādājami kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva L/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	pirms sadīgšanas: 0.5-1.0; pēc sadīgšanas: 0.5-1.0	<u>1.lietošanas variants</u> Apsmidzināt kultūrauga sējumu pēc sējas līdz to sadīgšanai (AS 00-09) pa nezālēm dīgļlapu līdz pirmo lapu stadijai, atkārtoti pēc jaunu nezāļu sadīgšanas līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18). Maksimālā preparāta deva sezonā 3 L/ha	-	1 reize pirms sadīgšanas un 3 reizes pēc sadīgšanas
		0.5-1.0	<u>2.lietošanas variants</u> Apsmidzināt kultūrauga sējumus pēc sadīgšanas līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18), pa nezālēm dīgļlapu līdz pirmo lapu stadijai, atkārtoti pēc jaunu nezāļu sadīgšanas. Maksimālā preparāta deva sezonā 3 L/ha	-	4
Parastās egles*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0	Apsmidzināt stādījumu agri pavasarī (aprīlis-maijs) vai rudenī (augusts-septembris), augu augstums mazāks par 50 cm	-	1

Apstrādājami kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva L/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ķīmenes* (sējas gada)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.75	<u>1.lietošanas variants</u> Apsmidzināt kultūraugu pirmo reizi pirms sadiģšanas (AS 00-09) un otro reizi pēc tā sadiģšanas līdz deviņu lapu stadijai (AS 11-19)	-	2
	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0	<u>2.lietošanas variants</u> Apsmidzināt kultūraugu pēc sadiģšanas līdz deviņu lapu stadijai (AS 11-19), nezāles līdz 2 lapu stadijai.	-	1
Ķīmenes* (ražas gadā)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.75	Apsmidzināt sējumu pavasarī līdz kultūrauga galvenās dzinums sāk izstiepties (rozete 15 cm augsta) (AS 31), nezāļu diģšanas sākumā, atkārtoti ne ātrāk kā pēc 7 dienām	60	2
Zemeses* (jaunie stādījumi)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-1.0	Apsmidzināt stādījumu 14 dienas pēc stādīšanas, pirms ziedēšanas. Atkārtoti pēc 10 dienām	-	3
Zemeses* (ražojoši stādījumi)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-1.0	Apsmidzināt stādījumu pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas. Atkārtoti pēc 10 dienām	-	3
Spināti* (sēklai)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0	Apsmidzināt kultūrauga sējumu pirms tā sadiģšanas (AS 00-09)	-	1

***Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.

Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Preparāta drošums kultūraugiem, kuri ir mazais lietojums, vispirms ieteicams pārbaudīt nelielā platībā. Ūdens daudzums: 150-400 L/ha.

SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM (TVERTNES MAISĪJUMU VEIDOŠANA)

Goltix® Gold var jaukt ar citiem herbicīdiem ar tādu pašu reģistrētu lietojumu. Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar izplatītāju vai ražotāja pārstāvi. Veicot platību apstrādi pēc nezāļu sadiģšanas, pievienot eļļu kā virsmas aktīvo vielu. Tādējādi tiks sekmēta produkta iekļūšana nezāļu lapās.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Gādājiet, lai smidzinātājs būtu tīrs un nebūtu piesārņots. Lai izsmidzināšanas tvertnē pēc apstrādes nepaliktu lieks darba šķidrums, rūpīgi aprēķiniet nepieciešamā maisījuma daudzumu. Uzpildiet 1/4 - 1/2 izsmidzināšanas tvertnes ar tīru ūdeni, sāciet maisīšanu, pievienojiet aprēķināto un nomērīto produkta daudzumu un turpiniet uzpildīt izsmidzināšanas tvertni, vienlaikus maisot, kamēr pievienojat kādu citu produktu. Turpiniet maisīt jaukšanas un apstrādes laikā. Uzpildot izsmidzināšanas tvertni, uzpildes šļūtenei vienmēr jāatrodas virs ūdens līmeņa, lai novērstu darba šķidruma atpakaļsūkšanu. Kad tiek sagatavots darba šķidrums, tas nedrīkst nonākt kanalizācijā, ūdenskrātuvēs vai ūdenstilpēs.

SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS TĪRĪŠANA

Notīriet smidzināšanas iekārtas uzreiz pēc lietošanas gan no iekšpuses, gan ārpusē.

Sāciet ar smidzinātāja iekšējo virsmu tīrīšanu:

1. Iztukšojiet smidzinātāju, izsmidzinot atlikušo darba šķidrumu turpat uz lauka.
 2. Tad piepildiet trešdaļu tvertnes ar skalošanas ūdeni un izskalojiet smidzinātāju.
 3. Izsmidziniet skalošanai izmantoto ūdeni uz kultūraugiem.
 4. Atkal uzpildiet vienu trešdaļu tvertnes ar ūdeni.
 5. Otrās skalošanas laikā pievienojiet piemērotu tīrīšanas līdzekli.
 6. Izlaidiet ūdeni ar tīrīšanas līdzekli pa visu sistēmu un iztukšojiet sistēmu.
 7. Pēdējo reizi uzpildiet vienu trešdaļu tvertnes ar ūdeni.
 8. Izlaidiet ūdeni pa visu sistēmu un iztukšojiet sistēmu.
- Turpiniet veikt smidzinātāja un traktora ārējo virsmu tīrīšanu.

REZISTENCES VEIDOŠANĀS IEROBEŽOŠANAS STARTĒGIJA

Rezistences attīstības risks pret šo produktu tiek uzskatīts par zemu vai vidēju. Darbīgā viela metamitrons pieder pie HRAC grupas C1 – fotosintēzes inhibitori fotosistēmā II (ķīmisko vielu grupa – triazinoni). Šī herbicīda atkārtota var palielināt risku, ka dažas nezāļu sugas kļūs rezistentas pret šiem savienojumiem, apgrūtinot ierobežošanu. Lai samazinātu risku, nepieciešams apgūt stratēģiju rezistences novēršanai un pārvaldīšanai.

Audzētājiem ieteicams lietot herbicīdus, pamīšus izmantojot dažādas metodes, vai tvertnes maisījumu, kurā ir divas vai vairāk aktīvās vielas, kas iedarbojas uz attiecīgajām nezālēm. Nezāļu sugām, kuras ir visgrūtāk ierobežot, lietojiet Goltix® Gold, apstrādi veicot nezāļu efektīvai kontrolei vispiemērotākajā laikā. Šī metode jālieto kopā ar pareizu augmaiņu un augsnes apstrādes metodēm, piem., izmantojot cietas sēklas gultnes paņēmienu, kultivāciju un neselektīvu herbicīdu izmantošanu pirmssējās.

Detalizētākus ieteikumus par nezāļu rezistences pārvaldību var saņemt no Herbicīdu rezistences rīcības komisijas (Herbicide Resistance Action Group (HRAC)) un Nezāļu rezistences rīcības grupas (Weed Resistance Action Group (WRAG)). Ievērojiet WRAG vadlīnijas.

ATKĀRTOTA SĒJA UN PĒCKULTŪRAS

Ja cukurbiešu sējums kāda iemesla dēļ ir gājis bojā, tad tad tajā pašā gadā var sēt: ja zeme netiek apstrādāta, atkārtoti sēt var tikai kukurbitēs un lopbarības bietes;

- ja zeme tiek uzarta, var audzēt kukurūzu un kartupeļus;
- uzarot zemi un nogaidot divus mēnešus, var sēt zālājus sēklai.

Rudenī ziemājus var sēt tajā pašā sezonā, ja pēc pēdējās apstrādes ar Goltix® Gold ir pagājušas 16 nedēļas. Nākamajā sezonā pēc Goltix® Gold lietošanas kultūraugus var sēt bez ierobežojumiem.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Pēc iepakojuma iztukšošanas to nekavējoties izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes un skalojamo ūdeni izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot citām vajadzībām. Tukšais iepakojums jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsildzamās telpās, bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – laika, augšnes nestākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē sava preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz preparāta piemērošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā preparāta glabāšana un darbs ar to ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs. Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepareizas uzglabāšanas vai lietošanas rezultātā.

LIETUVA

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

Goltix® Gold yra selektyvus veikimo sisteminis herbicidas, skirtas naikinti vienametes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles prieš ir po jų sudygimo. Goltix® Gold sudėtyje esanti triazinonų grupės veiklioji medžiaga metamitronas, pagal HRAC priskiriamas C1 grupei, slopina fotosintezę II fotosistemoje. Metamitronas įsisavinamas per šaknis ir žaliąsias augalo dalis, ir išnešiojamas po visų augalų, per kelias dienas piktžolės pabyla, atsiranda nekrotinės dėmės, piktžolės nuvyšta.

NAUDOJIMO NORMA IR LAIKAS

Augalai	Purškimų skaičius	Intervalas tarp purškimų	Norma (L/ha)	Vandens kiekis (L/ha)	Augalo augimo tarpsnis	Pastabos
Cukriniai runkeliai, pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai	1 – 2	7 dienos	0,5 - 2 (ne daugiau kaip 3 L/ha per sezoną)	200-400	Prieš sudygimą: BBCH 00-09 Po sėjos iki antžeminės augalo dalies pasirodymo. Po sudygimo: BBCH 10-18 Nuo skilčialapių tarpsnio iki 4 ir daugiau porų lapelių išsiskleidę.	1 kartą prieš sudygimą, antrą kartą po sudygimo Norma prieš sudygimą: 0,5-2 L/ha Norma po sudygimo: 0,5-1,0 L/ha Didžiausia norma per sezoną 3 L/ha
Cukriniai runkeliai, pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai	3	7 dienos	1,0	200-400	Prieš sudygimą: BBCH 00-09 Po sėjos iki antžeminės augalo dalie pasirodymo. Po sudygimo: BBCH 10-18 Nuo skilčialapių tarpsnio iki 4 ir daugiau porų lapelių išsiskleidę.	1 kartą prieš sudygimą, antrą ir trečią kartus po sudygimo Didžiausia norma per sezoną 3 L/ha

Augalai	Purškimų skaičius	Intervalas tarp purškimų	Norma (L/ha)	Vandens kiekis (L/ha)	Augalo augimo tarpsnis	Pastabos
Cukriniai runkeliai, pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai	4	7 dienos	0,75	200-400	Prieš sudygimą: BBCH 00-09 Po sėjos iki antžeminės augalo dalie pasiro- dymo. Po sudygimo: BBCH 10-18 Nuo skičialapių tarp- snio iki 4 ir daugiau porų lapelių išsiskleidę.	1 kartą prieš sudy- gimą, kitus kartus po sudygimo Didžiausia norma per sezoną 3 L/ha
Dekoratyviųjų augalų daigynai Dekoratyviniai augalai (medžiai ir krūmai) Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynuose	1	-	1,0	200-400	Purkšti tarpueilius augalų ramybės metu, birželio – rugpjūčio mėn., apsaugant au- galus	
Eglučių sodinukai (<i>Picea abies</i>)	1	-	1,0	150-400	Purkšti balandžio-ge- gužės arba rug- pjūčio-spalio mėn.	Didžiausia norma per sezoną 1 L/ha
Krūmai 1-ais sėjos metais	1	-	1,5	200-400	Purkšti balandžio- rugspjūčio mėn. Po sėjos iki sudygimo BBCH 00-08 arba nuo išsiskleidusių pirmųjų Lapelių tarpsnio iki iš- siskleidę 9 lapeliai BBCH 11-19	Piktžolėms esant ne vėlesniam nei BBCH 12 tarpsnyje, kai piktžolės turi 2 tikruosius lapelius Didžiausia norma sezonui 1.5 L/ha
Krūmai 2-ais metais	1	-	1,5	200-400	Purkšti gegužės mėn., prieš stiebo pailgėjimą, kai augalo aukštis ne daugiau kaip 15 cm (vėliausiai BBCH 31 – stiebo ilgėjimo pradžia, matomos stiebo užuomazgos)	Piktžolėms esant ne vėlesniam nei BBCH 12 tarpsnyje, kai piktžolės turi 2 tikruosius lapelius.
Naujai įveistas braškynas	1	-	1,75	200-300	Purkšti balandžio – birželio mėn. 14 dienų po sodinimo, prieš žydėjimą	
Derančios braškės	1	-	1,75	200-300	Purkšti balandžio – birželio mėn., prieš žydėjimą	

Augalai	Purškimų skaičius	Intervalas tarp purškimų	Norma (L/ha)	Vandens kiekis (L/ha)	Augalo augimo tarpsnis	Pastabos
Sėkliniai špinatai	1	-	1,0	100-400	Purkšti pavasarį, prieš sudygimą, 1-2 dienos po sėjos	

Laikotarpis nuo paskutinio purškimo iki **kmyņu** derliaus ėmimo - ne mažiau kaip **60** dienų.

Dėmesio!

Cukrinius runkelius, pašarinius runkelius valgomuosius burokėlius galima purkšti naudojant vieną iš 3-jų purškimo schemų, neviršijant didžiausios 3,0 L/ha normos per sezoną

PIKTŽOLIŲ JAUTRUMAS

Piktžolių jautrumas	Veiksmingumas	Piktžolės, purškiant prieš sudygimą	Piktžolės, purškiant po sudygimo
Labai jautrios piktžolės	95-100 %	Raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>)	Bekvapis šunramenis (<i>Tripleurospermum inodorum</i>)
Jautrios piktžolės	85-94.9 %	Dirvinis garstukas (<i>Sinapis arvensis</i>)	Rapsų pabiros (<i>Brassica napus</i>), vaistinė žvirbliarūtė (<i>Fumaria officinalis</i>)
Vidutiniškai jautrios piktžolės	70-84.9%	Triketė žvaginė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) baltoji balanda (<i>Chenopodium album</i>) dėmėtasis rūgtis (<i>Persicaria maculosa</i>)	Triketė žvaginė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) švelnusis snaputis (<i>Geranium molle</i>) raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>)
Vidutiniškai atsparios piktžolės	50-69.9%	Vijoklinis pelėvirkštis (<i>Fallopia convolvulus</i>), daržinė žliugė (<i>Stellaria media</i>)	Baltoji balanda (<i>Chenopodium album</i>), daržinė žliugė (<i>Stellaria media</i>), dirvinė našlaitė (<i>Viola arvensis</i>)

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Goltix® Gold efektyviausias kai piktžolės yra mažos ir aktyviai auga.

MAŽOS APIMTIES NAUDOJIMAS

Goltix® Gold naudojimas braškėse, sėkliniuose špinatuose, kmynuose, dekoratyvinių augalų daigynuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenų medelynuose, dekoratyviniuose medžiuose ir krūmuose, eglių sodinukuose išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ

Gamintojas neatsako už produkto veiksmingumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.

SĖJOMAINA

Panaudojus Goltix® Gold, kitą sezoną gali būti sėjami visi augalai.

Jei dėl kokių nors priežasčių Goltix® Gold apdorotas cukrinių runkelių pasėlis žūsta, tais pačiais metais galima sėti:

- be dirvos dirbimo atsėti galima tik cukrinius arba pašarinius runkelius;
- po arimo gali būti sėjami kukurūzai ir arba sodinamos bulvės;
- po arimo ir po 2 mėnesių laikotarpio galima sėti žolę sėklai.

Žemieniai javai gali būti sėjami tą patį sezoną, jeigu praėjo 16 savaičių nuo paskutinio purškimo Goltix® Gold.

MIŠINIAI

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į registracijos savininko atstovus Lietuvoje. Goltix® Gold mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Veikloji medžiaga metamitronas priklauso HRAC grupei C1 – fotosintezės inhibitoriams II fotosistemoje (cheminė grupė – triazinonai). Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti piktžolių, natūraliai atsparių C1 grupės herbicidams.

Pakartotinis to paties veikimo herbicidų naudojimas gali padidinti piktžolių atsparumo išsivystymo riziką, todėl herbicido veiksmingumas gali sumažėti. Siekiant sumažinti riziką, reikėtų taikyti atsparumo prevencijos ir valdymo strategiją.

- Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą.
- Mišiniuose, paėliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.
- Naudokite rekomenduojamą Goltix® Gold normą ir tinkamu laiku, ypač sunkiai kontroliuojamoms piktžolių rūšims.
- Naudokite agrotechnines piktžolių kontrolės priemones: sėjomainą, gilų dirvos dirbimą.

Daugiau rekomendacijų apie piktžolių atsparumo valdymą galima rasti Atsparumo herbicidams veiksmų grupės (HRAC) ir Piktžolių atsparumo veiksmų grupės (WRAG) informacinėse sistemose.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

PURŠKIMO TECHNIKA IR PURŠKIMAS

Naudojimui rekomenduojami traktoriniai purkštuvai.

Prieš naudojant, darbo įranga turi būti tinkamai kalibruota, nustatytas tinkamas judėjimo greitis, slėgis ir purškiamo tirpalo paskirstymo tolygumas.

PURŠKIAMO TIRPALO PARUOŠIMAS

Tirpalas ruošiamas prieš pradėdant apdorėjimo augalų apsaugos produktais darbus. Prieš pradėdant ruošti tirpalą, įsitikinkite, kad purkštuvus yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiems augalams purškėti. Tiksliai apskaičiuokite reikalingą tirpalo kiekį, kad po purškimo purkštuve neliktų neišpurkšto tirpalo likučių. Prieš atidarant pakuotę, produktą gerai suplakite. Po to 1/4-1/2 purkštuvo talpos pripildykite švari vandeniu, įjunkite maišytuvą, supilkite apskaičiuotą reikalingą produkto kiekį, tada supilkite į maišytuvą kitus produktus. Siekiant išlaikyti vienodą purškimo mišinio sudėtį, maišymą tęskite ir purškimo metu. Pildant purkštuvo talpą, vamzdis visada turi būti virš vandens, kad tirpalas neišbėgtų iš talpos.

PURŠKIMO ĮRANGOS PLOVIMAS

Baigus purškėti, purškimo įranga turi būti iš karto gerai išplauta.

1. Pradžią išplaukite purkštuvo talpos vidų:

1. Produkto likučius išpurškite ant Goltix® Gold nupurkštų augalų
2. Trečdalį purkštuvo užpildykite švari vandeniu ir išskalaukite.
3. Išpurškite skystį ant jau nupurkštų augalų.
4. Trečdalį purkštuvo vėl užpildykite švari vandeniu.
5. Įpilkite plovimui skirtą priemonę, kad išskalauti antrą kartą.
6. Išskalaukite purkštuvą ir išpurškite skystį ant Goltix® Gold nupurkštų augalų.
7. Užpildykite trečdalį purkštuvo vandeniu trečią kartą.
8. Išskalaukite purkštuvą ir išpurškite skystį Goltix® Gold nupurkštų augalų.

Baigus plauti purkštuvo talpos vidų, nuplaukite išorę ir patį purkštuvą.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt.

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvu priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgus kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis arba kombinezoną bei rekomenduojama avėti sandarius batus ir mėvėti pirštines.

Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 10 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo

(miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiumi, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigrubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

SAUGOJIMAS

Produktą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto produktų, vandens ir pašarų, ne aukštesnėje kaip +35°C ir ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Toimemehhanism

Metamitroon kuulub HRAC klassifikatsiooni järgi 5 gruppi. Toimeviisiks on fotosünteesi pärssimine fotosüsteemis II. Metamitroon kuulub triasinoonide keemilisse gruppi. Metamitroonil on efekt nii mulla kui ka lehtede kaudu mõjudes. Enamasti imendub taimekaitsevahend juurte kaudu, kuid mõju avaldub ka lehtede kaudu, misjärel levib preparaat taimes laiali.

Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni kulunormile vastavast puhvervööndite ja triivi vähendavate otsakute kombinatsioonist.

Mittepritsitav puhvervöönd meetrites				
Kasutusala ja ühekordne kulunorm	Triivi vähendavate otsakuteta	Triivi vähendavate otsakutega		
		50%	75%	90%
Punapeet, suhkrupeet, söödapeet 0,5-2 l/ha	5	-	-	-
Taimlad (ilutaimed ja puukultuurid) 2-3 l/ha	5	-	-	-
Ilupuud ja -pöösad 3 l/ha	5	-	-	-
Metsataimla kuusk (<i>Picea abies</i>) 1 l/ha	5	-	-	-
Köömen 0,75-2 l/ha	5	-	-	-
Maasikas 1,75 l/ha	5	-	-	-
Maasikas alla 1,75 l/ha	-	-	-	-
Peulill 0,5-2 l/ha	5	-	-	-
Spinat seemneks 1 l/ha	-	-	-	-

Taimekaitsevahendi täpsemateks kasutustingimusteks järgi allpool olevas tabelis toodud juhiseid.

Kultuur	Umbrohud	Pritsimiskordade arv	Minimaalne pritsimiskordade vaheline intervall (päevades)	Kulunorm pritsimiskorra kohta (L/ha)	Veekogus (L/ha)	Kultuuritaim kasvufaas	Märkused
Suhkrupeet, söödapeet, punapeet	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1 - 4	7	0,5 - 2	200-400	Tärgamiseseelselt: BBCH 00-09 (külvist kuni idanemise lõpuni) Tärgamisjärgselt: BBCH 10-18 (idulehtede ilmumisest maapinnale kuni 8 leheni)	Maksimaalselt 4 korda hooaja jooksul: 1x tärgamiseseelselt + 3x tärgamisjärgselt või 4x tärgamisjärgselt. Doos tärgamiseseelselt: 0,5-2 L/ha Tärgamisjärgselt: 0,5-1 L/ha Maksimaalne kulunorm hooaja jooksul kokku on 3 L/ha
Taimlad (ilutaimed ja puukultuurid)	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1	-	2 - 3	200-400	Taimed puhkeajas või varjestatud pihustamine ridade vahele	Väikese kasvupinnaga kultuur
Ilupuud ja põõsad	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1	-	3	200-400	Taimed puhkeajas või varjestatud pihustamine ridade vahele	Väikese kasvupinnaga kultuur
Metsataimla kuusk (<i>Picea abies</i>)	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1 - 3	7	1	150-400	Aprill-mai, august-oktoober	Väikese kasvupinnaga kultuur Maksimaalne kulunorm hooaja jooksul on 3 L/ha

Kultuur	Umbrohud	Pritsimiskordade arv	Minimaalne pritsimiskordade vaheline intervall (päevades)	Kulunorm pritsimiskorra kohta (L/ha)	Veekogus (L/ha)	Kultuurtaime kasvufaas	Märkused
Köömen (külviaastal)	lühiajalised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1 - 2	14	0.75 - 1.5	200-400	Aprill-august/ esimene tööt-luskord BBCH 00-08 (külvist kuni iduvarre kasvamiseni mullapinnani) Teine tööt-luskord BBCH 11-19 (esimesest pärislehest kuni üheksa pärisleheni) esimesel kasvuaastal	Väikese kasvupinnaga kultuur Viimane pritsimisaeg on augusti lõpp, pritsida kui umbrohud on maksimaalselt kasvufaasis BBCH 12 (kuni 2 pärislehte või pärislehepaari on lahti rullunud) Maksimaalne kogus hooaja jooksul on 3 L/ha
Köömen (külviaastal)	lühiajalised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1	-	2	200-400	Aprill-august/ BBCH 11-19 (esimesest pärislehest kuni üheksa pärisleheni) esimesel külviaastal	Väikese kasvupinnaga kultuur Viimane pritsimisaeg on augusti lõpp, pritsida kui umbrohud on maksimaalselt kasvufaasis BBCH 12 (kuni 2 pärislehte või pärislehepaari on lahti rullunud)

Kultuur	Umbrohud	Pritsimiskordade arv	Minimaalne pritsimiskordade vaheline intervall (päevades)	Kulunorm pritsimiskorra kohta (L/ha)	Veekogus (L/ha)	Kultuuritaim kasvufaas	Märkused
Köömen (koristusasaatal)	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1 - 2	7	0.75 - 1.5	200-400	Mai/mai koristusaastal; jaotatud pritsimine enne peavarre pikkuskasvu, maksimaalseks kõrguseks 15 cm maikuu jooksul	Väikese kasvupinnaga kultuur Viimane pritsimisega on kui umbrohtudel on kasvufaas BBCH 12 (kuni 2 pärislehte või pärislehepaari on lahti rullunud), Oot-eeg tuleneb pritsimise ajast: mai lõpus pritsimise korral tohib koristada alles juuli lõpus Maksimaalne kogus hooaja jooksul on 3 L/ha
Maasikas, äsja istutatud põllul	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1	-	1.75	200-300	Aprill-juuni Pritsimine 14 päeva pärast istutamist, kuid enne õitsemist	Väikese kasvupinnaga kultuur
Maasikas, teisel ja enamal kasvuaastal	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1	-	1.75	200-300	Aprill-oktoober Pritsimine kas enne õitsemist või pärast saagi koristust	Väikese kasvupinnaga kultuur
Maasikas, äsja istutatud põllul	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1 - 3	10	0.5 - 1	200-300	Aprill-juuni Pritsimine 14 päeva pärast istutamist, kuid enne õitsemist	Väikese kasvupinnaga kultuur Maksimaalne kogus hooaja jooksul on 3 L/ha

Kultuur	Umbrohud	Pritsimiskordade arv	Minimaalne pritsimiskordade vaheline intervall (päevades)	Kulunorm pritsimiskorra kohta (L/ha)	Veekogus (L/ha)	Kultuurtaime kasvufaas	Märkused
Maasikas, teisel ja enamal kasvuaastal	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1 - 3	10	0.5 - 1	200-300	Aprill-oktoober Pritsimine kas enne õitsemist või pärast saagi koristust	Väikese kasvupinnaga kultuur Maksimaalne kogus hooaja jooksul on 3 L/ha
Peulill	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1 - 3	5	0.5 - 2	300-500	Tärgkamisjärgselt: kasvufaasis BBCH 13-39 (kolmest pärislehest kuni vars on saavutanud täispikuse)	Väikese kasvupinnaga kultuur Kõrgeimat doosi kasutada kui umbrohtudel on arenenud rohkem kui 2-4 lehte Maksimaalne kogus hooaja jooksul on 3 L/ha
Spinat seemnaks	lühiealised kahe- ja üheidulehelised umbrohud	1	-	1	100-400	Tärgamiseelset kasvufaasis BBCH 00-09 (külvist kuni idulehede tungimiseni mullapinnale)	Väikese kasvupinnaga kultuur

RESISTENTSUSE OHT

Selle toote resistentsuse riski loetakse madalaks kuni keskmiseks. Toimeaine metamitroon kuulub HRAC klassifikatsiooni järgi 5 gruppi - inhibiitor fotosünteesi pärssimiseks fotosüsteemis II (keemiline grupp – triasoonid). Sama toimeviisiga herbitsiidide korduvkasutamisel võib suurene da resistentsete umbrohtude tekkimise oht, mis võib viia vähese efektiivsuse ni umbrohtude üle.

Tootjatele soovitatakse kasutada erineva toimeviisiga herbitsiidide kas erinevate pritsimistena või paagiseguna, kus kaks või enam komponenti on efektiivsed sihtumbrohtude vastu. Kasutage Goltix® Gold'i soovitatud kulunorme ning etiketil märgitud pritsimisaeagu, et tagada hea tulemus raskesti tõrjutavate umbrohtude üle. Ülaloodud tuleks kasutada koos viljavahelduse ning viljelussüsteemi rakendamisega nt. varane külv, kasvatamine ja mitteselektiivsete herbitsiidide kasutamine enne külv.

Täiendavaid juhendeid umbrohtude resistentsuse ohjamise kohta saab Herbitsiidiresistentsuse tegevusrühma (HRAC) ja umbrohutõrje tegevusrühma (WRAG) kodulehelt. Järgige WRAG'i juhiseid.

TAARA KÄITLEMINE

Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusveit valada taimekaitsevahendi paaki või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduvkasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

OPTIMAALSED TINGIMUSED UMBROHTUDE KONTROLLIKS

Parim efektiivsus Goltix® Gold'iga saavutatakse kui umbrohud on väikesed ja aktiivse kasvuga.

VILJAVAHELDUS

Peale Goltix® Gold'i kasutamist võib järgnevaid kultuure külvata ilma piiranguteta. Siiski, kui suhkrupeedi, söödapeedi või punapeedi kasvatamine ebaõnnestus, on ainsad võimalused järgnevad:

- Ilma mullaharimiseta võib külvata vaid suhkru- või söödapeeti;
- Peale külvamist võib külvata maisi või kartulit;
- Peale külvamist ning peale 2 kuulist ooteperioodi võib külvata heintaimi seemnekasvatuseks.

Taliteravilju võib külvata samal hooajal, kuid viimase Goltix® Gold'i kasutamise ja külvamise vahele peab jääma 16 nädalat.

Mistahes suvikultuure võib külvata Goltix® Gold'i kasutamisele järgneval aastal.

KASUTUSVIIS

Enne kasutamist tuleb kõik pritsi osad nõuetekohaselt kalibreerida, arvestades taimekaitsetöökasutatavat liikumiskiirust, kulunormi ja jaotuse ühtlikkust. Pritsi tuulevaikse ilmaga (tuule kiirus maks. 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Hoiduda preparaadi pritsimisest kõrgetel temperatuuridel (üle +25°C) ja intensiivses päikesevalguses.

PAAGISEGUD

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust tootja, edasimüüja või nõustajaga.

PRITSI PUHASTAMINE

Tühjenda paak. Pärast kasutamist pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel väldi maapinna, pinna- ja põhjavee reostumist. Pritsipaak tühjendada töödeldud alale või spetsiaalsesse mahutisse.

PAKENDI PURUNEMISEL

Välja voolanud preparaati katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu on täielikult läbi imunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

HOIUSTAMINE

Taimekaitsevahendit hoitakse selleks sobivas ruumis, taimekaitsevahendi väikese koguse puhul ka selleks ettenähtud konteineris või kapis, mis on lukustatud ja millel on mürgise aine puhul kasutatav hoiatusmärk. Taimekaitsevahendit hoitakse eraldi toidust, ravimitest ja söödast, et vältida nende saastumist taimekaitsevahendiga. Hoida temperatuuril mitte alla 0°C ja mitte üle +35°C. Hoiukoha täpsemad nõuded on välja toodud Põllumajandusministri 29.11.2011 määruses nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“.

Säilivusaeg originaalpakendis 2 a.

JURIIDILINE VASTUTUS

Tootja ei vastuta ettenägematute tingimuste eest, nagu ilmastikutingimused, hilinenud ümbertöötlus, pinnasetüüp, kasutamismeetod ja muud asjaolud, mis võivad preparaadi toimet mõjutada. Tootja ei vastuta ka kahjustuste eest, mis on tekkinud hooletuse või preparaadi ebaõige kasutamise tagajärjel. Preparaadi kvaliteet on tagatud vaid juhul, kui see ostetakse ja seda säilitatakse suletud originaalpakendis.



GOLTIX[®] GOLD



ADAMA

©Adama Quena N.V.



HERBICĪDS/HERBICIDAS/HERBITSIID

suspensijas koncentrāts/
koncentruota suspensija/
suspensiooikonsentraat (SC)



Darbīgā viela/Veikloji medžiaga/Toimeaine

metamitrons/metamitronas/metamitroon . 700 g/L (58.3% w/w)



Informācija / Informacija / Informatsioon

LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0851
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas Nr. un izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā, oriģinālā iepakojumā
Pārstāvniecība Latvijā:
Tālr.: +371 2 729 33 30

Ražotājs, tā adrese/
Gamintojas/Tootja/
pakudajaja:
ADAMA AĢAN Ltd.
P. O. Box 262
77102 Ashdod
Izraēla/Izraelis/lisrael

LIETUVA

Registracijos numeris: AS2-90H(2020)
Partijos numeris ir pagaminimo data: žiūrėti ant pakuočės
Galiojimo laikas: 2 metai
Atstovas Lietuvoje:
Tel.: +370 85 210 86 22

EESTI

Eesti reg. nr.: 868/19.01.24
Partii nr. ja valmistamise kuupaev: vaata pakendit
Säilivusaeg: 2 aastat

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese /
Registrācijas savinikas /
Registreerimise haldaja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Niederlande/Nyderlandai/
Madalmaal/
Tālr./Tel.:
+31 (0)33 205 68 00
www.adama.com

LATVIJA

Goltix® Gold – Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divlappuļņu nezāļu ierobežošanai cukurbietu, lopbarības biešu, gada biešu, ķimeņu un spinātu (sēkļa) sējumos, parastās egles un zemeņu stādījumos.

H302 Kaitīgs, ja norij • **H411** Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām • **EUH208** Satur 1,2-benzisotiazolīn-3-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju • **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un vidi, ievērojiet lietošanas pamācību • **P280** Izmantot aizsargcimdus / aizsargdrēbes/ acu aizsargus/sejas aizsargus • **P301-P312** NORISĀNAS GADĪJUMA: sazināties ar SAINĒSĀNAS INFORMĀCIJASCENTRU/ārstu, ja jums ir sliktā pašajūta • **P330** Izskalot muti • **P391** Savākt izsīksto šķidrumu • **P501** Atbrīvoties no satura/švertes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • **SP1** Nepiesāņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsgāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem • **SP3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā zīnāt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112

Uzglabāšana – Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās, bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +35 °C.

LIETUVA

Goltix® Gold – yra selektyvus, sisteminio poveikio herbicidas, skirtas viena metų ir kai kurioms daugiamečiams dviskelėms piktžolėms naikinti cukrinių runkelių, pašarinių runkelių, valgomųjų burokėlių pasėliuose.

Goltix® Gold naudojimas broksėse, sėkliniuose spinatuose, krynuose, dekoratyvinių augalų daigynuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenų medelynuose, dekoratyviniuose medžiuose ir krūmuose, eglių sodinukuose išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.
Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Kenksminga prarijus • Toksiška vandens organizmams, sukelti ilgalaikis pakitimas • Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazolīn-3-ono. Gali sukelti alerģinę reakciją • 8 procentus mišinio sudaro, nežinomo ūmus toksikumo kėvėpus, sudedamosios dalys • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus • Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas kūno vietas • Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakuočė (neplauti purškimo ir įrenginių šalia paviršinio vandens telkinii / vengti taršos per drenąžą iš sodybu ar nuo keliu) • Surinkti ištekejusią medžiagą • Telpyklę šalinti pagal nacionalines teisės aktų reikalavimus • Siekiant apsaugoti paviršinio asmenis ir gyventojus, operatoriai privalo laikytis ne mažesnes kaip 10 metrų apsaugos zonos iki keliu kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos ir privalo naudoti dulksnį mažinančią įrangą, purškiant kėmyus, broksėse • Siekiant apsaugoti paviršinio asmenis ir gyventojus, operatoriai privalo laikytis ne mažesnes kaip 5 metrų apsaugos zonos iki keliu kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos ir privalo naudoti dulksnį mažinančią įrangą purškiant cukrinių runkeliu, pašarinių runkeliu, valgomųjų burokėliu, sėklinii spinātu pasėliuose, dekoratyviniuose medžius ir krūmus, eglių sodinuku, purškiant dekoratyviniuose augalus daigynuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenis medelynuose • Siekiant apsaugoti požemini vandeni, nenaudoti šie ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metamitrono dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke • Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkiniu ir melioracijos griovių • Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti apsaugos zoną 5 metrus iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba naudoti 50 proc. dulksnį mažinančius purškukus.

Apnuodijimo atveju kreiptis į Apnuodijimų kontrolės informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Sandėlavimas – Produktą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto produktų, vandens ir pašaru, ne aukštesnėje kaip +35°C ir ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

EESTI

Goltix® Gold on laia toimespektiga herbitsiid kaheiduleheliste ja mõningate üheiduleheliste imbrohtude tõrjeks suhkrupeedil, söödapeedil, punapeedil, taimetes, dekoratiivtaimedel, metsanduses, maasikatel, kõmmel, seemnecs kasvataval spinatil ning peiulillel.

Goltix® Goldi võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Enne taimekaitsevahendi kasutamist loe hoolikalt toote etiketti.

Goltix® Gold on suspensiooikonsentraat, mis sisaldab 700 g/L kahta metamitroni. Toode on mēeldud külviseleks ja külvijärgseks ühe- ja kaheiduleheliste imbrohtude tõrjeks.

H302 Allaneelamisel kahjulik • **H411** Inimeste tervisele ja keskkonna õhustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit • **EUH208** Sisaldab 1,2-benzisotiazolīn-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni • **H411** Mürğine veorgansmidel, pikaajaline toime • **P280** Pärast käitlemist pesta hoolega vahendiga kokkupuutunud kehaosi • **P270** Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada • **P301+P312+P330** ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGIISTEABEKESKUSEGA või arstiga. Loputada suud • **P280** Kanda kaitsekindaid • **P391** Mahavoolanud toode kokku koguda • **SP3** Veorgansmidel kaitsmiseks pidada maosika koristusjärgsel kasutusel kinni mittetõrjast puhvervööndist 10 m pinnaseveekogudest • **SP3** Mittesilmamärkatimede kaitsmiseks pidada kinni kulunorime vastavast puhvervööndite ja triivi vähevandade otsikute kombinatsioonist, mille leiab infolehel vastavast tabelist • **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vabest sattumist (Seadmeid pinnaveelähedal mitte puhvata/Vältida saastumist läbi lauda ja teede drenaažide).

Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber: 16662.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendit kasutamise ja hoiukoha täpsema nõude“ ning Veesaaduse tulenevat kasutuspiiranguid.

Hoiustamine – Taimekaitsevahendit hoitakse selleks sobivas ruumis, taimekaitsevahendi väikese koguse puhul ka selleks ettenähtud konteineris või kapis, mis on lukustatud ja millel on mürgise aine puhul kasutatav hoiutusmärk. Taimekaitsevahendit hoitakse eraldi toidust, ravimist ja söödast, et vältida nende saastumist taimekaitsevahendiga. Hoida temperatuuril mitte alla 0°C ja mitte üle +35°C.



UZMANĪBU
ATSARGIAI
HOIATUS

4 x 5 L

UN3082
8 718077 013527

GRUPA
GRUPĒ
GRUPP

5

HERBICĪDS
HERBICIDAS
HERBITSIID



SKALAUK TEISINGAI

112710C0FCR 101



GOLTIX[®] GOLD



ADAMA



LATVIJA



LIETUVA



EESTI



UZMANĪBU/ATSARGIAI/HOIATUS



UN3082

LJ2314PAAR_01

30 x 20 L