

**Goltix® 700 SC**  
**Taimekaitsevahend**  
**Herbitsiid**

**Preparaadi vorm:** suspensioonikonsentraat

**Toimeaine:** metamiitroon 700 g/l

**Registreerimise number:** 0206/28.02.01

**Valmistamise kuupäev ja partii nr:** vaata pakendil

Herbitsiid lühiealiste kaheiduleheliste ja mõningate üheiduleheliste umbrohtude tõrjeks suhkru-, sööda- ja punasel peedil.

**Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuurile: harilik kuusk puukoolides kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks.**

**NB! Kuna Goltix® 700 SC on laiendatud kasutamiseks harilikule kuusele Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 51 alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.**

Goltix® 700 SC võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

**Pakendid: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l**



**Hoiatus**

- H302** Allaneelamisel kahjulik.
- H410** Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
- P102** Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- P264** Pärast käitlemist pesta hoolega käsi
- P270** Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
- P301+P312** **ALLANEELAMISE KORRAL:** Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
- P330** Loputada suud.
- P391** Mahavoolanud toode kokku koguda.
- P501** Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
- EUH208** Sisaldab chloro-2-methyl-2H-isothiazolin-3-on ja 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.
- EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
- SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

**Registreeringu hoidja:**

ADAMA Registrations B.V.  
P.O. Box 355  
NL-3830 AK Leusden, Madalmaad  
Tel.: +31 33 4453160  
www.adama.com

**Tootja/pakendaja:**

ADAMA Agan Ltd  
P.O. Box 262, Ashdod  
77100 Iisrael

**Maaletooja ja turustaja:****AS Baltic Agro**

Peterburi tee 44  
11415 Tallin  
Estonia  
Tel.: +372 606 2260

**Scandagra Eesti AS**

Tähe 13 Viljandi,  
71012 Estonia  
Tel.: +372 479 6166  
info@scandagra.ee  
www.scandagra.ee

**Litagra OÜ**

Aardla 25 E,  
50110 Tartu, Estonia  
Tel.: +372 7366 796

**ETTEVAATUSABINÕUD**

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.  
Kahjulik allaneelamisel  
Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet.

**KESKKONNAOHTLIKKUS**

Vältida preparaadi sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.  
Preparaati ei tohi kasutada ega töövahendeid puhastada veekogude lähedal. Pritsi ei tohi pesta lähemal kui 50 m veekogust.

**ESMAABI**

Viia kannatanu ohutsoonist eemale. Teadvusekaotuse ohu puhul asetada/transportida stabiilses, külili asendis. Eemaldada kohe preparaadiga kokkupuutunud või läbiimbnud riided.

**Kokkupuutel nahaga:** Preparaadi nahale sattumisel pesta koheselt vee ja seebiga.

**Silma sattumisel:** Loputada kiiresti voolava vee all 15 minutit (silmalaud avatult).

**Allaneelamisel:** Loputada suud puhta veega. Mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda viivitamatult arsti poole.

**Sissehingamisel:** viia kannatanu värske õhu kätte ning lasta tal puhata. Halva enesetunde korral pöörduda koheselt arsti poole.

Ravi: sümptomaatiline, spetsiifilist antitoodi ei ole teada.

**HOIUSTAMINE**

Säilitada temperatuuril mitte alla  $-10^{\circ}\text{C}$  ja üle  $35^{\circ}\text{C}$

Säilitada originaalpakendis, tihedalt suletuna, varustatuna etiketiga, ohutus, jahedas, kuivas, hästiventileeritavas lukustatud kohas.

Mitte laduda konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kahjustamist.

Säilivusaeg originaalpakendis 2 a.

### TAARA KAHJUSTUMINE

Pakendi korduvkasutamine keelatud. Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Kasutatud pakendid koguda kokku ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

### KASUTUSJUHEND

Goltix® 700 SC on laia toimespektriga herbitsiid, mis on mõeldud lühiealiste kaheiduleheliste ja mõnede üheiduleheliste umbrohtude hävitamiseks suhkru-, sööda- ja söögipeedi kultuurides ning lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks dekoratiivsete kuusesemikute puukoolis.

Goltix® 700 SC-le on omane pikaajaline mõju, sest see toimib umbrohu lehtede ja mulla kaudu. Tänu väga madalale fütotoksilisusele võib seda kasutada peaaegu igas suhkrupeedi arengufaasis. Tulemused on parimad siis, kui muld on piisavalt niiske ja õhutemperatuur on üle +15 °C. Huumusmullas kasvava suhkru- ja söödapeedi pritsimisel on väga oluline mitte jääda hiljaks esimese pritsimisega.

Ärge pritsige, kui ennustatakse külma tulekut või üle +22 °C temperatuuri või kui öösel ja päeval on suured temperatuuri kõikumised, kõrge päikesevalguse intensiivsus või kui suhkrupeed on kahjustatud haigustest ja kahjuritest.

Taimed	Registreeritud pihustusmäär l/ha	Pihustusaeg
Suhkru- ja söödapeet (BBCH10-18)	0,5-1,5	Goltix® 700 SC-d pihustatakse 1-4 korda. Esimest korda pihustatakse siis, kui umbrohud on idulehe kasvufaasis sõltumata suhkru- või söödapeedi arengufaasist. Teine, kolmas ja neljas kord – mitte varem kui 7-10 päeva peale eelmist pritsimist, kui ilmuvad uued umbrohud.
Söögipeet (BBCH10-18)	0,75-1,5	Pihustatakse siis, kui söögipeet on 2 pärislehe kasvufaasis ja umbrohul on 2-4 pärislehte. Kui peedi seemikud on nõrgad, siis on parem oodata, kuni need muutuvad tugevamateks.

**Suurim pritsimiskordade arv:** suhkru- ja söödapeet, söögipeet - 4 korda.

**Suurim pritsimiskordade arv:** dekoratiivsed kuusesemikud - 3 korda.

**Pritsimistevaheline intervall:** vähemalt 7 päeva.

**Maksimaalne määr ühe hooaja kohta:** 3 l/ha (2,1 kg metamitrooni/ha).

**Tööoode:** 1 päev.

**Veekulu:** 200 - 400 l/ha.

**Laiendatud kasutusala:** harilik kuusk puukoolides (*Picea abies*)

Kulunorm 1,0 l/ha, kolm pritsimist  
Pritsimise aeg aprill-mai ja august-oktoober

**NB! Kuna Goltix® 700 SC on laiendatud kasutamiseks harilikule kuusele Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 51 alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.**

**NB!** Preparaat on väga valiva toimega ja ohtlik teistele kultuuridele. Mõjub umbrohtudele lehtede ja juurte kaudu. Mida suurem on mulla huumusesisaldus, seda väiksem on mõju mulla kaudu. Parim pritsimistulemus saadakse üle +15 °C temperatuuril, kõrge õhuniiskuse juures.

### **TOIMESPEKTER**

Preparaat mõjub suurepäraselt või hästi (90-100%) järgnevatele umbrohtudele: vesihein, linnukapsas, kummel, malts, kesalill, kare kõrvik, iminõgesed, kannike, raudnõges, murunurmikas, põld-litterhein, harilik hiirekõrv, must maavits ja piimalillelised.

Mõju on hea või rahuldav (75-90%): valge hanemalts, põldsinep, erilehine linnurohi, kahar kirburohi, harilik punand ja põldrõigas.

Konnatatrle ja virnale on mõju sageli ebapiisav. Ei avalda mõju juurumbrohtudele.

### **PRITSIMISLAHUSE VALMISTAMINE**

Enne kasutamist loksutage pakendit hoolikalt. Sobiv kogus toodet tuleb segada mõõduka koguse veega. Pärast segisti sisselülitamist täitke paak ülejäänud veega. Kogu pritsimise aja ning selle vaheaegadel peab segisti töötama. Kogu valmistatud lahus tuleb korraga ära kasutada.

Tühi pakend loputada puhta veega vähemalt kolm korda ja loputusvesi lisada valmistatavasse pritsimislahusesse. Enne töö alustamist reguleerige prits ning veenduge pritsi ja selle osade puhtuses.

Alati pärast töö lõpetamist või enne teiste taimekaitsevahendite kasutamist tuleb prits ja selle osad puhta veega põhjalikult läbi pesta.

### **MÄRKUS**

Tootja tagab tehasepakendis ostetud toote kvaliteedi, kuid ei vastuta ebaõige säilitamise või kasutamise tagajärgede eest.