

Mistral® 700 WG
Taimekaitsevahend
Herbitsiid

Toimeaine: metribusiin 700 g/kg

Preparatiivne vorm: Vees dispergeeruvad graanulid

Kasutusala: Mistral® 700 WG on laia toimespektriga selektiivne süsteemne herbitsiid üheaastaste kaheiduleheliste ja teatud üheaastaste üheiduleheliste umbrohtude tõrjeks kartulil ja porgandil.

Mistral® 700 WG võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.



Hoiatus

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!

Pakend: 500 g, 1 kg, 5 kg

Eesti reg-nr: 0395/01.03.11

Valmistamise kuupäev vaata pakendilt

Partii nr: vaata pakendilt

Säilivusaeg: 2 aastat

Registreerimise haldaja:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden, Madalmaad

Tel.: +31 33 494 84 94

Tootja/pakendaja:

ADAMA Agan Ltd

P.O. Box 262

77102 Ashdod, Iisrael

Maaletooja ja turustaja:

AS Baltic Agro
Peterburi tee 44
11415 Tallin
Estonia
Tel.: +372 606 2260

Scandagra Eesti AS
Tähe 13 Viljandi,
71012 Estonia
Tel.: +372 479 6166
info@scandagra.ee
www.scandagra.ee

ESMAABI

Sissehingamisel: Kannatanu tuleb viia värske õhu kätte. Kui hingata on raske, anda hapnikku. Haigussümptomite tekkimisel pöörduda arsti poole.

Nahale sattumisel: Võtta seljast saastunud riided ning pesta kõiki ainega kokkupuutunud nahapiirkondi õrnatoimelise seebi ja veega; seejärel loputada sooja veega. Kui tekivad haigusnähud või ärritus, pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: Loputada silmi põhjalikult puhta veega 20 kuni 30 minuti jooksul. Pöörduda kohe arsti poole.

Allaneelamisel: Anda juua vett. Pöörduda kohe arsti poole.

Märkused arstile: Spetsiifilist vastumürki pole teada. Rakendada sümptomaatilist ja toetavat ravi. Allaneelamise korral teha maoloputus ja manustada aktiivsütt.

Hädaabi telefon 112

Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Hoiustamine. Hoida originaalpakendis lukustatud kohas. Hoida niiskuse eest. Hoiutemperatuur -5°C kuni 35°C.

Pakendi purunemisel. Väljavoolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga kuni segu on täielikult läbi imunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Pakendi kahjutustamine. Pakendite korduvkasutamine on keelatud. Pärast tühjendamist loputada taara vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Kasutuskõlbmatuks muudetud loputatud pakendid anda üle ohtlike jäätmete kogumiskohta.

KASUTUSJUHEND

Kartul

Hästi tõrjutavad umbrohud:

Harilik kesalill, valge hanemalts, harilik hiirekõrv, linnurohi, verev iminõges, vesihein, põldmailane, põldkannike, põldsinep, harilik kurekael, põld-harakalatv, tähk-kukehriss jt.

Keskmiselt tõrjutavad umbrohud:

Konnatatar, kahar kirburohi

Mittetõrjutavad umbrohud:

Põldohakas, harilik kassitapp, piimalill, roomav madar, harilik orashein.

Kasutusaeg:

Mistral® 700 WG'd võib kasutada tärkamiseelselt või tärkamisjärgselt (kui kartul on 5-10 cm kõrge). Mulla kobe pinnakiht ning kompaktne aluskiht pritsimise ajal parandavad preparaadi efektiivsust. 7-10 päeva pärast pritsimist herbitsiidiga Mistral 700 WG ei tohi mulda liigutada, et mitte kahjustada moodustunud õhukest herbitsiidikilet ning tagada pikem toimeaeg. Suurim efektiivsus saavutatakse juhul, kui muld sisaldab piisavalt niiskust.

Soovituslik kulunorm:

Enne kartuli tärkamist 0.5–0.7 kg/ha

Või pärast kartuli tärkamist (kartul 8–10 cm kõrge) 0.3–0.5 kg/ha.

Jaotatud pritsimine:

esimene enne kartuli tärkamist kulunormiga 0,3-0,4 kg/ha ja

teine pärast kartuli tärkamist (taimed on 8-10 cm kõrgused) kulunormiga 0,2-0,3 kg/ha

Jaotatud pritsimine vajalik märgadel, suure orgaanilise aine sisaldusega pinnastel.

Intervall 7 päeva

PHI 42 päeva

Maksimaalne kasutuskordade arv: 1 pritsimine kas enne või pärast kartuli tärkamist või jaotatult üks pritsimine enne ja teine pärast kartuli tärkamist.

Veekulu: 200-400 l/ha

Porgand

Vastutus

Mistral[®] 70 WG-d kasutatakse porgandil enne tärkamist (BBCH 00-09).

Annus: 0.075-0.150 kg/ha

PHI: 30 päeva

Maksimaalne kasutuskordade arv: 1

Veekulu: 200-400 l/ha

Märkused:

Herbitsiid toimib kõige efektiivsemalt temperatuuril 15-20°C. Öökülma puhul mitte kasutada Mistral[®] 700 WG'd varem kui 2 päeva möödumisel.

Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral võivad teatud kartulisordid osutada herbitsiidile ülitundlikuks. Herbitsiidi suhtes kõige tundlikumad sordid on Nida, Mirta, Vilija, Ukama, Karlena. 2 tundi pärast pritsimist vihm preparaadi toimet enam ei vähenda.

Tähelepanu!

Põhjavee kaitseks mitte kasutada preparaati kerge mehaanilise koostisega pinnastel (liivadel ning kergetel liivsavidel) ning kergetel muldadel, mis sisaldavad vähem kui 1% orgaanilist ainet.

Järgmisel aastal pärast preparaadi Mistral 700 WG kasutamist ei tohi samal põllul kasvatada salatit, redist, kapsast, kaalikat ega rapsi.

Pritsimislahuse valmistamine:

- Määrake hoolikalt kindlaks ja mõõtke välja pritsimiseks vajalik preparaadi kogus ning segage see väikese koguse veega;
- Täitke pritsi paak veega;
- Pärast segisti sisselülitamist lisage preparaat.

Tähelepanu!

Firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud vale kasutus ja faktorid, mida preparaadi registreerimisel ja turustamisel polnud võimalik ette näha.