

LEGACY® PRO



LV - HERBICĪDS

Darbīgās vielas:

diflufenikans 40 g/L,
pendimetalīns 300 g/L,
klorotolurons 250 g/L

Preparatīvā forma:

suspensijas koncentrāts
Reģistrācijas Nr.: 0415

Reģistrācijas klase: 2.

Partijas Nr. un izgatavošanas datums:

skatīt uz iepakojuma

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas
datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese/
Reģistrācijas savinīkās / Registreringu hoidja:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Niderlande / Nederlandai / Madalmaad

Tel: +31 33 205 68 00

www.adama.com

Pārstāvniecība Latvijā:
Tālr.: +371 2666 70 52

Atstovas Lietuvoje:
Tel.: +370 85 210 86 22

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/Tootja/pakendaja:
ADAMA Agan Ltd.
P.O. Box 262
77102 Ashdod
Izraēla/Izraelis/Israel

5 L e

© Adama Agricultural Solutions Ltd.



LT - HERBICIDAS

Veiklojosi medžiagos:

diflufenikanas 40 g/l (3.5 %) + pendimetalīnas
300 g/l (26.1 %) + chlorotolurons 250 g/l (21.7 %)

Produktos forma:

koncentruota suspensija

Reģistracijos numeris: AS2-41H(2020)

Partijos numeris ir pagarinimo data:

žūrēti ant iepakojimo

Galiojimo laikas: 2 metai



EE - HERBITSIIID

Toimeained:

diflufenikaan 40 g/L;
pendimetalīn 300 g/L;
kloortoluroon 250 g/L

Preparatiivne vorm:

suspensioniokoncentraat

Registreerimisnumber: 0541/03.02.15

Partii nr. ja valmistamise aeg:

vaata pakendil

Säilivusaeg: 2 aastat

ANELOGYPBALSLT/08/A



UN 3082

Nuskaityt QR kodq
Skanēt informācijai
QR-kodi lugemine



L102451PFR_12

LEGACY® PRO



Latvija

Legacy® Pro - selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds tīmūža viendīglāpju un tīmūža divdīglāpju neuzlīj ierobežošanai ziemas kviešiem, ziemas miežiem, ziemas trītkāles un rudzu sējumos.

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi •

H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzīvušam bērnam • H410 Loti toksisks ūdens organismiem ar ilgtosām sekām • EUH208 Saturs pendimetalinu un 1,2- benzisotiazolin-3-one. Var izraisīt alerģisku reakciju • EUH401 Lai izvairītos no riska ķīseli veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību • P201 Pirms lietošanas sanemt speciālu instruktužu • P280 Izmantot aizsargēmuds/aizsargādabes/acu aizsargus/ sejas aizsargus • P308 + P313 Ja noķēst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediku palīdzību! •

P501 Atbrīvoties no satura/rtvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvu aktu prasības • SP1 Nieglobošums

Nieglāpnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumi. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenīšļupi un ūdenčetu tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un celiem • SPe3 Lai aizsargātu ūdens organizismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenčetēm. Ja tiek lietotas smidzinājuma nonesi mažinās sprauslas, aizsargjoslas lielumu līdz ūdenstilpēm un ūdenčetēm skatīt preparāta lietošanas instrukciju • SPe3 Lai aizsargātu neizdīgūs kultūravus un ar lietojumu nesošīstus neizdīgūs augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievērt, ja lieto 50% smidzinājuma nonesi mažinās sprauslas.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112.

UZGLĀBĀŠANAS NOSACĪJUMI -

Uzglābāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā, sāvā, vēsā un labi vēdināmā noliktvā. Uzglābāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārkāpas produktiem un lopbarības. Pasārgāt no tiesīšiem saules stariem. Nepieļaut sasālsanu. Uzglābāt temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par +35°C.



8 718077 004938 >

Lietuva

Legacy® Pro - selektīvus kontaktnis ir dirvīši herbicīds, skirtas vienamērēms divskiltēms ir vesalnākitem piktēlēms naikinti zieminių kveičių, zieminių miežių, zieminių kvietrugiu ir zieminių rugiu poseliuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Sudėtyje yra pendimetalinu ir 1,2-benzisotiazolini-3-onu. Galii sukelti alerginę reakciją.

Ištariamo, kad sukelia vēži • Ištariamo, kad kenka negimūsimas vaikui • Labai toksiskas vandens organiziams, sukelia išgaliojikus pakitimius • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nuorodymus • Pries naudojimą gauti specialias instrukcijas • Mūvēti apsaugines pūrstines, devēti apsauginius drabužius, naudoti okis (veido) apsaugos priemones • Esant poveikui arba jeigu numatomas poveikis: kreiptis į gydytoją • Surinkti ištiekėjusius medžiagą • Talpykly šalinti pagal nacionalinės teisės akty reikalavimus • Neužteršti vandens augalių apsaugos produktu ar jo pakuoete (neplaukti purškimo īrenginiu šalia paviršinio vandens telkinijų/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelio) • Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metryų apsaugos zoną kai paviršinio vandens telkinijų ir melioracijos grobiu ir naudoti 90 % dulksnų mažinānčius purkštukus. Jei žemes paviršinio nuolydis iki paviršinio vandens telkinijų yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metryų apsaugos zoną, apželdinti daugiaumečiai augalais ir naudoti 90 % dulksnų mažinānčius purkštukus • Siekiant apsaugoti netikslinus augalus, būtina išlaikyti 5 metryų apsaugos zoną iki ne žemes 1‰ paskirties žemės arba naudoti 50 % dulksnų mažinānčius purkštukus.

Apsinuodijimo atveju kreiptis i-

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurų telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78

SANDĒLIAVIMAS - Laikykite sausoje, gerai vēdināmojiem palatpojē, vaikams neprieinamojo vietoei. Saugokite nuo tiesīgojiu saulēs spindulių ir užšalimo. Laikykite atokiau nuo maisto produkty ir pašarų. Laikykite tik gamintojo taroje. Saugojimo temperatūra nuo 0°C iki +35°C.

Eesti

Legacy® Pro - selektiivne kontaktne ja mulla kaudu toimiv herbitiidi ühe- ja kaheiduleheliste umbrohtude torjeks talinisol, -odral ja -tritikalel.

Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

Toode sisaldbab ohtlikku ainet: kloortooloon.

H351 Arvatavasti põhjustab vähkötöö •

H361d Arvatavasti kahjustab loodet • H410 Väga müringe veoreorganismidele, pikacajaline toime • P103 Hoida lastele kättesaadatus kohas • P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega • P280 Kanda kaitsekindlaid/kaitserehvastust/ kaitseprille/ kaitsemaski • P308+P313

Kokkuputute või kokkupuutekahtuse korral: põõrduvad arsti poolle • P391 Mahavoolunud doobu kokku kogudu • P501 Sisu/muhti kõrvvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele • EUH208 Sisaldbab pendimetallini, 1,2-bensisoatisolii-3-oni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni • EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohutamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit • SP1 Vältida vahendi või sellse pakendi vette sattumist (Seadmied piinavae läheosal mitte puhostada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaaziidte) • SPe3 Veoreorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 meetrit piinaveekogust. Mittenihtmärktaalmede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 meetrit pöllumajanduses mittekasutatavast maast.

Mürgistuse korral võtke ühendust

Mürgistuseabekeskusega telefonil 8 5 2362052.

SÄILITAMINE - Hoida toodet kuivas, häästi ventileeritavas, jahedas, lastele kättesaadatus kohas. Hoida otseesse pääkesevalguse ja külma eest. Hoida eimal toiduainest ja loomasöödest.

Hoida ainult tootja originaalkontendis. Hoida temperatuuril 0°C kuni +35°C.



atdaryti čia
atveriet šeit
avada siit

Latvija

Legacy® Pro - selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds išmūža viendīglāpju un išmūža divdīglāpju nezāju ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas trītkāles un ruzu sējumos.

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēži •

H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzīvumā bērnam • H410 Loti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošam sekām • EUH208 Satur pendimetalīnu un 1,2-benzotiozholi-3-one. Var izraisīt alerģisku reakciju • EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un viedi, ievarējiet lietošanas pamācību • P201 Pirms lietošanas saņemt profesionālu instruktužu • P280 Izamtont aizsargāmīdus/aizsargdrēbes/aci oizsargas/ sejas oizsargas • P308 + P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdzēt medīju palīdzību •

P501 Atkritvojot no satura/vertēties, ievarējot spēkā esošo normatīvu aktu prasības • SP1

Nepiešķirtot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekļi un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpi un ūdenstēcu tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem • SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievarēt 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstēcēm. Ja tiek lietots smidzinājums nenesi maizošas sprauslas, aizsargjoslas lielumu līdz ūdenstilpēm un ūdenstēcēm skaitā preparāta lietošanas instrukcijai • SPe3

Lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistīt neizdīgušus augus, ievarēt 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksmīnieceibā neizmantojamai zemei. Aizsargosla līdz blakus laukam vai lauksmīnieceibā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja liegt 50% smidzinājumu nenesi maizošas sprauslas.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112.

UZGLĀBĀŠANAS NOSACĪJUMI -

Uzglābt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktvā. Uzglāb bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Pasargāt no tiesīiem saules stariem. Nepielaut sasašanu. Uzglāb temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par +35°C.



8 718077 004938 >

Lietuva

Legacy® Pro - selektivus kontaktinis ir dirvinis herbicidas, skirtas vienamētēms divskiltēms ir vienaskiltēms piktžolēms naikinti zieminiņu kveiciū, zieminiņu miežiū, zieminiņu kvietriū ir zieminiņu rugiū pasēliūose.

Skirtas profesionalajam naudojimui.

Sudėtyje yra pendimetalino ir 1,2-benzotiozolin-3-ono. Galiai sukelti alegriški reakcijos.

Įtariama, kad sukelia vēži • Įtariama, kad kenkia negumūsimas vaikui • Labai toksisks vandenų organizmams, sukelia išgalaišius pakitimus • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ar aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus • Prieš naudojimą gauti detalines instrukcijas • Mūvičių apsauginių prištines, devėti apsauginius drabužius, naudoti akinis (veido) apsauginius priemones • Esant poveikiui arba jeigu numatomas poveikis: kreiptis į gydytoją • Surinkti ištiekėjusią medžiagą • Talpyklę salinti pagal nacionalinės teises aktų reikalavimus • Neuzteršti vandenų augalų apsaugos produktu ar jo pakute (neplauti purkšimo įrenginiu) šalia paviršinio vandenės telkiniių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių • Siekiant apsaugoti vandenų organizmus, būtina išlaikyti 20 metryų apsaugos zona iki paviršinio vandenės telkinių ir melioracijos grioviu ir naudoti 90 % dulksnų mažinantiūs purkštukus.

Jei žemės paviršiūs nuolydis iki paviršinio vandenės telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metryų apsaugos zona, apželdintą daugiametėmis augalais ir naudoti 90 % dulksnų mažinantiūs purkštukus • Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metryų apsaugos zona iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba naudoti 50 % dulksnų mažinantiūs purkštukus.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijumi kontrolės ir informacijos biurų telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78

SANDĀLIAVIMAS - Laikykite sausoje, gerai vēdināmoje, vēsiojā palatojoje, vaikams neprieinamojo vjejotoje. Saugokite nuo tiesioginės saulės spinduliu ir užšalimo. Laikykite atokiau nuo maisto produkto ir pašarų. Laikykite tik gamintojo taroje. Saugojimo temperatūra nuo 0°C iki +35°C.

Eesti

Legacy® Pro - selektiivne kontaktne ja mulla kaudu toimiv herbitiidi ühe- ja kaheiduleheliste umbrohtude törjeks talinisu, -odral ja -tritikale.

Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

Toode sisaldab ohtlikku ainet: kloortoluuron.

H351 Arvatavasti põhjustab vähkötöö •

H361d Arvatavasti kahjustab loobet • H410 Väga mürkine veoreorganismidele, pikajaline toime • P102 Hoida lastele kättesaadamatuks kohas • P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhisteega • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitsorävastust/kaitseprille/kaitsemaski • P308+P313

Kokkupute voi kokkuputeehandtuse korral: põõrduda arstile poolte • P391

Mahavoolanud toode kokku koguda • P501 Sisul/mahuti kõrvvaldava vastavalt kohlikele eeskirjadele • EUH208 Silosalad pendimetalīnu, 1,2-benzotiosiasolin-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni • EUH401 Inimete tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendeid • SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmee pinnaevate lõheldat mitte puhaslada/Vältida saastamist läbi lauda ja tee drenaazi) • SPe3

Veoreorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 meetrit pinnaevugekost.

Mittiesitiitmärkataimede kaitsmisseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 meetrit püllumajanduses mittekasutatavast maast.

Mürgistuse korral võtke ühendust Mürgistusteabekeskusega telefonil 8 5 2362052.

SÄILITAMINE - Hoida tooted kuivas, hästi ventileeritavas, jahedas, lastele kättesaadamatuks kohas. Hoida otseste pääkesevalguse ja külma eest. Hoida eimal toiduainest ja loomasöödest.

Hoida ainult tootja originaalpakendis. Hoida temperatuuri 0°C kuni +35°C.

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 mL ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa markējumu.

Norādījumi ārstanai

Simptomātiska ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms.

Saindēšanās informācijas centra tālruna numurs: 67042473.

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēkēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, obligāti lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, respiratoru, aizsargbrilles, gumijas cimdus un slēgtus apavus. Novērst tiešu kontaktu ar produktu.

Pēc darba vai pirms pārtraukuma nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Rūpīgi notīrīt/nomazgāt visus individuālās aizsardzības līdzekļus.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Legacy® Pro ir selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža viendīglapju un īsmūža divdīglapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles un rудu sējumos.

Legacy® Pro ir suspensijas koncentrāta formā; satur darbīgās vielas - diflufenikanu 40 g/L, pendimetalīnu 300 g/L, hlortoluronu 250 g/L. Trīs dažādu darbīgo vielu kombinācija nodrošina herbicīda iedarbību uz plašu nezāļu spektru, augstu preparāta efektivitāti, kā arī samazina nezāļu rezistences veidošanās risku.

Legacy® Pro lieto tūlīt pēc graudaugu sadīgšanas līdz to trīs lapu stadijai (AS 10-13).

Darbīgā viela diflufenikans pieder piridīnkarboksamīdu klases sastāvā esošajai nikotīnanilīdu grupai, pendimetalīns pieder dinitronanilīnu grupai, hlortolurons pieder fenil-urīnvielas grupai. Visas darbīgās vielas ir sistēmas un augsnes iedarbības, ko augi absorbē caur saknēm, dīgstiem un lapām. Legacy® Pro efektīvi kontrolo īsmūžu nezāļu pirms un īsi pēc to sadīgšanas.

Diflufenikans darbojas kā karotenoīdu biosintēzes inhibitorzs. Dzeltenie karotenoīdu pigmenti absorbē gaismu fotosintēzei. Diflufenikans noārda šos pigmentus, tādējādi traucējot fotosintēzi. Rezultātā pret diflufenikanu jutīgās nezāles nespēj normāli funkcionēt un iet bojā.

Tā kā karotenoīdu pigmenti tiek sintezēti apikālajā meristēmā (auga augšanas punktā), tad arī uz šo nezāļu daju primāri ir vērsta diflufenikana iedarbība, kur parādās tipiskas herbicīda

iedarbības pazīmes – audi ap augšanas punktu izbalē vai kļūst balti. Diflufenikans efektīvi kontrollē viengadīgās viendīglapju un divdīglapju nezāles (maura skareni *Poa annua*, panātēs *Lamium* spp., veronikas *Veronica* spp., vijolītes *Viola* spp., madaras *Galium* spp. u.c.).

Hlortolurons iedarbojas uz nezālu augiem, kavējot fotosintēzes procesā iesaistīto elektronu transportu augā, kam ir būtiska nozīme augu augšanā un attīstībā. Hlortolurons efektīvi kontrolē kaitīgākās ziemojosās viendīglapju nezāles, kā ruzdzusmilgu *Apera spica-venti*, peļastīšu lapsasti *Alopecurus myosuroides*, kā arī nozīmīgākās divdīglapju nezāles (tīruma kumelīti *Matricaria inodora*, parasto ruzdupukī *Centaurea cyanus*, parasto viržu *Stellaria media* u.c.).

Pendimetalīns pieder dinitroanilīnu ķīmisko savienojumu grupai, kas kavē šūnu dalīšanos. Jutīgās nezāles iet bojā dīgšanas laikā, vai arī to augšanas un attīstība tiek apturēta, ja herbicīdu lieto pēc nezālu sadīgšanas. Apstrādātās nezāles iet bojā dažu nedēļu laikā. Pendimetalīns efektīvi kontrolē dažas viendīglapju nezāles, kā maura skareni *Poa annua*, parasto ruzdzusmilgu *Apera spica-venti*, un daudzas divdīglapju nezāles (virzis *Stellaria* spp., veronikas *Veronica* spp., vijolītes *Viola* spp., magones *Papaver* spp. u.c.).

Vislabāko un ātrāk sasniedzamo efektu ar Legacy® Pro var iegūt, apstrādājot sējumus pirms nezāju dīgšanas vai tās pēc to sadīgšanas. Nezāles parasti iet bojā apmēram 2- 4 nedēļu laikā pēc apstrādes, bet laiks var būt atšķirīgs atkarībā no agroklimatiskajiem apstākļiem. Legacy® Pro nodrošina nezālu kontroli, kas var ilgt pat līdz 8 nedēļām.

Pēc izsmidzināšanas Legacy® Pro uz augsnes virskārtas veido plēvīti, kas ir stingri piesaistīta augsnes daļīnām. Nezālēm dīgstot, tās izaug cauri šai apstrādātajai augsnes kārtai un uzņem herbicīdu caur saknēm un dīgštemi. Vislabākā efektivitāte tiek sasniegta, ja apstrādes laikā augsne ir kvalitatīvi sagatavota, ar sīkdrupatainu struktūru, bez cilām un kunkuljiem, uz augsnes virsmais nav augu atlieku. Ja apstrādi veic pēc nezāļu sadīgšanas, tad tās herbicīdu absorbē caur lapām. Mazas, aktīvi augošas nezāles tiek iznīcinātas efektīvāk. Augsts gaisa mitrums un temperatūra sekਮē herbicīda iedarbību uz nezālēm. Uz nezālēm, kas apstrādes laikā ir lielākā attīstības stadijā (varīk kā 3-4 īstās lapas), herbicīds arī iedarbosies, bet tās netiks pilnībā iznīcinātas. Nezāles, kas dīgst no dzīļākiem augsnes slāņiem, var būt grūtāk apkarojami, jo tās saknes atrodas ārpus augsnes kārtas, kas ir apstrādāta ar herbicīdu. Nezāles kļūst mazāk jutīgas pret herbicīdu, pieaugot to vecumam.

Legacy® Pro efektivitāte nezāļu ierobežošanā ar devu 1.8 l/ha:

Ļoti laba efektivitāte (95-100%):

maura skarene (*Poa annua*), lauka ilzīte (*Anthemis arvensis*), ganu plikstiņš (*Capsella bursa-pastoris*), sīkā gandrene (*Geranium pusillum*), sārtā panātre (*Lamium purpureum*), tīruma kumelīte (*Tripleurospermum inodorum*), ārstniecības kumelīte (*Chamomilla recutita*), parastā virza (*Stellaria media*), tīruma naudulis (*Thlaspi arvense*), veronikas (*Veronicas* spp.), tīruma neaizmirstulīte (*Myosotis arvensis*).

Laba efektivitāte (85-94.9%):

parastā ruzdzusmilga (*Apera spica-venti*), zīda magone (*Papaver rhoeas*), keraīnu madara (*Galium aparine*), rapsis sārnaugs (*Brassica napus*), zilā ruzdupuke (*Centaurea cyanus*), tīruma vijolīte (*Viola arvensis*).

Vidēja efektivitāte (70-84.9%):
dārza vējgriķis (*Polygonum convolvulus*).

Zema efektivitāte (50-69.9%):
baltā balanda (*Chenopodium album*).

LIETOŠANA

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi

Deva: Apstrādes laiks:

1.8 L/ha. īsi pēc graudaugu sadīgšanas līdz graudaugu 3 lapu stadijai (AS 10-13).

Legacy® Pro nav ieteicams lietot sējumu apstrādei, kam bojājumus var būt radījis sals, sausums, ilgstoši pārmitri apstākļi laukā, vai kultūraugam trūkst minerālo barības vielu.

Maksimālais apstrāžu skaits sezona: visiem kultūraugiem – viena reize.

Ieteicamais darba šķidruma patēriņš: 200-400 L/ha.

Piezīme: Lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.

REZISTENCES RISKA IEROBEŽOŠANA

Legacy® Pro satur darbīgās vielas - diflufenikanu, pendimetalīnu un hlortoluronu, katrai no tām ir atšķirīgs iedarbības veids. Atbilstoši HRAC klasifikācijai diflufenikans pieder F1 grupai, pendimetalīns - K1 grupai, hlortolurons - C2 grupai. Trīs dažādu darbīgo vielu kombinācija samazina nezāļu rezistences veidošanās risku. Tomēr jebkurā nezāļu populācijā var būt sastopami mazāk jutīgi vai dabiski rezistenti (izturīgi) īpatnī. Ja vienā un tajā pašā laukā vairākus gadus atkārtoti tiek lietoti herbicīdi ar vienu un to pašu iedarbības veidu, tiek sekਮēta dabiskā izlase, kad rezistentās nezāles savairojas un kļūst dominantas. Ir pieņemts, ka nezāli uzkata par rezistentu, ja tā ir dzīva pēc apstrādes, kas veikta pareizā laikā un ar reģistrēto herbicīda devu.

Krusteniskā rezistence ir iespējama starp pendimetalīnu un citiem K2 grupas herbicīdiem. Ir iespējama arī krusteniskā rezistence starp hlortoluronu un citiem C2 grupas herbicīdiem. Latvijā nav pieejami dati par nezāļu rezistencē pret Legacy® Pro darbīgajām vielām. Lai novērstu rezistences veidošanos, ir stingri jāievēro sekojoši noteikumi:

1. Herbicīdu lietot saskaņā ar integrētās augu aizsardzības sistēmas prasībām.
2. Vienā un tajā pašā laukā dažādos gados lietot dažādu iedarbību veida herbicīdu maišījumus, kas ierobežo vienas un tās pašas nezāles. Lietot pilnu reģistrēto herbicīdu devu un apstrādi veikt pareizā laikā.
3. Pēc apstrādes apsekot laukus, konstatēt, vai nezāles ir atmīrušas. Informēt preparāta ražotāju par samazināto efektivitāti nezāļu ierobežošanā.

SADERĪBA AR CİTIEM PREPARĀTIEM (TVERTNES MAISĪJUMU VEIDOŠANA)

Legacy® Pro var jaukt mangāna sulfātu. Tvertnes saturs jāizsmidzina nekavējoties, un tas ir nepārtraukti jāmaisa. Pirms jebkāda tvertnes maisījuma gatavošanas/lietošanas iepazīstieties un ievērojet ieteikumus partnerlīdzekļa lietošanai.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šķūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā. Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto Legacy® Pro daudzumu tieši tvertnē. Pievieno pārpalikušo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā.

SMIDZINĀTĀJU UN CITA APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA

Lai izvairītos no citu kultūraugu bojājumiem, smidzinātāji rūpīgi jāattīra no lietotajiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas.

- Uzreiz pēc smidzināšanas pilnībā iztukšojet smidzinātāja tvertni un izmazgājet ar tīru ūdeni. Izskalojiet konteineru, izlaižot ūdeni caur maisītāju un šķūtenēm.
- Piepildiet konteineru līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto tīrīšanas līdzekļa daudzumu. Samaisiet (sakratiet) un izlaidiet mazgājamo ūdeni cauri maisītājam un šķūtenēm. Aizveriet smidzinātāja tvertni un piepildītu līdz augšai atstātiet uz 15 minūtēm ar ieslēgtu maisītāju. Vēlreiz izlaidiet ūdeni caur maisītāju un šķūtenēm, pilnībā iztukšojet konteineru.
- Noņemiet sprauslas un filtrus, tos atsevišķi notīriet mazgāšanas līdzeklī, kas atšķaidīts 10 litros ūdens.
- Izskalojiet smidzinātāja tvertni vēlreiz ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 10% no tilpuma, kā arī noregulējiet tā pozīciju drošai mazgāšanai.
- Sekojiet Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem.

PĒCKULTŪRAS UN PĀRSĒŠANA

Augmaiņā nav ierobežojumu pēckultūru sējai.

Ja kultūrauga sējums, kas apstrādāts ar Legacy® Pro, ziemošanas laikā gājis bojā, tad pavasarī laukā var sēt jebkuru kultūraugu, augsnī pirms tam uzarot. Ja lauka apstrādei izmanto minimalizēto augsnē apstrādes tehnoloģiju, tad var sēt tikai vasaras miežus, vasaras kviešus, zirpus, laukā pupas, kā arī stādīt kartupeļus.

Ja kultūrauga sējums, kas apstrādāts ar Legacy® Pro, gājis bojā jau rudenī, tad pārsēt var tikai ar graudaugiem; vēlā rudenī ieteicams pārsēt tikai ar ziemas kviešiem.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšo taru jālikvidē, ievērojot spēka esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBA

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Ja lieto sprauslas, kuras samazina smidzinājuma nonesi par 50%, tad jāievēro 20 m aizsargjosla. Ja lieto sprauslas, kuras samazina smidzinājuma nonesi par 75%, tad jāievēro 15 m aizsargjosla. Ja lieto sprauslas, kuras samazina smidzinājuma nonesi par 90%, tad jāievēro 10 m aizsargjosla. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīriit smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pāgalmiem un ceļiem.
Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepieaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par +35°C.

DERĪGUMA TERMINŠ

2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – laika, augsnes apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantēs savu preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz preparāta piemērošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā preparāta glabāšana un darbs ar to ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs. Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepareizas uzglabāšanas vai lietošanas rezultātā.

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

BENDRA INFORMACIJA

Legacy® Pro yra selektyvus kontaktinis ir dirvinis herbicidas, skirtas vienametėms dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms naikinti žieminių kviečių, žieminių miežių, žieminių kvetrugiu ir žieminių rugių pasėliuose. Skirtas profesionalajam naudojimui.

Legacy® Pro yra koncentruota suspensija, kurios sudėtyje yra 40 g/l diflufenikano, 300 g/l pendimetalino ir 250 g/l chlorotolurono. Trių veikliųjų medžiagų derinys užtikrina platų naikinamų piktžolių spektrą, aukštą efektyvumą, taip pat sumažina piktžolių atsparumo atsiradimo pavojų.

VEIKIMO BŪDAS

Diflufenikanas priklauso piridinkarboksamidų, pendimetalinas – dinitroanilinų, o chlorotoluronas – fenil-karbamidų cheminei herbicidų grupei. Visos šios veiklosios medžiagos, turinčios dirvinį ir kontaktinį veikimą, pasisavinamos per augalų šaknis ir lapus. Legacy® Pro efektyvus panaudojus iki piktžolių sudygimo, taip pat veikia dygstančias ir sudygusias piktžoles.

Diflufenikanas blokuoja karotinoidų biosintezę. Be karotinoidų herbicidui jautrios piktžolės negali funkcionuoti ir jos sunyksta. Poveikis piktžolėms pasireiškia audinių pabalimu, ypač augimo kūgelio vietose. Diflufenikanas efektyvus prieš vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles (*Poa annua*, *Lamium* sp., *Veronica* sp., *Viola* ap., *Galium* sp. ir kt.)

Chlorotoluronas slopinia fotosintezės elektronų perdavimo procesą, kuris būtinės augalo gyvybinėms funkcijos palaikyti. Chlorotoluronas efektyvus prieš daugelį vienaskilčių piktžolių, pvz. *Apera spica-venti*, *Alopecurus myosuroides* taip pat veikia pagrindines dviskiltes piktžoles (*Tripleurospermum inodorum*, *Centaurea cyanus*, *Stellaria media* ir kt.)

Pendimetalinas priklauso dinitroanilinų cheminei grupei, kuri slopinia ląstelių dalijimqsi.

Jautrios herbicidui piktžolės žūva dygstant arba, jei nupurškiamos jau sudygusios piktžolės, jų augimas sustoja. Paveiktos piktžolės sunyksta po kelių savaičių. Pendimetalinas veikia kai kurias vienaskiltes piktžoles (*Poa annua*, *Apera spica-venti*) ir daugelį dviskilčių piktžolių (*Stellaria* sp., *Veronica* sp., *Viola* sp., *Papaver* sp. ir kt.)

NAUDOJIMAS

Geriausias ir greičiausias poveikis piktžolėms pasiekiamas panaudojus Legacy® Pro iki sudygimo arba joms sudygus, kol jos yra mažos ir aktyviai auga. Priklasomai nuo augimo sąlygų paveiktos piktžolės sunyksta per 2-4 savaites. Legacy® Pro turi kontaktinį bei išliekamajį dirvinį poveikį, kuris palankiomis augimo sąlygomis išlieka iki 8 savaičių. Po purškimo, Legacy® Pro susijungia su dirvos dalelėmis ir suformuoja apsauginę plėvelę jos paviršiuje. Piktžolėms dygstant, jos skverbiasi per herbicidu apdorotą dirvos sluošnį, absorbuodamos herbicidą per ūglius ir šaknis. Piktžolės, dygstančios iš gilesnių dirvos sluošnių gali būti mažiau paveiktos, kadangi jų šaknys formuojaosi herbicidu neapdorotoje dirvoje. Geriausias poveikis pasiekiamas, kai dirva lygi, negrumstuota, be augalų liekanų.

Purškiant Legacy® Pro piktžolėms sudygus, jos herbicidą absorbuoja per lapus. Mažos, aktyviai augančios piktžolės sunaikinamos geriausiai. Didesnės (3-4-ųjų lapelių) piktžolės taip pat paveikiamos, bet gali būti nevisai sunaikintos. Didelė drėgmė ir aukšta oro temperatūra sustiprina veikimą per lapus. Didesnės piktžolės mažiau jautrios herbicidui.

Legacy® Pro efektyvumas

Labai jautrios/jautrios piktžolės (95-100 %):

Vienametė miglė (*Poa annua*)

Raudonžiedė notrelė (*Lamium purpureum*)

Veronikos (*Veronica spp.*)

Dirvinė čiužutė (*Thlaspi arvense*)

Daržinė žliūgė (*Stellaria media*)

Trikerė žvaginė (*Capsella bursa-pastoris*)

Dirvinė neužmirštulė (*Myosotis arvensis*)

Dirvinis bobramunis (*Anthemis arvensis*)

Smulkusis snaputis (*Geranium pusillum*)

Vaistinė ramunė (*Matricaria chamomilla*)

Jautrios piktžolės (85-94,9 %):

Aguona birulė (*Papaver rhoes*)

Bekvapis šunramunis (*Tripleurospermum inodorum*)

Dirvinė našlaitė (*Viola arvensis*)

Vidutiniškai jautrios piktžolės (70-84,9 %):

Dirvinė smilguolė (*Apera spica-venti*)

Kibusis lipikas (*Galium aparine*)

Rugiagėlė (*Centaurea cyanus*)

Vidutiniškai atsparios piktžolės (50-69,9 %):

Baltoji balanda (*Chenopodium album*)

Rapsų pabirros (*Brassica napus*)

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Žieminiai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai

Naudojimo laikas: 1-3 lapeliai tarpsnyje (BBCH 10-13)

Norma: 1,8 L/ha Legacy® Pro

Legacy® Pro nepatartina naudoti, jei pasėlis paveiktas streso dėl šalnos, sausros, užmirkimo arba paséliuose, kuriuose yra maisto medžiagų trūkumas.

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200 - 400 l/ha.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad

nebūtų purškimo juostų persidengimo galulaukėse ir posūkiuose.

FITOTOKSIŠKUMAS

Panaudojus Legacy® Pro, gali pasireikšti nežymūs fitotoksiškumo požymiai (pabalimas, pageltimas, chlorozė, nekrozė), tačiau šie požymiai laikui bėgant išnyksta ir neturi neigiamos įtakos derliui ir derliaus kokybei.

MAIŠYMAS

Informacijos apie Legacy® Pro maišymą su kitais augalų apsaugos produktais ieškokite gamintojo informacinėje medžiagoje, tinklalapyje arba kreipkitės į gamintojo atstovą. Legacy® Pro mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

SĖJOMAINA

Nuėmės javų, purkštų Legacy® Pro, derlių, giliai suarus dirvą (20 cm), galima auginti visus augalus. Vasariniai miežiai, vasariniai kviečiai, cukriniai runkeliai, žirniai taip pat galima sėti po minimalaus (5 cm) žemės įdirbimo.

Jei pasėliai neperžiemoja, pavasarį dirvą giliai suarus gali būti sėjami/sodinami bet kurie augalai. Po minimalaus žemės dirbimo (5 cm) gali būti sėjami/sodinami vasariniai miežiai, vasariniai kviečiai arba žirniai.

Jei pasėlis žiūra rudeni, atséti galima tik žieminiai javais, giliai suarus dirvą.

ATSPARIMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MАЗINIMO PRIEMONĖS

Legacy® Pro sudėtyje yra 3 veiklosios medžiagos: diflufenikanas (HRAC kodas F1), pendimetalinas (HRAC kodas K1) ir chlortoluronas (HRAC kodas C2). Triju veikliujių medžiagų derinys sumažina piktžolių atsparumo atsiradimo pavojų. Vis dėlto bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu laiku ir rekomenduojama norma.

Kryžminis atsparumas yra tikėtinas tarp pendimetalino ir kitų K1 grupės herbicidų. Taip pat tikėtina, kad kryžminis atsparumas yra tarp chlorotoluronio ir kitų C2 grupės herbicidų.

Duomenų apie piktžolių atsparumą Legacy® Pro veiklosioms medžiagoms Lietuvoje šiuo metu nėra. Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, būtina griežtai laikytis šių rekomendacijų:

1. Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą;
2. Mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;
3. Naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku;
4. Panaudojė herbicidą, patirkrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštovo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišykļę. [pilkite reikiama kiekį Legacy® Pro ir baikite pilti vandenį]. Maišykļę laikykite įjungtą visą purškimo laiką.

Mišiniams vartokite tik švarų vandenį. Nepalikite purkštuvu su tirpalu ilgesniam laikui. Po purškimo kruopščiai išplaukite purkštuvą.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Po naudojimo kruopščiai išplaukite įrenginį. Visiškai ištuštinkite purkštuvu talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 3 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvą talpą švariu vandeniu. Galima jdėti tam skirtos plovimo priemonės. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įplikite ne mažiau 10% purkštuvu talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniuose purkštukais. Vandenį išleiskite pro vamzdynus. Jei plovimui naudotas tik vanduo, tirpalą išpurkškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas. Jei buvo naudota ir plovimo priemonė, vykdyti jos etiketėje nurodytus reikalavimus.

SAUGOS PRIEMONĖS

Nėščios ir vaisingo amžiaus moterys turėtų vengti kontaktu su produkту.

Dirbant su neskiestu produkту ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovémis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas $>300 \text{ g/m}^2$) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas $>200 \text{ g/m}^2$) bei avėti tvirtą alyvynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo ($\geq 0,4 \text{ mm}$) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166).

Purškiant traktoriais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovémis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas $>300 \text{ g/m}^2$) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas $>200 \text{ g/m}^2$) bei avėti tvirtą alyvynę. Dirbant purkštuvu priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovémis arba kombinezoną bei rekomenduojama avėti sandarius batus ir mūvėti pirštines.

Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnés kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamujų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos. **Higienos priemonės.** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produkту. Stengtis nejkvępti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsilankant. Susitepus pirštinių paviršiu, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisés aktų reikalavimų.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuočės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuočei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuočės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatantčiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuočės kitiems tikslams.

PIRMOJI PAGALBA

Ikvėpus: išvesti asmenį į grynq orq. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muliu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakelus akinių vokus 10–20 minučių.

Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarirus: Jei nukentėjusysis sqmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuočę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio néra. Taikyti simptominių gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SANDĖLIAVIMAS

Laikykite sausoje, gerai védinamoje, vésioje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje.

Saugokite nuo tiesioginių Saulės spindulių ir užšalimo. Laikykite atokiau nuo maisto produktų ir pašarų. Laikykite tik gamintojo taroje.

Saugojimo temperatūra nuo 0°C iki +35°C.

PASTABA!

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produkta, yra pateiktinos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. Gamintojas bei platintojas neatsako už produkto efektyvumą, jei buvo pažeistos etiketėje nurodytos laikymo ir naudojimo sąlygos, taip pat atsiradus kitoms nenumatytom aplinkybėms (atsiradus herbicidui atsparioms piktolėms ir t.t.).

**ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT
VÄLTIMAKS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE TULEB JÄRGIDA KASUTUSJUHENDI
NÖUDEID.**

ÜLDKIRJELDUS

Legacy® Pro on selektiivne kontaktne ja mulla kaudu toimiv herbitsiid üheheiduleheliste ja kaheiduleheliste umbrohtude törjeks talinisul, -odral ja -tritikale. Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

Legacy® Pro on suspensioonkontsentraat, mis sisaldb 40 g/L diflufenikaani, 300 g/L pendimetaliini ja 250 g/L kloortolurooni. Kolme toimeaine kombinatsioon tagab umbrohtude törje laia spektri ja selle kõrge efektiivsuse, samuti vähendab see umbrohtude taimekaitsevahendile resistentsuse riski.

TOIMEMEHANISM

Diflufenikaan kuulub pirdinkarboksamiidide, pendimetaliin - dinitroaniliinide ja kloortoluroon - fenüülkarbamiidide herbitsiidide keemilisse rühma. Kõiki neid süsteemseid toimeaineid, mis toimivad kontaktelt ja mulla kaudu, omastavad taimed juurte ja lehtede kaudu. Legacy® Pro on töhus kasutades seda enne umbrohu idanemist, samuti avaldab mõju ka idanevatele ja idanenud umbrohule.

Diflufenikaan pärssib karotenoidide biosünteesi. Karotenoidideta ei saa herbitsiididele vastuvõtlukud umbrohud toimida ja hävivad. Mõju umbrohule avaldub kudede valastumise näol, eriti kasvukuhiku kohtades. Diflufenikaan on efektiivne üheheiduleheliste ja laialehiste umbrohtude (*Lamium* sp., *Veronica* sp., *Viola* ap., *Galium* sp. jms) vastu.

Kloortoluroon pärssib fotosünteesi elektronide ülekandeprotsessi, mis on vajalik taimel elutähtsate funktsioonide säilitamiseks. Kloortoluroon on efektiivne paljude üheheiduleheliste umbrohtude nt *Apera spica-venti*, *Alopecurus myosuroides*, samuti põhiliste laialehiste umbrohtude (*Matricaria inodora*, *Centaurea cyanus*, *Stellaria media* jms) vastu.

Pendimetaliin kuulub dinitroaniliinide keemilisse rühma, mis pärssib rakkude jagunemist. Herbitsiiditudlikud umbrohud hävivad idanemisel või juba idanenud umbrohtude piustamisel peatub nende kasv. Taimekaitsevahendist möjutatud umbrohud hävivad paari nädalaga. Pendimetaliin on efektiivne mõnede üheheiduleheliste umbrohtude (*Poa annua*, *Apera spica-venti*) ja paljude kaheiduleheliste umbrohtude (*Stellaria* sp., *Veronica* sp., *Viola* sp., *Papaver* sp. jms) vastu.

KASUTUSJUHEND

Parimat ja kiiremat mõju umbrohtudele saavutatakse kasutades Legacy® Pro'd enne või pärast nende idanemist, kui need on väikesed ja aktiivse kasvu faasis.

Söltuvalt kasvutingimustest hävivad taimekaitsevahendist möjutatud umbrohud 2-4 nädalaga. Legacy® Pro'l on kontaktne ja kestev mullas säiliv mõju, mis püsib soodsates

kasvutingimustes kuni 8 nädalat.

Pärast pritsimist seondub Legacy® Pro mullaosakestega ja moodustab mulla pinnal kaitsva kile. Umbrohtude idanemisel tungivad need läbi herbitsiididega töödeldud mullakihist ja herbitsiid imendub võrsete ja juurte kaudu. Umbrohud, mis idanevad sügavamatest mullakihtidest, võivad olla mõjutatud vähem, kuna nende juured moodustatakse herbitsiidiga töötlemata mullas. Parim toime saavutatakse siis, kui muld on tasane, mullatükkide ja taimejääkideta.

Legacy® Pro'ga pritsimisel siis, kui umbrohud on juba idanenud, imendub herbitsiid läbi lehtede. Väikesed, aktiivselt kasvavad umbrohud hävivad köige paremini. Suuremad (3-4 lehega) umbrohud on samuti mõjutatud, kuid ei pruugi täielikult hävida. Kõrge õhuniiskus ja -temperatuur suurendavad mõju lehtede kaudu. Suuremad umbrohud on vähem herbitsiiditundlikud.

Legacy® Pro tõhusus

Väga tundlikud/tundlikud umbrohud (>95%):

Harilik rukkikastehein (*Apera spica venti*)

Murunurmikas (*Poa annua*)

Pöld-rebasesaba (*Alopercus myosuroides*)

Roomav madar (*Gallium aparine*)

Kesalilled (*Matricaria spp.*)

Harilik punand (*Lamium purpureum*)

Pöldkannikesed (*Viola spp.*)

Mailased (*Veronica spp.*)

Kukemagun (*Papaver rhoeas*)

Pöld-litterhein (*Thlaspi arvense*)

Vesihein (*Stellaria media*)

Harilik hiirekörv (*Capsella bursa-pastoris*)

Pöld-löösilm (*Myosotis arvense*)

Raps (*Brassica napus*)

Kurerehad (*Geranium molle*)

Keskmiselt tundlikud (85 – 95 %):

Rukkilill (*Centaurea cyanus*)

Valge hanemalts (*Chenopodium album*)

KASUTUSOOVITUSED

Talinisu, talioder, talitritikale

Kasutusaeg: 1-3 lehe faasis (BBCH 10-13)

Kulunorm: 2,0 L/ha Legacy® Pro'd

Legacy® Pro'd ei ole soovitatav kasutada, kui pöllukultuur on mõjutatud stressist külma, põua või liigniiskuse tõttu või pöllukultuuri toitainevaeguse korral.

Maksimaalne pritsimiskordade arv: 1.

Soovituslik vee maht: 200 - 400 L/ha.

SEGAMINE

Teavet Legacy® Pro segamise kohta teiste taimekaitsevahenditega leiate tootja infomaterjalis, veebilehel või võtke ühendust tootja esindajaga.

KÜLVIKORD

Tavaolukorras külvikorra piirangud puuduvad. Kui pöllukultuur ei talvitu edukalt, võib kevadel sügavkündmisse järel külvata/istutada mistahes taimi. Pärast minimaalset mahaarimist (5 cm) võib külvata/istutada suviatra, -nisu, kartulit, ube või herneid. Kui pöllukultuur hävib sügisel, võib uuesti külvata ainult talivilju.

RESISTENTSUSE TÖRJEVAHENDILE RISKI VÄHENDUSMEETMED

Legacy® Pro sisaldb 3 toimeainet: diflufenikaani (HRAC kood F1), pendimetaliiini (HRAC kood K1) ja kloortolurooni (HRAC kood C2). Kolme toimeaine kombinatsioon vähendab umbrohtude taimekaitsevahendile resistentsuse tekkimise riski. Siiski võib mistahes umbrohupopulatsioonis olla vähem tundlikke või loomulikult vastupidavaid üksikuid taimi. Kui samal pöllul kasutatakse mitu aastat järjest sama toimemehhanismiga herbtsiide, paljunevad ja muutuvad domineerivaks loodusliku valiku tagajärvel vastupidavad umbrohuliidid. Taim peetakse resistentseks, kui pärast õigeade set herbtsiidiiga pihustamist ja soovitavas koguses jäab taim ellu.

Ristresistentsus on töenäoline pendimetaliiini ja muude K1-rühma herbtsiide vahel. Samuti on töenäoline, et ristresistentsus on olemas kloortolurooni ja muude C2-rühma herbtsiide vahel.

Andmed umbrohtude resistentsuse kohta Legacy® Pro toimeainetele Eestis hetkel puuduvad. Vältimaks umbrohtude resistentsuse teket tuleb järgida järgmisi soovitusi:

1. Rakendage umbrohutörje integreeritud süsteemi;
2. Kasutage segudes, järjestikel või erinevatel aastatel samal pöllul erineva toimega herbtsiide, mis hävitavad samu umbrohtusid;
3. Kasutage herbtsiidi koguse soovitusliku täismäära ja soovituslikul ajal;
4. Pärast herbtsiidi kasutamist koltrollige, kas umbrohi on pöllul hävinud. Ärge laske umbrohul paljuneda vegetatiivselt ja seemnete kaudu.

OHUTUSABINÖUD

Rasedad ja fertiilses eas naised peaksid vältima kokkupuudet selle tootega.

Lahjendamata tootega töötades või puudutades sellega saastunud pindu tuleb kanda kaitseriietust, mis on möeldud kaitseks vedelate kemikaalide eest (vastavalt standarditele EN 340 ja EN 14605) ja kinniseid jalatseid. Tuleb kanda kemikaalikindlaid kindaid (vastavalt standardile EN 374), nt polüvinüükloriidist, nitriilist ($\geq 0,4$ mm) vms.

Traktoriga veetava hüdraulilise pritsiga pritsimisel soovitatakse kasutada kaitseriietust, mis on mõeldud kaitseks vedelate kemikaalide eest (vastavalt standardite EN 340 ja EN 14605), kanda kinniseid jalatseid ja kemikaalikindlaid kindaid (vastavalt standardile EN 374).

Töötajad võivad minna töödeldud alale pihustatud lahuse ärakuivamisel.

Hügieeniabinõud. Tööjal mitte süüa, juua ega suitsetada. Vältida lahuse sattumist nahale, silma ja töörietele. Vältida töölahuse udu sissehingamist. Pärast tööd või enne vaheega votta tööröivad seljast, pesta ennast vee ja seebiga. Tööröivad hoida eraldi. Tööröivaste määrdumisel votta tööröivad seljast ja puhastada. Kui puhastada ei ole võimalik, tuleb tööröivad hävitada vastavalt kehtivatele õigusaktide nõuetele.

TÜHJADE PAKENDITE HÄVITAMINE

Toote valamisel pritsi ja umbes 30 sekundi ootamise järel, kuni valguvad välja viimased tilgad, tuleb pakend loputada. Tootejägid ei tohi ära kuivada. Kohaldatakse integreeritud loputuse või kolmekordse loputuse meetodeid. Pritsi ehitatud pakendite loputamisseade loputab pakendeid veejooga survetugevusega 3-5 baari. Loputusvesi valada pritsipaaki. Kolmekordse loputuse meetodi korral on soovitatav täita 25-30 % pakendist puhta veega ja pärast korgi tiheosal kinnikeeramist loksutada 30 sekundit, et vesi satuks pakendi kõikidesse nurkadesse. Seejärel valada loputusvesi pritsipaaki. Protseduuri korrvatakse vähemalt kolm korda nii kaua, kuni pakend näeb visuaalselt puhas.

Pritsi või pakendi pesuvesi pritsitakse eelnevalt töödeldud pöllule.

Vastavalt nõuetele loputatud pakendid on ohtlikud jäätmed, mida tuleb koguda eraldi muudest jäätmetest ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

ESMAABI

Üldine nõuanne: vältida aine sattumist nahale, silma ja riitele. Votta saastunud tööröivad viivitamatult seljast. Probleemide tekkimisel pöörduda arsti poole. Näidata arstile pakendit, etiketti ja/või ohutuskaarte.

Sissehingamisel: viia kannatanu värske öhu kätte, pöörduda arsti poole.

Kokkupuutel nahaga: votta viivitamatult seljast saastunud rietus ning pesta korralikult seebi ja soaja jooksva vee all, pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: eemaldada viivitamatult kontaktlätsed ja loputada avatud silmad mõne minuti jooksul jooksva veega. Pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel: MITTE KUTSUDA ESILE oksendamist. Loputada suud viivitamatult veega.

Soovitused arstile: ravi vastavalt süptomomitele. Spetsiifiline vastumürk puudub.

Ärge püükde teadvusetule või krampides inimesele suu kaudu midagi manustada.

Mürgistuse korral votta ühendust Mürgistusteabekeskusega telefonil 8 5 2362052.

SÄILITAMINE

Hoida toodet kuivas, hästi ventileeritavas, jahedas, lastele kättesaamatus kohas. Hoida otse pääkesevalguse ja külma eest. Hoida eemal toiduainest ja loomasöödast. Hoida

ainult tootja originaalkandis. Hoida temperatuuril 0° C kuni +35° C.

LAHUSE SEGAMINE

Täitke puhta veega pool pritsipaagi mahutist ning lülitage sisse segisti. Lisage vajalik kogus Legacy® Pro'd ja lisage ülejää nud vajaminev vee kogus. Segisti olgu sisse lülitatud kogu pritsimisaja jooksul. Paagisegede valmistamisel kasutage ainult puhas t vett. Ärge jätket töölahust pritsi pikemaks ajaks seisma. Pärast pritsimist peske prits korralikult nii seest kui väljast.

MÄRKUS

Tootja garanteerib toote kvaliteedi kui see on tarinitud tootjakandis. Kõik soovitud teote kasutamise suhtes pöhinevad praegusel ajal tootja käsutuses oleval kogemusel. Tootja ja turustaja ei vastuta toote tõhususe eest, kui on rikutud etiketil näidatud toote säilitamis- ja kasutustingimus ning samuti kui on tekinud tingimused, mis on väljaspool tootja kontrolli (herbitsiidile resistentsete umbrohtude tekkimine jne).

LEGACY® PRO



LV - HERBICĪDS

Darīgās vielas:

diflufenikans 40 g/L,
pendimetalins 300 g/L,
klorotolurons 250 g/L

Preparatīvā forma:

suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas Nr.: 0415

Reģistrācijas klase: 2.

Partijas Nr. un izgatavošanas datums:

skaitīt uz iepakojuma

Derīguma termiņš: 2 gadi no

izgatavošanas datuma, glabājot

neatvērtā oriģinālā iepakojumā



LT - HERBICIDAS

Veiklos medžiagos:

diflufenikana 40 g/l (3.5 %) +
pendimetalina 300 g/l (26.1 %) +
chlorotoluronas 250 g/l (21.7 %)

Produktu forma:

koncentruota suspensija

Registracijos numeris: AS2-41H(2020)

Partijos numeris ir pagamīmo data:

žūrēti ant iepakavimo

Galojimo laikas: 2 metai



EE - HERBITSIID

Toimeained:

diflufenikaan 40 g/L;
pendimetaliin 300 g/L;
kloortoluroon 250 g/L

Preparatiivne vorm:

suspensioonikonseraat

Registreerimisnumber: 0541/03.02.15

Partii nr. ja valmistamise aeg:

vaata pakendil

Säilivusaeg: 2 aastat



UN 3082

Pārstāvniecība Latvijā: Atstovas Lietuvoje:
Tālr.: +371 2666 70 52 Tel.: +370 85 210 86 22

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/Tootja/pakendaja:
ADAMA Agan Ltd.
P.O. Box 262
77102 Ashdod
Izraēla/Izraelis/ Israel

4 x 5 L

© Adama Agricultural Solutions Ltd.



ADAMA

LEGACY® PRO

ANELGYPBA15LT/08/C1

L102450CFR_12

LEGACY® PRO



LV - HERBICĪDS

Darbīgās vielas:
diflufenikans 40 g/L,
pendimetalīns 300 g/L,
hloritolurons 250 g/L
Preparatīvā forma:
suspensijas koncentrāts
Reģistrācijas Nr.: 0415
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas N. un izgatavošanas
datums: skatīt uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi no
izgatavošanas datuma, glabājot
neatvērtā oriģinālā iepakojumā

LT - HERBICIDAS

Veiklojosi medžiagai:
diflufenikans 40 g/l (3.5 %) +
pendimetalīns 300 g/l (26.1 %) +
chlorotolurons 250 g/l (21.7 %)
Produktu forma:
koncentruota suspensija
Registracijos numeris:
AS2-41H(2020)
**Partijos numeris ir pagaminošo
data:** žiūrēti ant iepakojimo
Galiojimo laikas: 2 metai

EE - HERBITSIID

Toimeained:
diflufenikana 40 g/L;
pendimetalīni 300 g/L;
kloortoluroon 250 g/L
Preparatiivne vorm:
suspensioonikonsentraat
Registreerimisnumber:
0541/03.02.15
Partii nr. ja valmistamise aeg:
vaata pakendil
Säiliavusaeg: 2 aastat

Reģistrācijas apliecības ipašnieks, tā adrese /
Registracijos savininkas/Registreeringu hoidja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nederlande / Nederlandai / Madalmaad
Tel: +31 33 205 68 00
www.adama.com

Pārstāvniecība Latvijā: Atstovas Lietuvoje:
Tālr.: +371 2666 70 52 Tel.: +370 85 210 86 22

**Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/
Tootja/pakendaja:**
ADAMA Agan Ltd.
P.O. Box 262
77102 Ashdod
Izraēla / Izraelis / Israel



UN 3082

Skanēt informāciju
Nuskaitīt QR kodu
QR-kodi lugemine



© ADAMA Registrations B.V.

4 x 5 L

Latvija

Legacy® Pro - selektīvs sistēmas un augses
iedarbības herbicīds īsmūža viendīglapju
un īsmūža divdīglapju nezāļu ierobežošanai
ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas
tritikales un ruzdu sējumos.

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēži • H361d
Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu
nedzīmūšam bērnam • H410 Loti toksisks
ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
• EUH208 Satur pendimetalīnu un 1,2-
benzizothiazol-3-one. Var izraisīt alergisku
reakciju • EUH401 Lai izvairītos no riska
cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas
pārmaiņu • P201 Pirms lietošanas saņem
speciālu instruktažu • P280 Izmantot
aizsargcīmudus/aizsargdrēbes/acu aizsargs
/sejas aizsargs • P308 + P313 Ja nokļūst
saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediku
palīdzību • P501 Atbrivoties no satura/
tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo
aktu prasības • SP1 Nopiešārnot ūdeni ar
augu aizsardzības līdzekļu un tā iepakojumu.
Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju
un ūdenstēku tuvuviņu. Izsāgties no
piesārņošanas caur drenēžu no pagālēm
un ceļiem • SPe3 Lai aizsargātu ūdens
organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz
ūdenstilpēm un ūdenstēcēm. Ja tiek lietots
smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas,
aizsargjoslas lielumi līdz ūdenstilpēm un
ūdenstēcēm skatīt preparāta lietošanas
instrukciju • SPe3 Lai aizsargātu neizdīgušus
kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus
neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu
līdz blakus laukam un/vai lauksmniecībā
neizmantojamai zemei. Aizsargjosla
līdz blakus laukam vai lauksmniecībā
neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja
lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas
sprauslas.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības
un glābšanas dienestam – telefons 112.

UZGLĀBĀŠANAS NOSACĪJUMI -
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā
veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā
noliktvā. Uzglabāt bēriņiem un
mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi
no pārtikas produktiem un lopbarības.
Pasārgāt no tiešiem saules stariem. Nepielāgt
sasāšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā
par 0°C un ne augstāk par +35°C.

Lietuva

Legacy® Pro - selektīvus kontaktinis ir
dirvinis herbicidas, skirtas vienāmetēm
dviskielēm ir vienaskiltēms piktžolēms
naikinti zieminiņi kviečiņi, zieminiņi miežiņi,
zieminiņi kvetriugū i zieminiņi rugiū
piestāvēti.

Skirtas profesionālijam naudojimui.

Sudėtyje yra pendimetalino ir
1,2-benzizotiazolin-3-ono. Gali sukelti
alerginę reakciją.

Ištarima, kad sukelia vėži • Ištarima,
kad kenka negimusiam vaikui • Labai
toksiškas vandens organizmams, sukelia
ilgalikaius pakitus • Siekiant išvengti
žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos, būtinai vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus • Prieš naudojimą
gauti specialias instrukcijas • Mūvėti
apsaugines pirtynes, dévēti apsauginius
drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos
priemones • Esant poveikui arba jeigu
numatomas poveikis: kreiptis į gydytoją

• Surinkti ištiekėjusius medžiagą • Taipyklą
šalinti pagal nacionalinės teisės aktų
reikalavimus • Neužteršti vandens
augalų apsaugos produktu ar jo pakute
(neplauti purškimo īrenginių šalia
paviršinio vandens telkinį/vengti taršos
per drenāžą iš sodybų ar nuo kelių) •

Siekiant apsaugoti vandens organizmus,

būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos
zoną iki paviršinio vandens telkinio ir
melioracijos griovių ir naudoti 90 %

dulksnų mažinantiūs purkštukus. Jei
žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio
vandens telkinio yra didesnis nei 2 proc.,

būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną,
apželdinti daugiametis augalais ir
naudoti 90 % dulksnų mažinantiūs
purkštukus • Siekiant apsaugoti
mitisklinius augalus, būtina išlaikyti 5

metry apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties žemės arba naudoti 50 %
dulksnų mažinantiūs purkštukus.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos
biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78

SANDĒLIĀVIMAS - Laikykite sausoje,
gerai vēdinamoje, vēsjoje patalpoje,
vaikams nepriēinamoje vitoje. Saugokite
nuo tiesioginių Saulės spindulių ir
uzšalimo. Laikykite atokiau nuo
maisto produkta ir pašaru. Laikykite
tik gamintojo taroje. Saugojimo
temperatūra nuo 0°C iki +35°C.

Eesti

Legacy® Pro - selektiivne kontaktne ja
dirvinis herbicidas, skirtas vienāmetēm ühe- ja
kaheiduleheliste umbrohtude törjeks
talinisu, -odral ja -tritikale.

Toode on mõeldud professionaalseks
kasutamiseks.

Toode sisaldbas ohtliku ainet:
kloortoluroon.

H351 Arvatavasti põhjustab vähktööbe •
H361d Arvatavasti kahjustab loodet •

H410 Väga müringe veeorganismidele,
pikaajaline toime • P102 Hoida lastele
kätesaamatust kohas • P201 Enne

kasutamist tutvuda erijuhisteiga • P280
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/
kaitseprille/kaitsemaski • P308+P313

Kokkupute või kokkuputekuatluse
korral: pöörduda arsti poolle • P391

Mahavoolanud toode kokku koguda •
P501 Sisu/mahuti kõrvvaldava vastavalt
kohalikele eeskirjadele • EUH208 Sisaldbas
pendimetaliini, 1,2-benzisotiazoli-

n-3-oni. Võib esile kutsuda allergilise
reaktsiooni • EUH401 Inimetele tervise
ja keskkonna ohustamise vältimiseks
järgida kasutusjuhendit • SP1 Vältida
vahendi või selle pakendi vette

sotumist (Seadmieid pinnavee lähebad
mitte puhastada/Vältida saastamist
läbi laudu ja teede drenaažide) • SPe3

Veeorganismidele kaitsmiseks pidada
kinni mittepristavast puhvervööndist
10 meetrit pinnaveekogust.

Mittesihhtmarktaimedede kaitsmiseks
pidada kinni mittepristavast
puhvervööndist 5 meetrit
pöllumajanduses mittekasutatavast
maast.

Mürgistuse korral võtke ühendust
Mürgistusteabekeskusega telefonil
8 5 2362052.

Speciale instrukcijas: Kreiptis į
aparatu pärast vahendi vette
sotumist (Seadmieid pinnavee lähebad
mitte puhastada/Vältida saastamist
läbi laudu ja teede drenaažide) • SPe3

Veeorganismidele kaitsmiseks pidada
kinni mittepristavast puhvervööndist
10 meetrit pinnaveekogust.

Mittesihhtmarktaimedede kaitsmiseks
pidada kinni mittepristavast
puhvervööndist 5 meetrit
pöllumajanduses mittekasutatavast
maast.

Mürgistuse korral võtke ühendust
Mürgistusteabekeskusega telefonil
8 5 2362052.

SÄLITAMINE - Hoida tooted kuivas,
häästi ventileeritavas, jahedas, lastele
kätesaamatust kohas. Hoida otse
pääkesevalguse ja külma eest. Hoida
eemal toiduainest ja loomasöödest.

Hoida ainult tootja originaalkakendis.
Hoida temperatuuril 0°C kuni +35°C.



ANEI.GYBAL5LT/08/C2

L102450CBR_12

LEGACY® PRO




LATVIA



LITHUANIA



ESTONIA



UZMANĪBU / ATSARGIAI / HOIATUS

30 x 20 L



UN 3082

ANELGYPBAL5LT/08/X

L10245PAAR_12



UAB

"ADAMA Northern Europe"