

GRUPE

1

HERBICIDE



ADAMA

# AMBITION®

Maîtrisez les graminées sur vignes jeunes ou installées



## AMBITION®

La solution foliaire  
contre les graminées  
sur vigne

### Simplicité

Convient à tous les cahiers des charges  
Utilisable sur pépinières et jeunes vignes

### Efficacité

Contre un large spectre de graminées  
annuelles et vivaces

### Netteté

Formulation performante à action rapide

ADAMA.COM

HERBICIDES



## DESSCRIPTIF DU PRODUIT

**Composition :** 100 g/L de propaquizafop

**Famille chimique :** Fops - HRAC 1 (Ancien HRAC A)

**Formulation :** EC – Concentré émulsionnable

**Conditionnement :** Bidon 5L

**Mode d'action :** Le propaquizafop inhibe l'acétyl-CoA carboxylase (ACCCase). Véhiculé par la sève jusqu'aux méristèmes, la substance active perturbe la croissance des adventices et provoque leur destruction. Il est absorbé rapidement (moins d'une heure) par les feuilles des adventices. L'ajout d'un adjuvant performant dans sa formulation permet une absorption facilitée au travers de la cuticule des adventices.

## TABLEAU DES USAGES AUTORISÉS

Cultures	Stade d'application	Dose homologuée / cible
Jeunes Plantations	BBCH 00-85	1,2 L/ha sur graminées annuelles
	BBCH 00-86	
Cultures installées	BBCH 00-85	2 L/ha sur graminées vivaces.
	BBCH 00-86	

Pour les usages du tableau ci-contre :  
**DRE :** 24h – gestion du travail optimisée.  
**ZNT :** 5 mètres  
**DAR :** 30 jours  
**1 application /an**

AMBITION® est également homologué sur: betteraves industrielle et fourragère, carotte, chicorées scarole et frisée, colza, féveroles d'hiver et de printemps, laitue, lin oléagineux et textile, lupin, luzerne, pois de conserve, pois protéagineux d'hiver et de printemps, pomme de terre, soja, trèfles blanc / violet / incarnat, fêtuques ovine, porte-graine / rouge porte-graine / des prés porte-graine / élevée porte-graine, ray-grass porte-graine.

## SPECTRE D'ACTION

Graminées annuelles	AMBITION® - 1,2L/ha + Huile	Graminées vivaces	AMBITION® - 2 L/ha + Huile
Brome stérile	+++	Chiendent pied de poule	+
Digitaire sanguine	+	Chiendent rampant	+
Ivraie raide	++	Pâturin commun	+++
Orges des rats	++	Sorgho d'Alep	+++
Panic faux millet	+++	<b>Efficacité secondaire</b>	
Panic pied de coq	+++	Erodium	+++
Pâturin annuel	-/+	Sensibilité de l'adventice à AMBITION® (% d'efficacité) :	
Ray-grass d'Italie*	+++	+++	> 90%
Sétaire verte	++	++	80 à 90%
Sétaire verticillée	+++	+	60 à 80%
Vulpie queue-de-rat	-/+	-/+	< 60%

AMBITION® est efficace contre les graminées sensibles aux inhibiteurs de l'ACCCase (groupe HRAC 1). La présence de graminées résistantes aux herbicides inhibiteurs de l'ACCCase entraîne une baisse d'efficacité d'AMBITION®, voire une inefficacité du produit.

## RECOMMANDATIONS D'EMPLOI



► Appliquez AMBITION® lorsque la **température** est comprise entre 8 et 25°C.



► Appliquez AMBITION® lorsque l'**hygrométrie** est élevée :

○ Optimum : 80%

○ Minimum : 60%



► Associer AMBITION® à de l'**huile (végétale ou minérale)** homologuée herbicide pour améliorer l'efficacité.

► Appliquer AMBITION® sur des **adventices peu développées** (avant la montaison) :

Adventices	STADE DE L'ADVENTICE		
	2-3 feuilles	Début tallage	Fin tallage/ Montaison
Agrostis	Très sensible	Très sensible	Très sensible
Brôme	Très sensible	Très sensible	Sensible
Folle-avoine	Très sensible	Très sensible	Sensible
Ray-grass*	Très sensible	Sensible	Faiblement sensible
Vulpin*	Très sensible	Très sensible	Très sensible
Dicots / Erodium	Très sensible	Très sensible	Très sensible
Sétaire	Très sensible	Très sensible	Sensible
Panic	Très sensible	Très sensible	Sensible
Digitaire	Très sensible	Très sensible	Sensible

\* Hors situation de résistance aux FOPS

Sensibilité de l'adventice à AMBITION® ■ Très sensible ■ Sensible ■ Faiblement sensible

**Réaliser le traitement sur des adventices peu développées et en conditions poussantes (respectées durant 48h) afin que l'efficacité soit optimale.**

- AMBITION® est un herbicide (traitement des parties aériennes), efficace sur un grand nombre de graminées annuelles et vivaces. Il doit être appliqué sur des **adventices levées, mais avant la montaison**. Son action est très rapide.
- Sur **graminées annuelles**, l'efficacité se manifeste déjà 4 jours après le traitement et les adventices sont détruites au bout d'une vingtaine de jours.
- Chez les **graminées vivaces**, le propaquizafop migre vers les rhizomes en 3 semaines environ. Cependant, en conditions froides et sèches, le temps d'action du produit est plus long (de l'ordre d'un mois), mais le niveau d'efficacité est similaire.
- AMBITION® est également efficace sur **érodium jeune**.



# VITIS

La bonne dose contre les adventices

Pour connaître la quantité nécessaire de produit à utiliser sur votre parcelle, téléchargez l'application VITIS sur notre site internet [www.adama.com](http://www.adama.com)

## AMBITION®

### Composition

100 g/L de propaquizafop

### Formulation

EC - Concentré émulsionnable

### Conditionnement

Bidon 5L

AMBITION® : AMM N°8800199 - EC - Concentré émulsionnable - 100 g/L de propaquizafop - Danger - H304 • H319 • H411 • EUH066 • EUH208 • EUH401. Respectez les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi mentionnés sur l'étiquette du produit et/ou consultez [www.adama.com](http://www.adama.com) et/ou [www.phytodata.com](http://www.phytodata.com). Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. \*Marque déposée Adama France s.a.s. - RCS N° 349428532. Agrément n° IF01696 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Juin 2021. Annule et remplace toute version précédente.

## AMBITION®

DANGER

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

EUH208 : Contient du propaquizafop. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

