



PACK STELVIO

L'association SDHI – Multisite
pour protéger vos céréales durablement



✓ **Association originale**
SDHI Systémique et contact multisites

✓ **La SDHI leader du marché**
Associée à un multisite efficace et unique MO4

✓ **Protection durable**
Préservation des unisites et rentabilité des céréales

PACK STELVIO :
2*5L de PIOLI® + 2*5L SESTO®

PIOLI®

Composition:

Fluxapyroxad 62,5 g/L.

Mode d'action: Substance inhibitrice de la Succinate Déshydrogénase. Fongicide systémique permettant une longue durée d'action.

Conditionnement: 2 bidons de 5L

SESTO®

Composition:

Folpel 500 g/L.

Mode d'action: Fongicide foliaire de contact à action préventive sur septoriose, substance active multisite active sur toutes les souches de septorioses du blé (dont celles résistantes)

Conditionnement: 2 bidons de 5L

PACK STELVIO

USAGES AUTORISÉS

Produit	Libellé de l'usage	Culture associée	Dose d'emploi maximal	Nombre maximum d'application	Stade d'application	Délai avant récolte (jours)	Intervalle minimum entre les applications	Zone Non Traitée
SESTO®	Blé*Septoriose	Blé Epeautre Triticale	1,5L/ha	2/an	Entre les stades BBCH30 et BBCH 59	42	14 jours	20 m (dont DVP *20) pour 2 applis /an
	Orge*Rhynchosporiose Orge*Helminthosporiose et Ramulariose	Orge d'hiver Et printemps						20 m (dont DVP* 5m) pour 1 appli / an DSR : 3M
PIOLI®	Blé*septoriose Blé*Piétin verse Blé*oidium Blé*Rouilles	Blés Triticale Epeautre	2L/ha	1/an	Entre les stades BBCH25 et BBCH 69	35	/	5 mètres
	Orge*Rhynchosporiose Orge*Helminthosporiose et Ramulariose Orge*Oidium Orge* Piétin verse Orge*Rouilles	Orge d'hiver et printemps						

SESTO®

Composition
500 g/L Folpel

PIOLI®

Composition
Fluxapyroxad 62,5 g/L


* DVP = Dispositif Végétal Permanent
Sous réserve du respect des articles 12, 14 et des conditions mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 12 septembre 2006

ADAMA France ne préconise l'utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l'élargissement de son utilisation à d'autres cultures et cibles telles que prévues par le catalogue des usages fixé par l'arrêté du 26 mars 2014.
Ainsi, l'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques éventuels de non-conformité de cet élargissement permis par ce catalogue. Limites maximales de résidus : se reporter aux LMR définies au niveau de l'Union Européenne, consultables à l'adresse : <http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database>
Délai de rentrée des travailleurs sur la parcelle : 48 heures après traitement conformément à l'arrêté du 4 mai 2017 modifié par l'arrêté du 27 décembre 2019.

DESCRIPTIF DU PRODUIT

MODE D'ABSORPTION PIOLI®

Absorption PIOLI® sur feuille de céréale




SPECTRE D'EFFICACITE

STELVIO 1+1	Rouille Jaune	Septoriose	Rouille brune	
	★★	★★★★	★★★	
	Rouille Naine	Rhynchosporiose	Helminthosporiose	Ramulariose Grillure Polliniques
	★★	★★★	★★★	★★★★

STADES D'APPLICATION

PIOLI® 1L/ha + Sesto® 1L/ha



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas utiliser en présence d'abeilles et autres pollinisateurs
- Pour protéger les organismes aquatiques, respectez une zone non traitée de 20 mètres
- Traiter de façon préventive, notamment lorsqu'il s'agit de protéger la dernière feuille
- Traiter par temps calme, en absence de vent, pour éviter toute dérive sur les cultures voisines
- Veiller à utiliser une dose adaptée au contexte de la parcelle (sensibilité variétale, date de semis, météo, pression parasitaire, stratégie de traitement)
- La qualité de la pulvérisation (répartition homogène de la bouillie) et les conditions météorologiques au moment de l'application (température > 25°C et hygrométrie > 70%) participent à la réussite du traitement. Par temps chaud (> 25°C), traiter tôt le matin ou en soirée en fonction de l'hygrométrie.

SESTO® : AMM N° 2190321-SC-Suspension concentrée-Folpel 500 g/L-Attention-H317 • H319 • H351 • H400 • EUH401.

PIOLI® : AMM N° 2200891-EC- Concentré Emulsionnable - Fluxapyroxad 62,5g/L - Attention - H317 • H319 • H332 • H335 • H362 • H411

Respectez les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi mentionnés sur l'étiquette du produit et/ou consultez www.adama.com et/ou www.phytodata.com. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Marque déposée Adama France s.a.s.- RCS N° 349428532. Agrément n° IF01696 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Octobre 2022. Annule et remplace toute version précédente.

SESTO®

ATTENTION

- H317** : Peut provoquer une allergie cutanée
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux
H351 : Susceptible de provoquer le cancer
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques
EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement



PIOLI®

ATTENTION

- H317** : Peut provoquer une allergie cutanée
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux
H332 : Nocif par inhalation
H335 : Peut irriter les voies respiratoires
H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

ADAMA France s.a.s | 33 rue de Verdun | 92156 Suresnes Cedex | Tél. : 01 41 47 33 33 | www.adama.com

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.