



ADAMA

# BADGER®

Fongicide anti-mildiou  
en pomme de terre.  
Action préventive et curative.



## Solution Anti-mildiou

- Efficacité renforcée de hautes performances en applications préventives et curatives précoces.
- Efficace en condition de forte pression maladie.



# BADGER®

## DESCRIPTIF DU PRODUIT

Composition	Cymoxanil 40 g/Kg (4%) + Mancozèbe 465 g/Kg (46,5%).
Formulation	Poudre mouillable (WP).
Famille chimique	Le cymoxanil appartient à la famille des acétamides (FRAC U27), le mancozèbe à celle des dithiocarbamates (FRAC M03).
Conditionnement	Sac 12 Kg.

### CYMOXANIL

Matière active fongicide spécifique des mildioux et dotée de propriétés curatives et anti-sporulantes. Translaminare, elle pénètre dans les organes traités et permet de stopper une infection dans les 48h suivant la contamination.



### MANCOZÈBE


Fongicide de contact avec une efficacité protectrice contre de nombreux champignons pathogènes tels que le mildiou.

## CONDITIONS D'UTILISATION

BADGER® peut être utilisé dans le cadre d'un programme préventif ou curatif durant toute la période végétative, entre les stades BBCH 21 et 95. Les traitements devront être appliqués en cadence de 7 à 10 jours, à adapter selon la climatologie.

**Le nombre d'applications est limité à 6 en raison du risque de résistance.**

### POSITIONNEMENT



## TABLEAU DES USAGES AUTORISÉS

USAGES	DOSES	NB APPLI	DÉLAI AVANT RÉCOLTE	DRE*	ZNT
Pomme de terre Mildiou	2,5 Kg/ha	6/an	7 jours	48h	50m

\*DRE : Délai de réentrée plein champs exprimé en heures

### MÉLANGES

Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels. Pour plus d'informations, consulter le site : <https://ephy.anses.fr/>.

Dans tous les cas, il est recommandé d'effectuer des tests préalables de compatibilité physique.

### CONDITIONS DE STOCKAGE

- Ce produit doit être conservé dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la chaleur et du gel, dans des locaux frais, ventilés et fermés à clé.
- Tenir à l'écart de tout aliment et boisson, y compris ceux pour les animaux, et hors de portée des enfants.



© Ferolia

BADGER® : AMM N°2010602 - WP - Poudre mouillable - Cymoxanil 40 g/L (4%) + Mancozèbe 465 g/L (46,5%) - Attention - H317 • H319 • H335 • H361fd • H410 • EUH 401.

Respectez les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi mentionnés sur l'étiquette du produit et/ou consultez [www.adama.com](http://www.adama.com) et/ou [www.phytodata.com](http://www.phytodata.com). Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. ©Marque déposée Adama France s.a.s. - RCS N° 349428532. Agrément n° IF01696 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Avril 2020. Annule et remplace toute version précédente.

## BADGER®

### ATTENTION

**H317** : Peut provoquer une allergie cutanée.

**H319** : Provoque une sévère irritation des yeux.

**H335** : Peut irriter les voies respiratoires.

**H361fd** : Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

**H410** : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**EUH401** : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



ADAMA France s.a.s | 33 rue de Verdun | 92156 Suresnes Cedex | Tél. : 01 41 47 33 33 | [www.adama.com](http://www.adama.com)

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**