



ADAMA

# DAUPHIN® 0- 465 WDG

La solution fongicide à l'efficacité renforcée et  
raisonnée pour la pomme de terre.



FONGICIDE

**Solution  
Anti-mildiou**

**ASSOCIATION DE 2 SUBSTANCES  
ACTIVES COMPLÉMENTAIRES**

- **Mancozèbe** : produit de contact, multisite, préventif.
- **Cymoxanil** : produit translaminaire, curatif.

Simply. Grow. Together.

[ADAMA.COM](https://www.adama.com)

# DAUPHIN® 0-465 WDG


## DESCRIPTIF DU PRODUIT

Composition	Cymoxanil 40 g/Kg (4%) + Mancozèbe 465 g/Kg (46,5%).
Formulation	Granulés dispersables (WG).
Famille chimique	Le cymoxanil appartient à la famille des acétamides (FRAC U27), le mancozèbe à celle des dithio-carbamates (FRAC M03).
Conditionnement	Bidon 10 Kg.

## CONDITIONS DE TRAITEMENT

Le DAUPHIN® 0-465 WDG peut être utilisé jusqu'au stade BBCH 95 (Stade de la sénescence –50% feuilles brunes), avec un intervalle minimum de 7 jours.

## POSITIONNEMENT



## TABLEAU DES USAGES AUTORISÉS

USAGES	DOSES	NB APPLI	DÉLAI AVANT RÉCOLTE	DRE*	ZNT
Pomme de terre Mildiou	2,5 Kg/ha	6/an	7 jours	48h	50m
Porte graines* Mildiou Rouille blanche	2,5 Kg/ha	4/an	nc	48h	50m

\*DRE : Délai de réentrée plein champs exprimé en heures

\*Se reporter aux recommandations d'emploi de la FNAMSA (Tél : 02 41 80 91 00)

DAUPHIN® 0-465 WDG : AMM N°20400330 - WG - Granulés dispersables - Cymoxanil 40 g/Kg (4%) + Mancozèbe 465 g/Kg (46.5%) - Attention - H317 • H319 • H361fd • H410.

Respectez les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi mentionnés sur l'étiquette du produit et/ou consultez [www.adama.com](http://www.adama.com) et/ou [www.phytodata.com](http://www.phytodata.com). Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. \*Marque déposée Adama France s.a.s.- RCS N° 349428532. Agrément n° IF01696 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Février 2020. Annule et remplace toute version précédente.

## DAUPHIN® 0-465 WDG

### ATTENTION

**H317** : Peut provoquer une allergie cutanée.

**H319** : Provoque une sévère irritation des yeux.

**H361fd** : Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

**H410** : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



- 1 Facilité d'emploi des granulés dispersibles.
- 2 Produit à l'efficacité renforcée grâce à la synergie entre mancozèbe et cymoxanil.
- 3 Association de 2 matières actives pour une lutte et une protection raisonnée.

## PRÉPARATION DU TRAITEMENT

Préparation de la bouillie : DAUPHIN® 0-465 WDG s'applique en pulvérisation dans un volume de 200 à 400 L d'eau par hectare pour obtenir une répartition homogène sur la culture. Remplir à moitié d'eau la cuve du pulvérisateur. Ajouter la quantité requise de DAUPHIN® 0-465 WDG au cours du remplissage de la cuve et maintenir l'agitation pendant toute la durée de la préparation et de l'application de la bouillie.

## MÉLANGES

Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels. Pour plus d'information, consulter le site : <https://ephy.anses.fr/>.

Dans tous les cas, il est recommandé d'effectuer des tests préalables de compatibilité physique.



ADAMA France s.a.s | 33 rue de Verdun | 92156 Suresnes Cedex | Tél. : 01 41 47 33 33 | [www.adama.com](http://www.adama.com)

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**