ADAMA

# BELLALI®

## La meilleure des attaques, c'est une solide défense.



ADAMA.COM

FONGICIDE

**La stratégie fongicide intelligente et toujours gagnante**

- **Un fongicide performant sur tous les terrains :** blé, orge, triticale, seigle
- **Une défense solide contre les maladies des céréales :** septoriose, rouilles, ramulariose, helminthosporiose, rhynchosporiose
- **Un fongicide prêt à l'emploi à double mode d'action - dont un multisite unique - et sans triazole, pour contrer les résistances**
- **Un rendement gagnant dans vos champs**

ADAMA FOLPEL POWERED BY MSI Protech®

Listen ▸ Learn ▸ Deliver

ADAMA.COM

FONGICIDE

# Stades d'application




| | | |
|---|---|---|
| Blés / Orges | BELLALI® 1,5 L/HA | ZOYA® 0,75 L/HA - SESTO® 1 L/HA |
| Blés / Orges | BELLALI® 1,5 L/HA - ZOYA® 0,75 L/HA | |
| Orge Systiva | BELLALI® 2 L/HA | |

# Spectre d'efficacité

## Efficacité Blé




- BELLALI® 2,0 L/HA
- FOLPEL 1,5 L/HA
- AZOXYSTROBINE 0,6 L/HA

(X) NOMBRE D'ESSAIS MENÉS

## Efficacité Orge









- BELLALI® 2,0 L/HA
- FOLPEL 1,5 L/HA
- AZOXYSTROBINE 0,6 L/HA

(X) NOMBRE D'ESSAIS MENÉS

# Impact sur les rendements

## Rendement Blé

9 essais | 2021 - 2023
Double application

**+17.1 qx/ha**
vs témoin
**Soit 342 €/ha de gain***
*Pour un prix indicatif de 200 €/t de blé




## Rendement Orge

10 essais | 2021 - 2023
Double application

**+7.4 qx/ha**
vs témoin
**Soit 144 €/ha de gain***
*Pour un prix indicatif de 195 €/t d'orge




# Le folpel

## Un fongicide multisite indispensable

Le folpel est le seul fongicide de contact à action multisite classé MO4 selon le FRAC (Fungicide Resistance Action Committee). Son mode d'action multisite repose sur l'inhibition de plusieurs processus biologiques des agents pathogènes, limitant ainsi leur capacité à développer des résistances.

POWERED BY
**MSI Protech**

### Le folpel

Fongicide multisite de contact, formant une barrière protectrice sans pénétration dans les tissus

### MSI

- Multisite agit sur plusieurs cibles (adaptation difficile du champignon)
- **Mode d'action unique FRAC** GROUPE M04 FONGICIDE

### PROTECH - Seul fongicide RESISTANCE BREAKER utilisé en céréales*

- Septoriose dont les souches CarR, CarHR (résistantes et hautement résistantes aux SDHI) et MDR (Multi-résistantes)
- Helminthosporiose
- Ramulariose
- Mildiou, blackrot, excoriose (secondaire oïdium/botrytis) de la vigne

### Formulation innovante

- Meilleur mouillage
- Diffusion plus efficace et plus rapide du fongicide dans la plante
- Couche protectrice uniforme

(* RÉSEAU PERF 23X24) - (* ÉTUDE ADAS 23)

Le **FRAC** (Fungicide Resistance Action Committee) recommande l'utilisation des multisites dans le management des résistances

Plus d'informations en flashant ce code

# BELLALI®

## Deux modes d'action




AZOXYSTROBINE — GROUPE 11 FONGICIDE

FOLPEL — FOLPEL — GROUPE M04 FONGICIDE

AZOXYSTROBINE + FOLPEL

GROUPE 11 FONGICIDE

GROUPE M04 FONGICIDE

### Composition

75 g/L azoxystrobine
375 g/L folpel

### Conditionnement

Bidon de 5L

### Formulation

SC

### Famille chimique

L'azoxystrobine appartient à la famille des strobilurines.

Le folpel est un multisite de la famille des phtalimides.

## Tableau des usages autorisés

| Culture | Cibles | Dose max. d'emploi | Nombre max. d'applications | Stade d'application | Délai avant récolte (jours) | Zone non traitée aquatique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blé dur d'hiver, blé tendre d'hiver, blé dur de printemps, blé tendre de printemps, tritordeum | Helminthosporiose, septoriose, rouille(s) dont rouille jaune et rouille brune | 2L/ha | 1/an/culture | Entre les stades BBCH 30 et BBCH 59 | BBCH 59 max | 20 mètres (dont DVP 5 mètres) |
| Triticale | Septoriose, rouille(s) | | | | | |
| Orge d'hiver, orge de printemps | Helminthosporiose, ramulariose, rhynchosporiose, rouille(s) dont rouille naine | 2L/ha | 1/an/culture | Entre les stades BBCH 30 et BBCH 59 | BBCH 59 max | 20 mètres (dont DVP 5 mètres) |
| Seigle | Rhynchosporiose, rouille(s) | 2L/ha | 1/an/culture | Entre les stades BBCH 30 et BBCH 59 | BBCH 59 max | 20 mètres (dont DVP 5 mètres) |

DVP : dispositif végétalisé permanent.

Délai de rentrée sur la parcelle : 48 heures après traitement.

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :
- l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement ;
- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents.
- Spe2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45% pour des applications sur céréales d'hiver
- Spe8 : Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas utiliser en présence d'abeilles et autres insectes pollinisateurs.

BELLALI® : AMM N° : 2250086 - SC - azoxystrobine 75 g/L + Folpel 375 g/L - Attention : H317, H319, H332, H351, H410

ZOYA® : AMM N° : 2240236 - EC - Concentré émulsionnable - prothioconazole 150g/L + fluxapyroxade 75g/L - Danger : H315, H318, H362, H411

AZOXYSTROBINE - Danger : H331, H400, H410

FOLPEL - Danger : H332, H319, H317, H351, H400

Respectez les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi mentionnés sur l'étiquette du produit et/ou consultez www.adama.com et/ou www.phytodata. com. Avant touteutilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santéhumaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. ®Marque déposée Adama Frances.a.s.- RCS N° 349428532. Agrément n° IF01696 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Septembre 2025. Annule et remplace toute version précédente.

### BELLALI®

**ATTENTION**

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux
H332 : Nocif par inhalation
H351 : Susceptible de provoquer le cancer
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### ZOYA®

**DANGER**

H315 : Provoque une irritation cutanée
H318 : Provoque de graves lésions des yeux
H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

ADAMA France s.a.s | 33 rue de Verdun | 92156 Suresnes Cedex | Tél. : 01 41 47 33 33 | www.adama.com

**PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**