

Pack RIO

5L IRYNA® + 5L SESTO®



GRUPE 3/7 FONGICIDE


GRUPE M04 FONGICIDE

COMPOSITION

- IRYNA® : 150 g/L prothioconazole
+ 75g/L fluxapyroxade
- SESTO® : 500 g/L folpel



Les résistantes aux principales maladies de l'orge sont déjà très développées.
Le FRAC classe les maladies de l'orge par risque de dérive :



Orge		Ramulariose	Helminthosporiose	Rhynchosporiose
Strobilurines				
Triazoles				
SDHI				
SESTO®				

	Présence de résistance		Efficace et pas de résistance connue
	Dérive d'efficacité		Efficace en France, mais présence de résistance en Europe

Etat de la résistance sur blé en France:



Blé	TRIMR Phénotypes moyennement résistants aux triazoles (IDM)	TriHR Phénotypes hautement résistants aux triazoles	MDR Phénotypes hautement résistants à toutes les triazoles et phénotypes faiblement résistants aux SDHI	Car R Phénotypes résistants aux SDHI	Car HR Phénotypes hautement résistants aux SDHI
Triazoles					
SDHI					
SESTO®					

	Pas de résistance, efficace		Résistance moyenne		Résistance très forte
	Résistance moyenne		Résistance forte		

IRYNA® sécurise votre programme

La technologie **ASORBITAL®** améliore la pénétration de IRYNA® dans la feuille : le fongicide est efficace plus rapidement et le délai avant la pluie est réduit.

Pour en savoir plus :
flashez ce QR code




Usages autorisés


IRYNA®

	Libellé de l'image	Culture	Dose maximum d'emploi	Nombre maximum d'applications/an	Stade d'application	Zone non traitée aquatique
Blés	Septoriose(s)	Blés dur d'hiver Blés tendre d'hiver Blés dur de printemps Blés tendre de printemps Triticale Épeautre Tritordeume et autres hybrides du blé	1,25L/ha	1/an	Entre BBCH 30 et BBCH 69 (début montaison à fin floraison)	5m dont DVP 5m
	Rouilles(s)					
	Helminthosporiose					
	Fusarioses					
	Fusariose microdochium					
Orges	Helminthosporiose et ramulariose	Orges d'hiver Orges de printemps	1,25L/ha	1/an	Entre BBCH 30 et BBCH 59 (début montaison à fin épiaison)	5m dont DVP 5m
	Rhynchosporiose					
	Rouille(s)					
Seigle	Rhynchosporiose	Seigle	1,25L/ha	1/an	Entre BBCH 30 et BBCH 59 (début montaison à fin épiaison)	5m dont DVP 5m
	Rouille(s)					

SESTO®


	Libellé de l'usage	Culture associée	Dose max. d'emploi	Nombre max. d'applications	Stade d'application	Délai avant récolte (jours)	Intervalle mini. entre les applications	Zone non traitée
Blé	Septoriose(s)	Blé tendre	1.5L/ha	1/an	Entre les stades BBCH 30 et BBCH 59	42 jours	14 jours	20 mètres (dont DVP 5)
	Septoriose(s)	Blé tendre	1.5L/ha	2/an	Entre les stades BBCH 30 et BBCH 59	42 jours	14 jours	20 mètres (dont DVP 20)
Orge	Rhynchosporiose Helminthosporiose Ramulariose	Orge d'hiver et de printemps	1.5L/ha	1/an	Entre les stades BBCH 30 et BBCH 59	42 jours	14 jours	20 mètres (dont DVP 5)
	Rhynchosporiose Helminthosporiose Ramulariose	Orge d'hiver et de printemps	1.5L/ha	2/an	Entre les stades BBCH 30 et BBCH 59	42 jours	14 jours	20 mètres (dont DVP 20)

Orge	Rouille naine 8 essais	Helminthosporiose 38 essais	Rhynchosporiose 40 essais	Ramulariose 28 essais
				
	+++	+++	++++	++++

Blé	Rouille brune 13 essais	Rouille jaune 11 essais	Helminthosporiose 8 essais	Septoriose 52 essais	Fusariose 22 essais
					
	++++	++++	++++	++++	++

*doses et programmes à adapter en fonction de la sensibilité variétale et des conditions climatiques

Stades d'application optimaux



Dosage : 0,8 à 1 L/ha IRYNA® + 0,8 à 1 L/ha SESTO®

SESTO® : AMM N°2190321 - SC - Folpel 500g/L

IRYNA® : AMM N° : 2240236 - EC - Concentré émulsionnable - prothioconazole 150g/L + fluxapyroxade 75g/L

Respectez les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi mentionnés sur l'étiquette du produit et/ou consultez www.adama.com et/ou www.phytodata.com. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. ©Marque déposée Adama France s.a.s. - RCS N° 349428532. Agrément n° IF01696 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Novembre 2024. Annule et remplace toute version précédente.

IRYNA®

ATTENTION

H315 : Provoque une irritation cutanée.

H318 : Provoque de graves lésions des yeux. H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.

H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

SESTO®

ATTENTION

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

H351 : Susceptible de provoquer le cancer. H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques.

EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

