



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 9 - 5 - 2011
Αριθ. πρωτ: 96532

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 928 7228
e-mail: svg064@minagric.gr

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθν. Αντιστάσεως 73
152 31 Χαλάνδρι
(με απόδειξη)

- Κοιν.:
1. Γραφείο Υπουργού Κ. Σκανδαλίδη
 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Κουτσούκου
 3. Περιφερειακές Ενότητες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Έδρες τους
 4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους
 6. ΕΣΥΦ Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
 7. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/νσής μας
-Γραμματεία της Δ/νσής μας
 8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων Λιδότου 26, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 7580/12-7-1999 οριστικής έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος MISTRAL 70 WG (ζιζανιοκτόνο) ως προς τον παρασκευαστή και το εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο., το εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, την εγγυημένη σύνθεση και την ημερομηνία λήξης του.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.

2. Τη με αριθ. 100585/12.7.1999 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **7580** οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **MISTRAL 70 WG** και την υπ' αριθ. 120178/21.1.2005 Απόφασή μας με την οποία τροποποιήθηκε.
3. Την με αριθμ. 121795/07.09.07 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β'1880/14-9-2007) με την οποία η δραστική ουσία **METRIBUZIN** καταχωρίστηκε στο Παράρτημα Ι του Π.Δ. 115/97.
4. Το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154 Α').
5. Τη με αριθ. 271752/21-10-2010 (ΦΕΚ 1673/Β'/21-10-2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη-Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο».
6. Τις με αριθμ. πρωτ. 132825/30-9-2009 και 94950/31-3-2011 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

A Τροποποιούμε τη με αριθ. **7580** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **MISTRAL 70 WG** η οποία η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 100585/12.7.1999 και τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 120178/21.1.2005 Απόφασή μας, ως προς τον παρασκευαστή και το εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο., το εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, την εγγυημένη σύνθεση και την ημερομηνία λήξης του και η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

7580
12-07-1999
30-09-2011

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

MISTRAL 70 WG
ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

1.3 Δραστική ουσία (εξ)

- α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσίας/ών κατά ISO
- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

METRIBUZIN

93 % (β/β) min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Agan Chemical Manufacturers, Ltd.
Street: Northern Industrial Zone
P.O.Box 262
77102 Ashdod - Israel
Contact person: Dr. Tali Ehrlich
Telephone No.: +972 8 6296 761
Telefax No.: +972 8 6296 848
E-mail: tali.ehrlich@ma-industries.com

Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη:
Feinchemie Schwebda GmbH
Edmund-Rumpler-Straße 6
51149 Köln - Germany
Contact person: Mattias Bülig
Telephone No.: +49-2203-5039-511
Telefax No.: +49-2203-5039-0511
E-mail: mattias.buelig@fcs-feinchemie.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Yancheng South Chemicals Co., Ltd*, Κίνα

*a production plant of Nutrichem Laboratory Co. Ltd
Nutrichem Laboratory Co. Ltd, Κίνα

(η δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και ευρίσκεται στο παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας metribuzin προσδιορίζονται στο παράρτημα J της υπ. αριθ. πρωτ. 122779/28-09-2007 αίτησης της εταιρείας και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθν. Αντιστάσεως 73
Τ.Κ.: 15231- Χαλάνδρι
Τηλ.: 211 120 5570
Fax: 211 120 5572
E-mail: martha.paissiou@alfagro.gr
technical@alfagro.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

Ο κάτοχος της έγκρισης
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Feinchemie Schwebda GmbH
Edmund-Rumpler-Straße 6
D-51149 Köln
Γερμανία
Mr. Mattias Bülig
Τηλ. +49-2203-5039-511
FAX +49-2203-5039-0511
E-Mail: mattias.buelig@fcs-feinchemie.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Agan Chemical Manufacturers Ltd., Ισραήλ
(η δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και ευρίσκεται στο παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Agan Chemical Manufacturers Ltd.**, Ισραήλ
2. **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**
Οινόφυτα, Βοιωτία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία **70 % (β/β)**
Βοηθητικές ουσίες **24,73 % β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος κατατέθηκε με την με αριθμ. πρωτ. **125836/4-2-2009** αίτηση της εταιρείας και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2 Συσκευασία(ες)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερική σακούλα	100 και 500 γραμ 5 κιλά	Κουτί χάρτινο με εσωτερική σακούλα PE Κουτί χάρτινο με εσωτερική σακούλα PE ή Κουτί χάρτινο με εσωτερική επίστρωση PE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Απαγορεύεται η εφαρμογή του στα θερμοκήπια.

Τρόπος εφαρμογής:

Το MISTRAL 70 WG εφαρμόζεται πριν ή μετά το φύτευμα τόσο των καλλιεργειών όσο και των ζιζανίων. Πριν την εφαρμογή του, προετοιμάστε καλά το χωράφι, ώστε να είναι ψιλοχωματισμένο. Η συνιστώμενη κατά περίπτωση δοσολογία εφαρμόζεται με 20-50 λίτρα νερού/στρ. Οι διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες (αυλάκωμα, παράχωμα, κ.λ.π.) πρέπει να γίνονται πριν την εφαρμογή του προϊόντος. Η ύπαρξη αρκετής υγρασίας στο έδαφος κατά την εφαρμογή του ευνοεί τη δράση του σκευάσματος. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm.). Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με το 1/3 – 1/2 του απαιτούμενου νερού. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε τη προδιάλυση του φαρμάκου στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: Το σκεύασμα εφαρμόζεται μόνο του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Οι σακούλες μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστώδων και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες πατάτας, τομάτας, μηδικής, σόγιας, καρότου και σπαραγγιού.

5

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γραμμάρια σκευάσματος /στρέμμα	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα / στρέμμα		
Καρότο	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	50	40-50	ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΑ: Εφαρμογή όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 4 φύλλων.	1

Τομάτα υπαίθρου	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	40	40-50	<p>A. Προφυτρωτικά: Εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά μέχρι το κέντρωμα των σπόρων</p> <p>Ή</p> <p>B. Μεταφυτρωτικά: Εφαρμογή στο στάδιο των 2-4 πραγματικών φύλλων μετά από αυλάκωμα ή το σχηματισμό «τραπεζιών».</p> <p>Ή</p> <p>ΣΕ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΟΜΑΤΑ Εφαρμογή 20 ημέρες μετά τη μεταφύτευση και όταν τα φυτά έχουν «ριζοπιάσει» και έχουν 3-4 πραγματικά φύλλα. Όταν εφαρμόζεται στα σαμάρια και στα αυλάκια η δοσολογία μειώνεται ανάλογα με την ψεκαζόμενη επιφάνεια.</p>	1
Σπαράγγια	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	50-100	40-50	Πριν το φύτευμα της καλλιέργειας.	1
Σόγια	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	75-100	40-50	ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΑ Αμέσως μετά τη σπορά.	1
Πατάτες	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	50-100	40-50	<p>A. ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΑ: Εφαρμογή από το φύτεμα μέχρι 3-4 ημέρες πριν το φύτευμα της καλλιέργειας.</p> <p>ή</p>	1
		50		<p>B. ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΑ: Εφαρμογή από την εμφάνιση των νεαρών βλαστών πατάτας έως το διάστημα που τα φυτά θα αποκτήσουν ύψος 5-10 εκ.</p> <p>ή</p>	1

		50 + 50		Γ. ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΑ + ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΑ: 1 ^η εφαρμογή λίγο πριν το φύτευμα της πατάτας και 2 ^η εφαρμογή όταν τα φυτά αποκτήσουν ύψος 5-10 εκ.	1+1
Μηδική	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	75-100	40-50	Εφαρμογή το χειμώνα στην περίοδο ληθάργου της καλλιέργειας.	1

Παρατηρήσεις:

1. Οι δόσεις είναι ανάλογα με το είδος του εδάφους. Οι χαμηλές δόσεις στα ελαφρά εδάφη, οι υψηλές δόσεις στα βαριά εδάφη.
2. Η **προφυτρωτική** εφαρμογή στην ΠΑΤΑΤΑ συνιστάται στις ποικιλίες: *Atica, Apollo, Arran-Banner, Fina, Kennebek, Claustar, Maryke, Ostara, Sebago, Spuda, Agria, Hermes, Hertha, Minerva, Nicola, Ovetlk*. Ειδικά για τις ποικιλίες *Colmo, & Jaerla* οι δοσολογίες είναι: 50-75 γρ./στρέμμα σε βαρεία ή μέσης σύστασης εδάφη και 50 γρ./στρέμμα σε ελαφρά εδάφη.
3. Η **μεταφυτρωτική** εφαρμογή στην ΠΑΤΑΤΑ συνιστάται στις ποικιλίες: *Arran-Banner, Kennebek, Claustar, Sebago, Spuda, Martona, Blance, Ausonia, Enzina, Arcula, Concurrent, Hermes, Crista, Mondial, Timate*.
4. Η εφαρμογή του σκευάσματος στην ΤΟΜΑΤΑ, (προφυτρωτικά - μεταφυτρωτικά), συνιστάται στις ποικιλίες: *Roma V.F., Super Roma, Super California, Roma Nova, Ventura, Napoli V.F., Red River, CAL J. Campbell 33, Perlita, Petomec, Heirtz 1706, AT 70/14, TOKO-70, ES 58, VF 65, VF 198,, Euromeck, ACE-55, Early Pack-7*. Στην ποικιλία *Fantastic* η εφαρμογή γίνεται μόνο στα αυλάκια, χωρίς να βρέχονται τα τοματόφυτα. Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιείται και στις υπόλοιπες ποικιλίες τομάτας σε δοσολογία 30 γρ./στρέμμα και με εφαρμογή μόνο με ψεκαστικό με μπάρα ή ψεκαστήρα πλάτης και μπεκ τύπου σκούπας.
5. Στις ευρωπαϊκές ποικιλίες ΣΟΓΙΑΣ πρέπει να γίνει δοκιμή ανεκτικότητας των φυτών σε μικρή κλίμακα.

<u>Καταπολεμούμενα ζιζάνια:</u>	
Βλήτα (<i>Amaranthus spp.</i>)	Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>)
Λασιάνα (<i>Lapsana communis</i>)	Ζωχός (<i>Sonchus spp.</i>)
Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i>)	Περδικούλι (<i>Parietaria sp.</i>)
Άνθεμις (<i>Anthemis arvensis</i>)	Τάτουλας (<i>Datura stramonium</i>)
Λάμιο (<i>Lamium sp.</i>)	Καπνόχορτο (<i>Fumaria officinalis</i>)
Κενταύριο (<i>Centaurea cyanus</i>)	Χαμομήλι (<i>Marticaria chamomilla</i>)
Σκαρολάχανο (<i>Mercurialis annua</i>)	Οξάλις (<i>Oxalis sp.</i>)
Παπαρούνα (<i>Papaver rhoeas</i>)	Πολυκόμπι (<i>Polygonum aviculare</i>)
Μαρτιάκος (<i>Senecio vulgaris</i>)	Αγριοσινάπι (<i>Sinapis arvensis</i>)
Σαπουνόχορτο (<i>Vaccaria pyramidata</i>)	Αγριοραδίκι (<i>Taraxacum officinale</i>)
Τσουκνίδα (<i>Urtica spp.</i>)	Βερονίκη (<i>Veronica sp.</i>)
Πικραλίδα ή Χοιροβότανο (<i>Picris sp.</i>)	Αλεπονουρά (<i>Alepecurus myosuroides</i>)
Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>)
Ήρα (<i>Lolium spp.</i>)	Πόα (<i>Poa sp.</i>)
Σετάρια (<i>Setaria sp.</i>)	Σκυλόχορτο (<i>Pulicaria dysenterica</i>)
Ελευσίνα (<i>Eleusine indica</i>)	Αγκάθι, (<i>Xanthium spp.</i>)

Σκυλάκι, (<i>Antirrhinum</i> sp.) Βραχιάρα, (<i>Brachiara</i> spp.)	Αγριοκαρδαμούδα, (<i>Lepidlum</i> sp) Κομελίνα, (<i>Commelina</i> sp.)
Ανθεκτικά ζιζάνια:	
Αγριοβρώμη (<i>Avena</i> sp.) Μεγάλη κολλητσίδα (<i>Gallium aparine</i>) Στύφνος ή αγριοντοματιά (<i>Solanum nigrum</i>).	Κίρσιο (<i>Cirsium arvense</i>) Μολόχα (<i>Malva</i> spp.)

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα.
- SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- SZ3 Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην ίδια περίοδο μπορεί να καλλιεργηθεί, μετά από όργωμα του χωραφιού, πατάτα, τομάτα ή καλαμπόκι.
- SZ4 Αποφεύγετε τη χρήση του σε αμμώδη εδάφη σε εδάφη με περιεκτικότητα οργανικής ουσίας μεγαλύτερη από 6% σε οργανική ουσία.
- SZ5 Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- SZ6 Αν ρυπανθούν τα νερά άρδευσης να μη χρησιμοποιηθούν.
- SZ7 Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
- SZ8 Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- SZ12 Μετά τον ψεκασμό ξεπλύντε πολλές φορές τα ψεκαστικά μέσα με άφθονο νερό.
- Κατά τους θερινούς μήνες αποφεύγετε να ψεκάζετε τις ζεστές ώρες της ημέρας.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην ίδια περίοδο μπορεί να καλλιεργηθεί, μετά από όργωμα του χωραφιού, πατάτα, τομάτα ή καλαμπόκι

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις καλλιέργειες και ποικιλίες που αναφέρονται στην ετικέτα.

9 Σήμανση σκευάσματος:

N- Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10 Φράσεις R

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

11 Φράσεις S

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε.
S29/56 Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.
S57 Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περίβλημα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.
S61 Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
Sp1 – ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

«Για να αποφύγετε κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Συμπτωματική θεραπεία.
 Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:(210) 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) Metribuzin

Φυτικά προϊόντα

Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες	60

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε μέρος δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες κάτω των 35 0°C, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

I. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

E. XATZH