

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα. Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτικά ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Μαζέψτε τη χυμίνη ποσότητα. Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτη σε εγκεκριμένους τύπους απομάκρυνσης χημικών αποβλήτων/συσκευασιών.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**



Τα κενά συσκευασίας, μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκόσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρουπίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας με φυτική κάλυψη 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις εξής καλλιέργειες: καπνός, σόγια, ελιαιοκράμβη, φυλλώδη και ριζωματώδη και καρποφόρα λαχανικά και 5 μέτρα για το βαμβάκι.

*Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*

**Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:**  
**Σε περίπτωση έκθεσης ή αδιαθεσίας,** καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέττα.  
**Σε περίπτωση εισπνοής,** εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.  
**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
**Σε περίπτωση κατάποσης,** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέττα.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.  
**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777



**ΛΕΜΠΡΟΝ:**

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο. Καταπολεμά έντομα εδάφους. Παρεμποδίζει τη λειτουργία των διαύλων ιόντων νατρίου (sodium channel modulator) προκαλώντας παρατεταμένο άνοιγμα αυτών, που οδηγεί σε υπερευστασία του νευρικού συστήματος, διακοπή της διατροφής, παράλυση και τελικά το θάνατο του εντόμου. Δρα δι' επαφής μέσω της απορρόφησης του από την επιδερμίδα, αλλά έχει και κάποια δράση διά του στομάχου. Δεν είναι διασυστηματικό αλλά έχει δράση με σπινός. Έχει γρήγορη αρχική δράση (knockdown effect) και αρκετή υπολειμματική διάρκεια. Επιπλέον, λόγω των σπινών που δημιουργούνται στην εδαφική ζώνη, τα έντομα απομακρύνονται και δεν πλησιάζουν τα φυτά στη γραμμική εφαρμογή.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

Εφαρμόζεται με διανομέα κοκκώδων που προσαρμόζεται στην οπαρτική-φυτευτική μηχανή και ακολουθεί ενσωμάτωση (σε βάθος 3-5 εκ.). Μετά την εφαρμογή του πρέπει να γίνεται προσπίεση για την πλήρη ενσωμάτωση των κόκκων που έπεσαν στα όκρα του χωραφιού.

**ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

**ΖΑΧΑΡΟΥΓΛΙΑ:** Έντομα εδάφους: Σιδηροκούληκα, Αταμίρια, Άητες, Σύμφυλα, Τιπούλια. Δόση: 1200-1500 γρ./στρέμμα. Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση.  
**ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ-ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ-ΣΟΡΓΟ:** Σιδηροκούληκα, Αγροτίδα ή καραφισιέ, Υλέμιο, Άητες. Δόση: 1200-1500 γρ./στρέμμα. Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση.  
**ΗΛΙΑΝΘΟΣ-ΣΟΓΙΑ:** Σιδηροκούληκα, Αγροτίδα ή καραφισιέ, Υλέμιο, Άητες, Δόση: 1200-1500 γρ./στρέμμα. Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση.  
**ΒΑΜΒΑΚΙ:** Σιδηροκούληκα, Αγροτίδα ή καραφισιέ, Υλέμιο, Άητες. Δόση: 1000-1500 γρ./στρέμμα. Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση.  
**ΛΑΧΑΝΙΚΑ (1)** (Γομάτα-Μελιτζάνα-Πεπόνι-Καρπούζι-Λάχανο-Κουνουπίδι-Σέλινό-Μαράθος-Μαρούλι-Άηθα Σαλατικά υπαίθρου Ιλυοτριβόλο-Σκαρόλες (πικρήλα)/Πλάτυφυλλα Αντίδια-Γαιοκάρδαμο-Κάρδαμο-Ρόκα-Κόκκινο Σινάπι-Νεαρά φύλλα και μίσχοι των καλλιέργειών τουμεριπαιθρανομικής της κράμβης) που συγκοιούνται μέχρι το στάδιο του δου πραγματικού φύλλου-Γογγυλι-Γουλι-Φασόλι με Ροδό-Μπιζέλι με Ροδό: Σιδηροκούληκα, Αγροτίδα ή καραφισιέ, Υλέμιο, Άητες, Μηλοπόνθη, Τιπούλια. Σιδηροκούληκα, Καρτόμυγα, Ξευτοηλιεπιές ριζοσπασμα. Δόση: 1000-1500-2000 γρ./στρέμμα. Κατά τη σπορά ή φύτευση με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση.  
**ΚΑΠΝΟΣ:** Σιδηροκούληκα, Αγροτίδα ή Καραφισιέ, Τιπούλια. Δόση: 1200-1500 γρ./στρέμμα. Κατά τη σπορά ή φύτευση με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση.  
**ΕΛΙΑΚΡΑΜΒΗ:** Χρυσές Πρασινές σπινάκιες, Κευθόρρυγχος, Άητες, Σκαβόρι της γύρας. Δόση: 1200-1500 γρ./στρέμμα. Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση.

*Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιέργειας περίοδο:* Μία (1) εφαρμογή.

**Παρατηρήσεις:**

1) Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του αναμενόμενου επιπέδου προστασίας και του ιστορικού της περιοχής. 2) Για τις χρυσές πρασινές σπινάκιες, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της ελαιοκράμβης από τη χρήση του σκευάσματος. Για την εν λόγω χρήση ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές απουσίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΕΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:**

Συνιστάται αναβολή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανώπτηνης ανθεκτικότητας των εντόμων. Ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των προνυμφών του εντόμου του *Diabrotica virgifera* στον αραβόσοτο, λόγω της μειωμένης κινητικότητας που εμφανίζουν, συνιστάται η εφαρμογή της αμειψισποράς ως ακολούθως: α) 1:2 (δηλαδή στα 2 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσοτο). Εκτός του αραβόσοτου προτείνονται οι ετήσιες καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, η ελαιοκράμβη, ο βίκος, τα τεύτλα, η πατάτα ή τα κημερινά σπανά ή β) 1:3 (δηλαδή στα 3 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσοτο). Εκτός του αραβόσοτου προτείνεται η καλλιέργεια της μηδικής, ή άλλα φυτά όπως της παραγράφου α). Στο πρόγραμμα αμειψισποράς να αποφεύγεται η καλλιέργεια της σόγιας, διότι υπάρχουν στοιχεία ότι στην αμειψισπορά αραβόσοτου/σόγιας το έντομο αυτό έχει προσαρμοστεί και ωθεθεί στα φυτά της σόγιας (γιατί είναι συνήθως ανθισμένα όταν πετούν τα ακμια).

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:**

Σε περίπτωση επανεισόδου, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:**


Όλες οι καλλιέργειες του φάσματος δράσης: Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής.

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:**

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις αναγραφόμενες στην ετικέττα του προϊόντος οδηγίες χρήσης.

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:**

Το σκεύασμα αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα και ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.



**UN 3077**  
**ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS**  
**SUBSTANCE, SOLID,**  
**N.O.S., (Tefluthrin)**



**Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο. Καταπολεμά έντομα εδάφους.**

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:**  
Tefluthrin .....0,5% β/β  
Βοηθητικές ουσίες .....99,5% β/β

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες**

Αριθμός Παρτίδας:	ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία παραγωγής:	

A.A.Δ.A.: 14694/10.04.2019

**ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 10 ΚΙΛΑ**



Κάτοχος της Άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  
**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι  
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559