



HERBOLEX 36 SL



ADAMA



ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

SL - Πυκνό διάλυμα

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού.



Εγγυημένη Σύνθεση

- Glyphosate οξύ 36% β/ο
 - (Υπό μορφή άλατος ισοπροπιλαμίνης 48,5% β/ο)
- Βοηθητικές ουσίες:** 56,10% β/β



Πεδίο εφαρμογής

Διάφορες καλλιέργειες



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

A.A.Δ.Α.: 70343/24.07.2019

Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 211205555, Φαξ: 211205559, Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



1 ΛΙΤΡΟ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και προστατευτικά γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου, θα πρέπει να φοράτε μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακρά μανίκια. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους: ●Να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη, ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού κατά 50% για τα Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Κιτριά), Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά), Αμπέλι, Ελιά, Καπνός, και τους Αγρούς μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά. ●Να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη, ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 75% κατά την εφαρμογή κατά μήκος Αρδευτικών και Στραγγιστικών καναλιών και σε Ακαλλιέργητες Εκτάσεις.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια

ΟΜΑΔΑ G ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης, χορηγήστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μην χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα από τον χώρο έκθεσης, διατηρήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση δηλητηρίασης ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Η χρήση ατροπίνης και οξιμής δεν ενδείκνυται.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

Για τις εφαρμογές μετά την συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκατεσσάρων (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

●Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια. ●Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Κιτριά, Αμυγδαλιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Αμπέλι (Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα), Ελιά, Καπνός, Βαμβάκι: **7 ημέρες.** Ακαλλιέργητες εκτάσεις, Κατά μήκος αρδευτικών & στραγγιστικών καναλιών: **Δεν εφαρμόζεται.**

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον.

LB00261PFR_01



HERBOLEX 36 SL



ADAMA



ZIZANIOKTONO

SL - Πυκνό διάλυμα

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών ζιζανίων, Ξυλωδών φυτών καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού.



Εγγυημένη Σύνθεση

- Glyphosate οξύ 36% β/ο
 - (Υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης 48,5% β/ο)
- Βοηθητικές ουσίες:** 56,10% β/β



Πεδίο εφαρμογής

Διάφορες καλλιέργειες



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
 Α.Α.Δ.Α.: 70343/24.07.2019
 Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559, Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



NO VARNISH AREA

1 ΛΙΤΡΟ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και προστατευτικά γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου, θα πρέπει να φοράτε μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους: ●Να αφήσετε μian αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη, ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού κατά 50% για τα Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Κιτριά), Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά), Αμπέλι, Ελιά, Καπνός, και τους Αγρούς μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά. ●Να αφήσετε μian αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη, ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 75% κατά την εφαρμογή κατά μήκος Αρδευτικών και Στραγγιστικών καναλιών και σε Ακαλλιέργητες Εκτάσεις.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως

ΟΜΑΔΑ G ZIZANIOKTONO

γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης, χορηγήστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μην χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα από τον χώρο έκθεσης, διατηρήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση δηλητηρίασης ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Η χρήση ατροπίνης και οξίμης δεν ενδείκνυνται.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

Για τις εφαρμογές μετά την συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκατεσσάρων (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

●Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια. ●Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:**

Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Κιτριά, Αμυγδαλιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Αμπέλι (Επιτραπέζια και Οinoποιήσιμα), Ελιά, Καπνός, Βαμβάκι: **7 ημέρες.**

Ακαλλιέργητες εκτάσεις, Κατά μήκος αρδευτικών & στραγγιστικών καναλιών: **Δεν εφαρμόζεται.**

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον.

Ανοιξτε εδώ

LL600281PRF_01

ΧΕΡΜΠΟΛΕΞ: Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστώδων, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών, προς αποφυγή τυχόν συσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς. Για την οροβάγχη στον καπνό εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκασμό καλύψεως της φυτείας. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Να μην χρησιμοποιείτε ακάθαρτο ή σκληρό νερό για την διάλυση του φαρμάκου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά - Μανταρινιά- Λεμονιά - Γκρέιπ φρουτ -Κιτριά) - ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά) - ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά-Αχλαδιά)- ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά-Ροδακινιά-Κερασιά) - ΑΜΠΕΛΙΑ (Επιτραπέζια & Οινοποιήσιμα) - ΕΛΙΑ: Ετήσια ζιζάνια* (αγρωστώδη και πλατύφυλλα). Δόση: 150-200 κ.εκ./στρ. Μολόχα, Τσουκνίδα, Πολυκόμπι, Αντράκλα. Δόση: 400-600 κ. εκ./στρ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. Μέγιστο: 2 εφαρμογές/καλλ. περίοδο. Πολυετή ζιζάνια**: Αγριάδα. Δόση: 750-1000 κ.εκ./στρέμμα. Βέλιουρας, Φτέρη. Δόση: 500 κ.εκ./στρ. Περικοκλάδα. Δόση: 1000 κ.εκ./στρ. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτήν. Κύπερη. Δόση: 1η εφαρμογή κατά την άνθηση με 600 κ.εκ./στρ, 2η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης με 500 κ.εκ./στρ. Μέγιστο: 2 εφαρμογές/καλλ. περίοδο. **ΒΑΜΒΑΚΙ***:** Ετήσια ζιζάνια* (αγρωστώδη και πλατύφυλλα). Δόση: 150-200 κ.εκ./στρ. Πολυετή ζιζάνια (Βέλιουρας [*Sorghum halepense*]). Δόση: 500 κ.εκ./στρ. Μία (1) εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης. **ΚΑΠΝΟΣ:** Οροβάγχη. Δόση: α) 40 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή με ψεκασμό καλύψεως, 40 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. β) 60 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή με ψεκασμό καλύψεως, 60 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. Μέγιστο: 2 εφαρμογές/καλλ. περίοδο. **ΑΓΡΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ή ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ:** Ετήσια ζιζάνια* (αγρωστώδη και πλατύφυλλα). Δόση: 150-200 κ.εκ./στρ. Μολόχα, Τσουκνίδα, Πολυκόμπι, Αντράκλα. Δόση: 400-600 κ.εκ./στρέμμα. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. Πολυετή ζιζάνια** (ως ανωτέρω): Δόση: 500-1000 κ.εκ./στρ. (ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου, ως ανωτέρω). Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. **ΑΚΑΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ:** Ετήσια ζιζάνια* (αγρωστώδη και πλατύφυλλα). Δόση: 150-200 κ.

εκ./στρ. Μολόχα, Τσουκνίδα, Πολυκόμπι, Αντράκλα. Δόση: 400-600 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. Μέγιστο: 2 εφαρμογές/καλλ. περίοδο. Πολυετή ζιζάνια** (ως ανωτέρω): Δόση: 500-1000 κ.εκ./στρ. (ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου, ως ανωτέρω). Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. Ξυλωδείς θάμνοι, δένδρα, βάτα, κ.λπ. Δόση: 500-1000 κ.εκ./στρ. Μία (1) εφαρμογή όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη. **ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΑΡΘΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ:** Υδροχαρή ζιζάνια. Δόση: 800-1000 κ.εκ./στρ. Μία (1) εφαρμογή κοντά ή κατά την άνθηση των ζιζανίων.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): Πορτοκαλιά-Μανταρινιά-Λεμονιά-Γκρέιπ φρουτ-Κιτριά-Αμυγδαλιά-Μηλιά-Αχλαδιά-Βερικοκιά-Ροδακινιά-Κερασιά-Αμπέλια (Επιτραπέζια & Οινοποιήσιμα)-Ελιά-Βαμβάκι-Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά-Ακαλλιέργητες εκτάσεις-Κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών (20-40), Καπνός (30-40).

(*) Για την καταπολέμηση ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται **συνήθως μία με δύο εφαρμογές** (χειμώνα-άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. (**) Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται **συνήθως μία εφαρμογή**, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. (***) **Στο βαμβάκι**, ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και το φύλλωμα των φυτών. **Προτείνεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτρών) γύρω από τα μπεκ.**

Παρατηρήσεις:

1) **Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια**, ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος, αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες ή αμπελώνες από το τρίτο (3ο) έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. 2) Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια: Μολόχες, Τσουκνίδες, Πολυκόμπι, Λπάτσα και Αντράκλα, η δόση κυμαίνεται από 400-600 κ.εκ/στρ., ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους. 3) Για την Αγριάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15-30 εκ. 4) Για την φτέρη, η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής. 5) Να μη γίνεται ψεκασμός εάν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες. 6) Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαράγωγη. 7) Μην ψεκάσετε όταν φυσάει. 8) Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους. 9) Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δέντρο. Δεν επιτρέπεται εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές. 10) Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

●Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην δραστική ουσία glyphosate.

●Σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων στα πρανή και με τρόπο ώστε σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος να μην πάνε στο νερό.