



# METEOR TF 36 SL



ZIZANIOKTONO



SL - Πυκνό διάλυμα

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση επήσιων και πολυετών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού.



## Εγγυμένη Σύνθεση

● Glyphosate οξύ .....	36% β/ο
● (Υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης .....	48,5% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες:	56,10% β/β



## Πεδίο εφαρμογής

Διάφορες καλλιέργειες



## Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες

### χρήστες

A.A.D.A.: 70183/06.12.2016

Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559, Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



## Σάρωση χρήση



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΥΤΟΠΡΟΤΑΞΙΑΣ



ADAMA

1  
ΛΙΤΡΟ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και προστατευτικά γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου, θα πρέπει να φοράτε ακρούμα και πουκάμισο με μακρύα μανίκια. Διάθεση του πειριχμένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό έξπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους: • Να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη, ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού κατά 50% για τα Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Κιτριά, Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά), Μήλοιειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά), Αμπέλι, Ελιά, Καπνός, και τους Αγρούς μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά. • Να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη, ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 75% κατά την εφαρμογή κατά μήκος Αρδευτικών και Στραγγιστικών καναλιών και σε Ακαλλιέργητες Εκτάσεις.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια

**ΟΜΑΔΑ G ZIZANIOKTONO**

με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης, χορηγήστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μην χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση εισιτονής, μεταφέρετε τον παθόντα από τον χώρο έκθεσης, διατρήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση δηλητηρίασης ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Η χρήση ατροτίνης και οξιμης δεν ενδείκνυνται.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:**

Για τις εφαρμογές μετά την συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα επήσια ζιζάνια και δεκατεσσάρων (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:**

• Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια. • Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζάνιων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:**

Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Κιτριά, Αμυγδαλιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Αμπέλι, Ελιά, Καπνός, και τους Αγρούς μετά (Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα), Ελιά, Καπνός, Βαμβάκι: 7 ημέρες. Ακαλλιέργητες εκτάσεις, Κατά μήκος Αρδευτικών & στραγγιστικών καναλιών: Δεν εφαρμόζεται.

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέττα του.

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:**

Αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον.



# METEOR TF 36 SL



ZIZANIOKTONO



SL - Πυκνό διάλυμα

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση επήσιων και πολυετών ζιζανίων, ξύλωδών φυτών καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού.



## Εγγυημένη Σύνθεση

- Glyphosate οξύ ..... 36% β/ο
- (Υπό μορφή άλατος  
ισοπροπυλαμίνης ..... 48,5% β/ο)
- Βοηθητικές ουσίες:** 56,10% β/β



## Πεδίο εφαρμογής

Διάφορες καλλιέργειες



## Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες  
Α.Α.Δ.Α.: 70183/06.12.2016

Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559, Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



## Σάρωση για χρήση



NO VARNISH AREA



1  
ΛΙΤΡΟ



ADAMA

## ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και προστατευτικά γάντια κατά την ανάμεξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου, θα πρέπει να φοράτε μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακρύ μανίκια.

Διάθεση στον περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φάλες και τα δοχεία ζεπτέλονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό έπιπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους: ● Να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη, ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού κατά 50% για τα Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Κιτριά), Ακρόδρυα (Αμυγδαλά), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά), Αμπέλι, Ελιά, Καπνός, και τους Αγρούς μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για στορά. ● Να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη, ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 75% κατά την εφαρμογή κατά μήκος Αρδευτικών και Στραγγιστικών καναλιών και σε Ακαλλιέργητες Εκτάσεις.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως

## ΟΜΑΔΑ G ZIZANIOKTONO

γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης, χορηγήστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μην χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα από τον χώρο έκθεσης, διατηρήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση διάλητηριασης ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Η χρήση ατροπίνης και οξιμητών δεν ενδεικνύνται.

Τηλ. Κέντρου Διάλητηριασεων: 2107793777

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:**

Για τις εφαρμογές μετά την συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα επίσια ζιζάνια και δεκατεσσάρων (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:**

● Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια. ● Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν τελευταία επεμβάση πριν τη συγκομιδή:

Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Κιτριά, Αμυγδαλά, Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Αμπέλι (Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα), Ελιά, Καπνός, Βαμβάκι: 7 ημέρες.

## ΜΕΤΕΟΡ ΤΕ 36 SL

**ΜΕΤΕΟΡ ΤΙ ΕΦ:** Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση επήσιων και πολυετών (αγρωστώδων, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάχχης του καπνού. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

### ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιέργειών, προς αποφυγή τυχόν συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς. Για την οροβάχχη στον καπνό εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκασμό καλύψεως της φυτείας. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μεγάλητερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

### ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Να μην χρησιμοποιείτε ακάθαρτο ή σκληρό νερό για την διάλυση του φαρμάκου.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:

Αδειάστε το τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

### ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:

**ΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ** (Πορτοκαλιά - Μανταρινά - Λεμονιά - Γκρέιπ φρουτ - Κιτριά) - **ΑΚΡΟΔΡΥΑ** (Αμυγδαλιά - ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά-Αχλαδιά) ) - **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Βερικοκιά-Ροδακινιά-Κερασά) - **ΑΜΠΕΛΙΑ** (Επιπρατέζια & Οινοποιήσμα) - **ΕΛΙΑ:** Επήσια ζιζανία\* (αγρωστώδη και πλατύφυλλα). Δόση: 150-200 κ.εκ./στρ. Μολόχα, Τσουκνίδα, Πολυκόμπη, Αντράκλα. Δόση: 400-600 κ. εκ./στρ. Οταν τα ζιζανία βρίσκονται στο στάδιο της ζωρής τους ανάπτυξης. Μέγιστο: 2 εφαρμογές/καλλιέργεια. Δόση: 750-1000 κ.εκ./στρέμμα. Βέλιουρας, Φτέρη. Δόση: 500 κ.εκ./στρ. Περικολάδα. Δόση: 1000 κ.εκ./στρ. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζανία βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτήν. Κύπερο. Δόση: 1η εφαρμογή κατά την άνθηση με 600 κ.εκ./στρ. 2η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης με 500 κ.εκ./στρ. Μέγιστο: 2 εφαρμογές/καλλιέργεια. Δόση: 150-200 κ.εκ./στρ. Πολυετή ζιζανία\*: Επήσια ζιζανία\* (αγρωστώδη και πλατύφυλλα). Δόση: 500 κ.εκ./στρ. Πολυετή ζιζανία (Βέλιουρας [Sorghum halepense]). Δόση: 500 κ.εκ./στρ. Μία (1) εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης. **ΚΑΠΝΟΣ:** Οροβάχχη. Δόση: α) 40 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή με ψεκασμό καλύψεως, 40 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. β) 60 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή με ψεκασμό καλύψεως, 60 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. Μέγιστο: 2 εφαρμογές/καλλιέργεια. περίοδο. **ΑΓΡΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ή ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ:** Επήσια ζιζανία\* (αγρωστώδη και πλατύφυλλα). Δόση: 150-200 κ.εκ./στρ. Μολόχα, Τσουκνίδα, Πολυκόμπη, Αντράκλα. Δόση: 400-600 κ.εκ./στρέμμα. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζανία βρίσκονται στο στάδιο της ζωρής τους ανάπτυξης. Πολυετή ζιζανία\*\* (ως ανωτέρω): Δόση: 500-1000 κ.εκ./στρ. (ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου, ως ανωτέρω). Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζανία βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτήν. **ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ:** Επήσια ζιζανία\* (αγρωστώδη και πλατύφυλλα). Δόση:

150-200 κ. εκ./στρ. Μολόχα, Τσουκνίδα, Πολυκόμπη, Αντράκλα. Δόση: 400-600 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή όταν τα ζιζανία βρίσκονται στο στάδιο της ζωρής τους ανάπτυξης. Μέγιστο: 2 εφαρμογές/καλλιέργεια. Πολυετή ζιζανία\*\* (ως ανωτέρω): Δόση: 500-1000 κ.εκ./στρ. (ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου, ως ανωτέρω). Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζανία βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτήν. Ξυλώδεις θάμνοι, δένδρα, βάτα, κ.λπ. Δόση: 500-1000 κ.εκ./στρ. Μία (1) εφαρμογή όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη. **ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ:** Υδροχαρή ζιζανία. Δόση: 800-1000 κ.εκ./στρ. Μία (1) εφαρμογή κοντά στην άνθηση των ζιζανίων.

**Όγκος Ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):** Πορτοκαλιά-Μανταρινιά-Λεμονιά-Γκρέιπ φρουτ-Κιτριά-Αμυγδαλιά-Μηλιά-Αχλαδιά-Βερικοκιά-Ροδακινιά-Κερασά-Αμπέλια (Επιπρατέζια & Οινοποιήσμα)-Ελιά-Βαμβάκι-Άγροι μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά-Ακαλλιέργητες εκτάσεις-Κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών (20-40), Καπνός (30-40).

(\*) Για την καταπολέμηση επησίων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως μία με δύο εφαρμογές (χειμώνα-άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζανία βρίσκονται στο στάδιο της ζωρής τους ανάπτυξης. (\*\*) Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία εφαρμογή, όταν τα ζιζανία βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτήν. (\*\*\*) Στο βαμβάκι, ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και το φύλλωμα των φυτών. Προτείνεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτρών) γύρω από τα μπεκ.

### Παρατηρήσεις:

1) Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια, ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος, αποφεύγοντας επαφή των σταγονίδιων του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφύλλες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες από το τρίτο (3ο) έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. 2) Για τα πλαταφύλλα ζιζανία: Μολόχες, Τσουκνίδες, Πολυκόμπη, Λαπάτσα και Αντράκλα, η δόση κυμαίνεται από 400-600 κ.εκ/στρ., ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους. 3) Για την Αγριάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15-30 εκ. 4) Για την φτέρη, η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής. 5) Να μη γίνεται ψεκασμός εάν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες. 6) Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή. 7) Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 8) Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που παράγουν υπόγειο βράσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους. 9) Για τις επιπρατέζιες ελύες επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δέντρο. Δεν επιτρέπεται εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελύες. 10) Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:**

● Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιέργητικά μέτρα κ.λ.π.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην δραστική ουσία glyphosate.

● Σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων στα πρανή και με τρόπο ώστε σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος να μην πάνε στο νερό.