

Sulcotrek® SC

Terbuthylazine 32,7% + Sulcotrione 17,3%

Εκηλεκτικό ζιζανιοκτόνο

για την καταπολέμηση πλάτύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο

Δείτε τη διαφορά με ένα πέρασμα!

ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ

Sulcotrek® SC

- ◆ Το Sulcotrek, είναι εκλεκτικό προφυτρωτικό-μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση κυρίως πηλατύφυλλων και ορισμένων αγρωστωδών ζιζανίων στην καλλιέργεια του καλαμποκιού.
- ◆ Είναι μίγμα Sulcotrione με Terbutylazine.

Δράση: από τις ρίζες και τα φύλλα των ζιζανίων

- ✓ Sulcotrione → Ταχύτητα στη δράση
- ✓ Terbutylazine → Μεγάλη υπολειμματική διάρκεια

Καταπολεμούμενα ζιζάνια



Τραχύ βλήτο



Αγριοντοματιά




Τάτουλας



Λουβουδιά

Στάδια Ανάπτυξης Αραβοσίτου



Sulcotrek® SC: 200-260 κ.εκ./στρ.

Sulcotrek® SC + Nicogan® 4 OD

nicosulfuron 4%

ΑΑΔΑ: 70028/8.2.2013-Η/Μ τροπ: 4/11/2015

Ο ιδανικός συνδυασμός Sulcotrione, Terbutylazine και Nicosulfuron για τον ταυτόχρονο έλεγχο των αγρωστωδών και πηλατύφυλλων ζιζανίων.

Πηλατύφυλλα ζιζάνια

- ✓ Βλήτα
- ✓ Λουβουδιά
- ✓ Αγριο τοματιά
- ✓ Τάτουλας

Αγρωστώδη ζιζάνια

- ✓ Βέλιουρας
- ✓ Μουχρίτσα
- ✓ Σετάρια



Βέλιουρας




Σετάρια



Μουχρίτσα

Στάδια Ανάπτυξης Αραβοσίτου

Sulcotrek® + Nicogan®



Sulcotrek® SC: 200-260 κ.εκ./στρ. & Nicogan® 4 OD: 100-150 κ.εκ./στρ.*

*: η δόση μεταβάλλεται ανάλογα με το ζιζάνιο και το στάδιο ανάπτυξής του.

Πλεονεκτήματα για τον παραγωγό

- ✓ Απλή ρύση με άριστη σχέση κόστους/ωφέλειας.
- ✓ Ταυτόχρονη καταπολέμηση πηλατύφυλλων και στενόφυλλων ζιζανίων.
- ✓ Ευελιξία και μεγάλο παράθυρο εφαρμογής.
- ✓ Σιγουριά στο αποτέλεσμα - ταχύτητα, διασυστηματικότητα, μεγάλη υπολειμματική διάρκεια.
- ✓ Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στην καλλιέργεια του καλαμποκιού, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα του προϊόντος

Sulcotrek® SC

Terbutylazine 32,7% + Sulcotrione 17,3%

ΑΑΔΑ: 70287/20.07.2018

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Κ. ΕΚ./ στρέμμα	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
Αραβόσιτος	Ετήσια πηλατύφυλλα και ορισμένα αγρωστώδη ζιζάνια	200 - 260	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (BBCH 00-09) ή Νωρίς μεταφυτρωτικά, της καλλιέργειας στα 1 - 5 φύλλα (BBCH 10-15)

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Προ-φυτρωτική εφαρμογή:

Ετήσια ευαίσθητα πηλατύφυλλα ζιζάνια:

Αγριοβαμβακιά, Αγριοπιπεριά, Αγριοτοματιά, Αντράκλια, Άσπρο βλήτο, Βλήτο τραχύ, Λουβουδιά Τάτουλας

Ετήσια ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια:

Μουχρίτσα

Μεταφυτρωτική εφαρμογή:

Ετήσια ευαίσθητα πηλατύφυλλα ζιζάνια:

Αγριοβαμβακιά, Αγριομελιτζάνα, Αγριοτοματιά, Βλήτο, Βλήτο τραχύ, Καψέλλα, Λουβουδιά, Σκαρολιάχανο, Τάτουλας

Ετήσια ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια:

Μουχρίτσα, Αιματόχορτο

Παρατηρήσεις

- Η χαμηλή δόση να εφαρμόζεται σε ελαφριάς, ενώ η υψηλότερη σε μέσης ή βαριάς σύστασης εδάφη.
- Αποφεύγετε την χρήση του σε πολύ αμμώδη, ελαφρά, φτωχά σε οργανική ουσία (< 1%) εδάφη σε περιοχές με ποηλιές βροχοπτώσεις.
- Μετά την εφαρμογή εάν δεν ακοιουθήσει βροχή τουλάχιστον 10-15 χιλιοστών εντός δύο εβδομάδων να εφαρμοσθεί ελαφρύ πότισμα.
- Να μην εφαρμόζεται σε γηικό καθαμπόκι και σε καλλιέργειες αραβοσίτου που προορίζονται για σποροπαραγωγή.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31 Χαλάνδρι-Αθήνα
Τηλ.: 211 120 5570, Fax: 211 120 5572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310-784931-6, Fax: 2310-780453
www.alfagro.gr



Μέλος του



0321072