

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Υποπνο για πρόκληση καρκίνου.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Περιέχει piriinicarb: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκφενώματα.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
Οι χειριστές θα πρέπει να φορούν κατάλληλη ολόσωμη φόρμα, κατάλληλα υποδήματα, γάντια και προστατευτική μάσκα προσώπου κατά την ανάμειξη / φόρτωση.
Όταν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ κλειστού τύπου, η χρήση γαντιών περιορίζεται στις εργασίες που υπάρχει δερματική επαφή με ψεκασμένες επιφάνειες, εκτός καμπίνας.
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
Διάθεση του περιεκτέτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα σακκούλκια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
Η είσοδος στην ψεκασμένη περιοχή επιτρέπεται μόνο με κατάλληλα γάντια.
Για να προστατεύσετε τους οργανισμούς-μη στόχους να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη 15 μέτρων ή μια αφέκαστη ζώνη 10 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται 50% μείωση διασποράς του ψεκαστικού νέφους.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δειξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό.
Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Αντίδοτο: Ατροπίνη.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777



ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΠΙΡΙΜΟΡ:
Εκλεκτικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με παράλληλη δράση ατμών για καταπολέμηση των αφίδων. Έχει διελασματική δράση, εισέρχεται μέσα στα φύλλα με περιορισμένη όμως κινητικότητα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Ψεκασμός φυλλώματος. Μεγάλη σημασία έχει η καλή διαβροχή.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά το ½ με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να έχει ανακατευτεί καλά πριν αρχίσει ο ψεκασμός.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:
Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Ξανακαθαρίστε τον ψεκαστικό εξοπλισμό 2 με 3 φορές από όλα τα υπολείμματα, διαλύοντας με καθαρό νερό και ρίχνοντας τα νερά του ξεπλύματος μέσα στο ψεκαστικό δοχείο.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ-ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ-ΚΕΡΑΣΙΑ-ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ-ΚΥΔΩΝΙΑ: Αφίδες. Δόση: 50-75 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 76 γρ./στρ. **ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΑΓΡΟΥ (Φράουλα-Τομάτα-Μελιτζάνα-Πιπεριά-Αγκινάρα-Αγγούρι-Κολοκύθι-Πεπόνι-Κολοκύθα-Καρπούζι-Σπαράγγι-Φασολάκι [με ή χωρίς λοβό]-Μπιζέλι-Φασόλι Ξερό-Κρεμμύδι-Σκόρδο-Καρότο-Ρίζα Μαϊντανού-Χρένο-Γογγύλι-Γουλί-Παντζάρι-Μαρούλι & λοιπές σαλάτες [εκτός από baby leaf, φύλλα Σπανακιού και Παντζαριού]):** Αφίδες. Δόση: 100 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 75 γρ./στρ. **ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (Φράουλα-Πιπεριά-Αγγούρι-Κολοκύθι-Πεπόνι-Κολοκύθα-Καρπούζι-Τομάτα-Μελιτζάνα):** Αφίδες. Δόση: 80 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80 γρ./στρ. **ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (Μαρούλι & λοιπές Σαλάτες [εκτός από baby leaf φύλλα Σπανακιού & Πατζαριού]-Φύλλα Σέλινου & Μαϊντανού)-ΠΑΤΑΤΑ-ΛΙΝΑΡΟΣΠΟΡΟΣ-ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ-ΗΛΙΑΝΘΟΣ:** Αφίδες. Δόση: 50 γρ./στρ. **ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ-ΣΟΡΓΟ:** Αφίδες. Δόση: 40 γρ./στρ. Εφαρμογή έως το στάδιο της άνθησης. **ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ:** Αφίδες. Δόση: 40 γρ./ στρ. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Α+Θ):** Αφίδες. Δόση: 100 γρ./στρ.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):
Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά-Δαμασκηνιά-Κερασιά-Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά (100-150), Κηπευτικά Αγρού (20-75), Κηπευτικά Θερμοκηπίου-Καλλωπιστικά Θερμοκηπίου (20-100), Πατάτα (30-40), Καλαμπόκι-Σόργο (20-40), Γλυκό Καλαμπόκι (20-60), Λιναρόσπορος-Ελαιοκράμβη-Ηλιάνθος (30-60), Καλλωπιστικά Αγρού (100).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών-Μεσοδιάστημα εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο:
Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά-Δαμασκηνιά-Κερασιά-Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά-Φράουλα (Α)-Τομάτα (Α)-Μελιτζάνα (Α)-Πιπεριά (Α)-Κολοκύθι (Α)-Σπαράγγι (Α)-Φασολάκι [με ή χωρίς λοβό] (Α)-Καρότο (Α)-Ρίζα Μαϊντανού (Α)-Χρένο (Α)-Γογγύλι (Α)-Γουλί (Α)-Παντζάρι (Α)-Μαρούλι & λοιπές σαλάτες (Α) [εκτός από baby leaf, φύλλα Σπανακιού και Παντζαριού] (1), Αγκινάρα (Α)-Αγγούρι (Α)-Πεπόνι (Α)-Κολοκύθα (Α)-Καρπούζι (Α)-Κρεμμύδι (Α)-Σκόρδο (Α)-Μπιζέλι & Φασόλι Ξερό (Α)-Τομάτα (Θ)-Μελιτζάνα (Θ)-Μαρούλι & λοιπές σαλάτες (Θ) [εκτός από baby leaf, φύλλα Σπανακιού



ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ **Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)**

Εκλεκτικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με παράλληλη δράση ατμών για καταπολέμηση των αφίδων.

Εγγυημένη Σύνθεση

- Pirimicarb 50% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 47,4% β/β

Πεδίο Εφαρμογής

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΑΓΡΟΥ & ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΠΑΤΑΤΑ, ΛΙΝΑΡΟΣΠΟΡΟΣ, ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ, ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΣΟΡΓΟ, ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ

Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Α.Α.Δ.Α.: 14.629/24.11.2017

Κάτοχος της Άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι,
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Αριθμός Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής:
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Σάρωση για χρήση



1 ΚΙΛΟ

11-12-2021/10

και Παντζαριού]-Φύλλα Σέλινου & Μαϊντανού (Θ)-Καλλωπιστικά (Θ) (2 / 7-12 ημέρες), Φράουλα (Θ)-Πιπεριά (Θ)-Αγγούρι (Θ)-Κολοκύθι (Θ)-Πεπόνι (Θ)-Κολοκύθα (Θ)-Καρπούζι (Θ)-Καλαμπόκι-Σόργο-Γλυκό Καλαμπόκι-Λιναρόσπορος-Ελαιοκράμβη-Ηλιάνθος (2 / 7 ημέρες), Πατάτα (2 / 7-14 ημέρες), Καλλωπιστικά (Α) (1).

Παρατηρήσεις:
Ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο όγκο νερού για τον ψεκασμό, συνιστάται να τηρείτε τις δόσολογίες ανά στρέμμα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
Δεν είναι επικίνδυνο για τα αρπακτικά των αφίδων.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:
Δεν απαιτείται.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:
Δεν απαιτείται.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:
Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:
Σπαράγγι (εφαρμογή μετά τη συγκομιδή) (Α): **7 μήνες.**
Λιναρόσπορος, Ελαιοκράμβη, Ηλιάνθος: **21 ημέρες.**
Φύλλα Σέλινου & Μαϊντανού (Θ), Μαρούλια & Λοιπές Σαλάτες (εκτός από baby leaf φύλλα σπανακιού και πατζαριού) (Θ): **14 ημέρες.**
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Καρότο (Α), Ρίζα μαϊντανού (Α), Χρένο (Α), Παντζάρι (Α), Γογγύλι (Α), Γουλί (Α), Αγγούρι (Α+Θ), Μπιζέλι (Α), Φασόλι Ξερό (Α), Φασολάκια (με ή χωρίς λοβό) (Α), Αγκινάρα (Α), Φράουλα (Α+Θ), Μαρούλι και λοιπές σαλάτες (εκτός από baby leaf φύλλα Σπανακιού και Παντζαριού) (Α), Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Κολοκύθι (Θ), Πατάτα, Γλυκό καλαμπόκι: **7 ημέρες.**
Τομάτα (Α), Μελιτζάνα (Α), Πιπεριά (Α+Θ), Κολοκύθι (Α), Πεπόνι (Α+Θ), Καρπούζι (Α+Θ), Κολοκύθα (Α+Θ), Κρεμμύδι (Α), Σκόρδο (Α): **3 ημέρες.**
Ανθοκομικά, Καλαμπόκι, Σόργο: **Μη εφαρμόσιμο.**

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Το σκεύασμα αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο, με θερμοκρασία 0°C-35°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.