



**ADAMA**

**Listen • Learn • Deliver**

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την επικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.



1021Φ91



**LEIMAY S<sup>®</sup>**  
... και ξενοιάζεις!

Νέα φιλοσοφία στην  
αντιμετώπωση του  
Περονόσπορου

Αποτέλεσμα που  
διαρκεί σε όλες τις  
καιρικές συνθήκες!

**ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31 Χαλάνδρι-Αθήνα | Τηλ.: 211 120 5555, Fax: 211 120 5559  
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 343, ΤΚ 57008 Ιωνία | Τηλ.: 2310 784931-6, Fax: 2310 780453

MYKHTOKTONO


**ADAMA.COM**




amisulbrom 20%

## Καινοτομία

- Νέα δραστική ουσία: **amisulbrom** – προϊόν έρευνας της εταιρείας NISSAN Chemicals.
- Νέα ομάδα: **Qils**
- Νέα οικογένεια: **σουλφαμίδες**.
- Νέος τρόπος δράσης
- Νέα λύση στα προγράμματα διαχείρισης ανθεκτικότητας: δεν παρουσιάζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με τα υπάρχοντα περονοσποροκότανα.



## Πολλαπλή δράση




To Leimay S® παρεμποδίζει σε ιδιαίτερα χαμηλές δόσεις, τόσο την άμεση όσο και την έμμεση βλάστηση των σποριαγγείων και καταστρέφει τα ζωσπόρια που σχηματίζονται και απελευθερώνονται σε υγρές και κρύες συνθήκες, προσφέροντας έτσι σταθερή αποτελεσματικότητα στο χωράφι δύλες τις εποχές ανεξαρτήτως θερμοκρασίας και υγρασίας.

To πλεονέκτημα της διπλής αυτής δράσης που εμφανίζουν ελάχιστα περονοσποροκότανα χωρίς την προσθήκη μυκητοκότονου επαφής, καθιστά το **amisulbrom** αυτόνομα αποτελεσματικό προσφέροντας ισχυρή προστασία σε προσβολές φύλλων, στελεχών, κονδύλων και καρπών από περονόσπορο.

## Νέος τρόπος δράσης


### Εσωτερική μεμβράνη μιτοχονδρίων



Σε βιοχημικό επίπεδο το **amisulbrom** παρεμποδίζει την αναγωγή της ουμπικινόνης στη θέση Qi του σύμπλοκου III της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων (θέση διαφορετική από την Qo των στρομπιλουρινών), διακόπτοντας τη ροή ενέργειας στο μύκητα.

### Μεγάλη διάρκεια δράσης

Η σταδιακή αποδέσμευση του **amisulbrom** από το εσωτερικό του φύλλου όπου είναι προστατευμένο από την έκπλυση και η ανακατανομή του προς την επιφάνεια όταν επικρατούν υγρές συνθήκες, δηλαδή ευνοϊκές για μόλυνση, παρέχει προστασία μακράς διάρκειας μέχρι και 3 βδομάδες.




## Ισχυρή προστατευτική δράση

Θωρακίζει το φυτό από τις πρωτογενείς μολύνσεις.

&amp;

### Ισχυρή αντισπορογόνος δράση

To Leimay S κινούμενο διελασματικά σταματάει τις δευτερογενείς μολύνσεις και συνεπώς περιορίζει την εξάπλωση της ασθένειας στο χωράφι.



### Εξαιρετική αντοχή στην έκπλυση - Δεξαμενή amisulbrom

To Leimay S διεισδύει ταχύτατα στο εσωτερικό του φύλλου όπου μένει προστατευμένο από την έκπλυση από βροχή ή ποτίσματα.

Ταυτόχρονα όμως λειτουργεί και ως **δεξαμενή** της δραστικής ουσίας.


Σε υγρές συνθήκες το **amisulbrom** ανακατανέμεται από το εσωτερικό των φύλλων προς την επιφάνεια δημιουργώντας ισχυρό στρώμα προστασίας από τη μόλυνση.

### Κορυφαία προστασία των κονδύλων της πατάτας

To Leimay S είναι κορυφαίος «προστάτης» των κονδύλων. Αυτό εξηγείται από τη διπλή **μοναδική δράση του ιδιαίτερα στα ζωσπόρια** όπου παρεμποδίζει όχι μόνο την απελευθέρωση αλλά και την κίνηση και εγκύστωσή τους.

Κάθε σπόριο που ξεπλένεται από τα φύλλα προς το έδαφος ελέγχεται από το Leimay S **κρατώντας** τους κονδύλους υγιείς για την αποθήκευση.

### Προστασία κονδύλων στην αποθήκευση - 3 πειράματα



## Εγκεκριμένο Φάσμα Δράσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ		ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
		κ. εκ./στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρά / στρέμμα		
Περονόσπορος	Πατάτα	40-50	20-100	3	7
	Αμπέλι	37,5	10-100	3	28
	Μελιτζάνα (Υ)	40-60	50-100	3	3
	Μαρούλι (Υ)	40-60	50-100	3	3
	Τομάτα (Υ)	40-60	10-100	3	3

### Εξαιρετική προστατευτική δράση

- Εξαιρετική προστατευτική δράση
- Αντοχή στην έκπλυση
- Μεγάλη διάρκεια δράσης
- Αντιμετώπιση των πρωτογενών μολύνσεων του περονόσπορου δύλες τις εποχές και σε όλες τις καιρικές συνθήκες

